

Berichte über die wissenschaftliche Biologie.

Band, Heft 13/14

S. 753—864

Allgemeines.

Menge, Edward J. v. K.: Biological problems and opinions. (Biologische Probleme und Meinungen.) Quart. Rev. Biol. 5, 348—359 (1930).

Auf Grund einer bei 20 der ausgezeichnetsten amerikanischen Biologen und den Vornern der biologischen und zoologischen Institute aller Universitäten der übrigen Welt durchgeführten Umfrage bezeichnet Verf. als die wichtigsten Errungenschaften der Biologie im 20. Jahrhundert: den Mendelismus, die Entwicklungsmechanik, die Pflanzenphysiologie, die Drosophilastudien von Morgan und seiner Schule, die Züchtung, die künstliche Parthenogenese, den Behaviorismus, die Tropismenlehre, die Erfolge der angewandten Entomologie, die Entdeckung der Vitamine, die Züchtung mariner Planktonorganismen, die Entdeckung des Glutathions und des Chroms, die Endokrinologie, die Entdeckung der Übertragungsweise von Malaria, das gelbe Fieber, die Fortschritte in der Serotherapie, die Entdeckung des Insulins, die Bekämpfung der Bakteriophagen. Wie weit diese Schätzung von den befragten Autoritäten aber von dem Befragten selbst herrührt, ist nicht klar ersichtlich. Nach dem eigenen Urteil aller sollen die wichtigsten noch zu lösenden Probleme die folgenden sein: 1. Das Wesen des Lebens, 2. Konstitution und Physiologie des Protoplasmas, 3. Ursache und Bekämpfung des Krebses, 4. Beziehungen von Genese und Umwelt, 5. Erblichkeit der Disposition zu Krankheiten, 6. Erblichkeit der Kriminalität, 7. Veredlungswertigkeit der Menschenrassen, 8. Bekämpfung schädlicher Insekten. Zum Schluss bespricht Verf. noch einmal das Verhältnis von Vererbung und Umwelteinflüssen und meint, festgestellt sei, daß die Vererbung ein gesetzmäßiger Vorgang ist, daß jedoch Fall zu Fall entschieden werden müsse, ob jeweils die Vererbung oder die Wirkung der Umwelteinflüsse das Entscheidende sei.

J. Groß (Neapel).

● **Labbé, A.: Le conflit transformiste. Préface par Étienne Rabaud.** (Nouvelle collection.) (Der Streit um den Transformismus.) Paris: Félix Alcan 1929. XI, 201 S. 15.—

In einem leicht und angenehm leserlichen Buch, das durch geistreiche, oft anekdotenhafte Bemerkungen recht lebendig gestaltet ist, nimmt Verf. Stellung zu den wichtigsten Problemen der Phylogenie und sucht aus älterer wie neuerer Literatur Beweise für seine Theorie des Transformismus zusammen. Es werden in 7 Abschnitten Fragen des Finalismus und Vitalismus erörtert, wobei in der Hauptsache auf psychologische und logistische Momente eingegangen wird, die, nach Ansicht des Verf., ausaggebend waren, daß derzeit von einer Krise des Darwinismus gesprochen wird. Wirklichkeit existiert aber eine solche Krise nicht, denn die Argumente finalistischer und vitalistischer Kreise sind durch die Lehre des Transformismus überwindbar. Wenn man sich auch zu dieser Diskussion stellt und trotz einiger Mißgriffe auf genetischem Gebiet, wird das Buch den Leser schon deshalb interessieren, weil darin vielfach Werke französischer Forscher hingewiesen werden, die sonst in den ähnlichen Schriften der deutschen oder anglo-sächsischen Literatur weniger Berücksichtigung finden.

Péterfi (Berlin).

Reynier, Alfred: Les botanistes prélinnéens des Bouches-du-Rhône. (Die Vorläufer des Botaniker im Département Bouches du Rhône [Rhönemündung].) Bull. Bot. France 77, 262—273 (1930).

Ausgehend von der Schule von Montpellier und dem Antriebe, der von dieser Universität im 16. Jahrhundert ausging, zählt Verf. die Mediziner, Apotheker und Botaniker — mit Angabe ihrer Werke — auf, welche in den Bouches du Rhône botanisierten und teils die wichtigsten Fundamente mit. Aus dem 16. Jahrhundert sind angeführt: Solier, Belon, Villars, de L'Ecluse, Rauwolf, Reynaud, Jean und Gaspard Bauhin, Pena, Burser, Lantini; aus dem 17. Jahrhundert: Fabry de Peiresc, Ray, Pitton de Tournefort,

de Beaumont, Fouque, Joannis, Bertier, Tartonne, Bertrand, Garidel. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts besuchten auch Jussieu und später Gérard das Departement.

E. Bergdolt (München)

Meyer, A. W.: Malpighi as anatomist. (Malpighi als Anatom.) (*Dep. of Anat., Stanford Univ., Stanford University.*) Science (N. Y.) 1930 II, 234—238.

Ein warm geschriebener, kleiner Hinweis auf Malpighi als einen Anatomen, der 300 Jahren Anatomie mit allen Mitteln trieb, die ihm zu Gebot standen, in der Sektion toten Menschen und am lebenden Tier, im Mikroskop, mit Injektion und Maceration auf der Höhe der gesamten Naturwissenschaft seiner Zeit stand und in allen ihren biologischen Zweigen leidenschaftlich forschend arbeitete — vielfach so, daß Jahrhunderte vergingen, auf seinen Entdeckungen weitergebaut werden konnte. Es ist interessant, an ein solches Forscherleben gerade heute erinnert zu werden, da die Anatomie im Begriff ist, die lähmende Kette zu sprengen, die sie sich mit einer Begrenzung des Forschungsinhalts durch die Untersuchungsmethode selbst um die Gelenke geschmiedet hatte. Robert Wetzel (Würzburg)

● **Handbuch der Physik.** Hrsg. v. H. Geiger u. Karl Scheel. Bd. 21. Licht und Materie. Redig. v. H. Konen. Berlin: Julius Springer 1929. XII, 968 S. u. 386 RM. 93.—.

In diesem 21. Band des monumentalen Werkes verzeichnen wir hauptsächlich die Kapitel 1 (Absorptionsspektren), Kapitel 6 (Röntgenspektren), Kapitel 15 (Spektralanalyse) und Kapitel 20 (Einführung in die Beugungstheorie der optischen Instrumente), welche den Biologen näher interessieren. Namentlich der letzterwähnte Abschnitt enthält eine für die mikroskopische Optik höchst wertvolle Ausführung von Jentsch, zu deren Verständnis allerdings höhere mathematische Kenntnisse unentbehrlich sind. P. Péterfi (Berlin)

● **Schoenichen, Walther: Praktikum der Insektenkunde. Nach biologisch-logischen Gesichtspunkten.** 3., verb. Aufl. Jena: Gustav Fischer 1930. X, 256 S. u. 301 Abb. RM. 12.—.

Diese 3. Auflage des vorzüglichen Schoenichenschen Buches ist textlich an vielen Stellen erweitert und bringt außerdem eine Reihe neu eingefügter Figuren und Arbeiten anderer Autoren. Der Umfang des Ganzen ist infolgedessen gegenüber der 2. Auflage gegenüber erweitert, jedoch in einem sehr erträglichen Maße, so daß das Werk in jeder Weise als handlich bezeichnet werden kann. Bücher wie das vorliegende Praktikum sollten noch in viel größerem Umfang in der Hand des Studenten sein, als bisher der Fall war. Es ist ein Genuß, den Text vom didaktischen Standpunkt aus zu lesen. Da die Schrift auch für den Lehrgebrauch in höheren Schulen bestimmt liegt es in der Natur der Sache, daß der Leser über Morphologie und Physiologie der Geschlechtsorgane der Insekten nur andeutungsweise unterrichtet wird. Auch die neue Auflage ist so recht geeignet, den Anfänger in die Grundbegriffe der Insektenkunde einzuführen. Der Fachzoologe andererseits wird das Werk nicht missen können, da die wichtigsten Tatsachen über die Morphologie und Physiologie der Insekten wohl nirgends so klar und treffend zur Darstellung gelangt sind wie in dieser nach biologisch-ökologischen Gesichtspunkten verfaßten Insektenkunde. H. v. Lengerke (Halle)

● **Jahresbericht Physiologie und experimentelle Pharmakologie. Bibliographisches Jahresregister der Berichte über die gesamte Physiologie und experimentelle Pharmakologie.** Hrsg. v. P. Rona u. K. Spiro. Bd. 9. Bericht über das Jahr 1928. 1. u. 2. Hefen. Berlin: Julius Springer 1930. XI, 1655 S. RM. 228.—.

Der vorliegende 9. Band des Jahresberichtes bringt in der 1. Hälfte kritische Sammelreferate über die Literatur von 1927 und 1928 und in der 2. Hälfte die Bibliographie des Jahres 1928. Die Bibliographie für 1927 findet man in dem vor Jahresfrist erschienenen 8. Band. Für die in 2jähriger Folge erscheinenden Sammelreferate wird man die Herausgeber wie den Referenten dankbar sein, geben sie doch dem Leser bequeme Gelegenheit, sich fortlaufend auch darüber zu orientieren, was auf den Nachbargebieten vorgeht, die nicht zum eigensten Arbeitsfeld gehören und deren Spezialliteratur für einzelnen zu verfolgen, ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist. Bemerkenswert ist in einer wie großen Zahl der Übersichtsreferate dieselbe Klage teils offen ausgesprochen

schwachen Objektiv (16 mm Brennweite) eingestellt und der Kondensor gesenkt, bis schwarzer, kreisförmiger Bezirk im Sehfeld erscheint. Nun zentriert man den Kondensor, der schwarze Bezirk in der Mitte des Sehfeldes liegt und hebt den Kondensor, bis sein Feld im Präparat liegt. Schließlich werden noch Lichtquelle und Spiegel so nachzentriert, runde Luftblasen symmetrische Reflexion geben. Darauf prüft man nochmals, ob beim Senken des Kondensors der dunkle Fleck in die Mitte des Sehfeldes fällt. *W. J. Schmidt* (Gießen).

Boleek, L.: Über die Celloidineinbettung des Bouin-fixierten histologischen Materials (*Inst. f. Histol. u. Embryol., Univ. Bratislava.*) *Z. Mikrosk.* **47**, 334—335 (1930).

Nach dem Verf. bildet die Pikrinsäure mit dem im fixierten Material enthaltenen Kalium das in Wasser unlösliche, in Alkohol sehr schwer lösliche Kalumpikrat, was das Eindringen des Celloidin verhindert und eine Bröckelung des eingebetteten Materials verursacht. Das Kalumpikrat wird durch folgendes Gemisch aufgelöst: Ol. ligni cedri 1 cem, Alkohol aet. absol. 8 cem, Ol. origani 2 cem, Acid. nitric. conc. 1 cem. Dadurch werden die oben erwähnten Nachteile der Bouinschen Flüssigkeit sowie schlechte Resultate bei der Färbung mit wässrigen Farbstoffen behoben. Das Gewebe leidet dabei keineswegs. *J. Florjan*.

Bruch, Hilde, und Hans Netter: Über die Gesetze der Farbstoffverteilung an einfachen biologischen Systemen. (*Physiol. Inst., Univ. Kiel.*) *Pflügers Arch.* **225**, bis 415 (1930).

Bei Erythrocyten kann man infolge der Membraneigenschaften die H'-Zahl innen und außen beliebig und unabhängig voneinander ändern. Damit ist die Möglichkeit gegeben, die Adsorption oder Verteilung von Farbstoffen zu studieren. Behandelt wurden Rind erythrocyten mit 2,5 mg % Toluidinblau. Zur Ermittlung der Gesamtfarbstoffkonzentration in den Erythrocyten dienten die Hämokritwerte, zur Bestimmung der Farbstoffaußenkonzentration der Bürkersche Apparat. Im sauren Milieu wird vom basischen Farbstoff wenig aufgenommen als vom alkalischen. Zusatz von Glykose wirkt auf die Innen- p_H alkalisierend. Die Kurve für die Quotienten der Farbkonzentrationen innen/außen läuft der des H'-Ionenverhältnisses parallel, wenn basische Farbstoffe, also Farbkationen, untersucht werden. Säurefarbstoffen gehen die Kurven parallel dem Verhältnis $OH_i : OH_a = H_a : H_i$. Hieraus wird ein Beweis dafür erblickt, daß die Membrangleichgewichte die Farbstoffverteilung bestimmen. Der Farbstoff ist im Innern zum Teil wäßrig gelöst, zum Teil nicht in der wäßrigen Phase vorhanden. Der gelöste Teil läßt sich unter Annahme der Gültigkeit der Membrangleichgewichte berechnen aus Farbstoff-Außenkonzentration und H'-Ionenverhältnis = Außenkonzentration $\times$ Verhältnis $H_a : H_i$ für Farbanionen und $H_i : H_a$ für Farbkationen. Der etwa nicht dissoziierte Anteil ergibt sich aus der Dissoziationskonstante und p_H . Zieht man die errechnete Konzentration des gelösten Farbstoffes von der Gesamtinnenkonzentration ab, so erhält man den adsorbierten Anteil. Zwischen p_H 7 und 7,7 ist die Farbaufnahme von der p_H nicht wesentlich abhängig. *Rhode* (Köln).

Lenoir, Maurice: Coloration double en deux temps; coloration double simultanée après fixation au picroformol alcoolique, acétique bichromaté. (Getrennte Doppel-färbung; simultane Doppelfärbung nach Fixierung mit Picroformol mit Alkohol, Essigsäure, Bichromat.) (*Laborat. de Bot., Fac. des Sciences, Nancy.*) *C. r. S. Biol. Paris* **104**, 1282—1284 (1930).

Es werden 2 Doppelfärbungen mitgeteilt, mit Hilfe derer eine differente Färbung beider Kernchromatine möglich ist und zwar eine getrennte Doppelfärbung mit Safranin und Polychromblau und eine simultane mit basischem Fuchsin und Malachitgrün. Die Ausführung der ersten Färbung ist folgende: Nach 3stündigem Beizen in 3 % Eisenalaun werden die Schnitte in Wasser ausgewaschen, mit alkoholischem Anilin-Safranin mindestens 12—16 Stunden gefärbt, in Wasser ausgewaschen, die Färbung mit Salzsäure-Alkohol (0,02 % HCl in 70 % Alkohol) differenziert und im gegebenen Moment die Differenzierung durch Eintauchen der Schnitte in Wasser unterbrochen. Hierauf werden die Schnitte $\frac{1}{4}$ Stunde mit Polychromblau gefärbt, ausgewaschen, mit Filtrierpapier abgetrocknet und die blaue Färbung mittels eines Gemisches von Alkohol und Nelkenöl zu gleichen Teilen differenziert. Falls beide Chromatine in fast reinem Zustande vorhanden sind, erscheint das Nucleolin in das Reticulin blau gefärbt. Bei gleichzeitiger Gegenwart variiert die Färbung von blauviolett zu rotviolett. Zur Doppelfärbung mit basischem Fuchsin und Malachitgrün wird folgender Fuchsinlösung bereitet: 1 g basisches Fuchsin wird in 10 cem 95proz. Alkohol gelöst und nach erfolgter Lösung 5 g Phenol zugefügt. Man verreibt die ganze Masse in einer Reibschale und spült diese dann mit 100 cem Wasser aus, nachdem man evtl. vorher noch 10 cem Alkohol zugefügt hat. Von Malachitgrün wird eine 1proz. Lösung in 25 % Alkohol bereitet. Zur Ausführung der Färbung werden 6 Teile der Malachitgrünlösung und 1 Teil der Phenolfuchsinlösung gemischt; das Gemisch ist nur einige Tage haltbar. Die Präparate werden 15 bis 30 Minuten gefärbt, in fließendem Wasser gewaschen, dann mit Pikrinsäure in gesättigter 95proz. Alkohol übertragen, dieser abtropfen und eintrocknen gelassen und nun das Präparat mit einem mit Pikrinsäure gesättigten Gemisch von Alkohol und Nelkenöl zu gleichen Teilen

deckt und damit differenziert. Die Differenzierung geht nur sehr langsam vor sich. Es folgt nun folgende Färbung. Der Grund ist orangegelb gefärbt; falls ein heller Grund gewünscht ist, werden die Schnitte mit einem Gemisch von Alkohol und Nelkenöl allein behandelt. Das Nucleolin ist, falls sehr rein vorliegend, grün, das Reticulin rosa gefärbt. Treten die Chromatine gleichzeitig auf, so zeigen sich Übergänge von grün bis violett. *J. Kisser.*

Capinpin, José M.: Brasilin stain on smear preparations of Oenothera pollen mother cells. (Brasilin-Färbung von Quetschpräparaten von Pollenmutterzellen von Oenothera.) (*Biol. Laborat., Univ., Princeton.*) *Science* (N. Y.) **1930 II**, 370—371.

Beim Studium der Chromosomen der Pollenmutterzellen von Oenothera versagte an Quetschpräparaten die Aceto-Carmin-Methode, weshalb Verf. zu einer in neuerer Zeit von Belling empfohlenen Färbung mit Brasilin überging, die sich ausgezeichnet bewährt hat und die folgendermaßen ausgeführt wird. Auf einen Objektträger werden die Antheren nebeneinandergelegt und mittels eines quer darübergelegten Objektträgers zerquetscht. Diese Objektträger werden nun in eine Schale mit der Fixierungsflüssigkeit gebracht. Als Fixierungsmittel wird ein von Belling empfohlenes Gemisch verwendet, bestehend aus einer Lösung von 5 g Chromsäure, 50 ccm Eisessig und 320 ccm Wasser (Lösung A) und einer Lösung von 10 ccm Formalin in 175 ccm dest. Wasser (Lösung B), die vor dem Gebrauch zu gleichen Teilen gemischt werden. Die Fixierung der Oenothera-Antheren ist in 2—6 Stunden beendet. Die Objektträger kommen dann in ein Gefäß mit einem Gemisch von 4 Teilen Wasser und 1 Teil der Lösung A, verweilen darin 10—15 Minuten zwecks Entfernung des Formalins und gleichzeitig werden auch die größeren Fragmente der Antheren entfernt. Über 15, 30 und 60 % Alkohol (je 3—5 Minuten Aufenthalt in jeder Lösung) werden die Präparate in 70 % Alkohol übergeführt und in diesem über Nacht belassen. Nun gelangen sie in die Beizflüssigkeit, bestehend aus 1 % Eisenaun in 70 % Alkohol und verbleiben darin wenigstens über 24 Stunden. Nach dem Beizen werden sie $\frac{1}{2}$ —1 Stunde in 70 % Alkohol gewaschen und dann in eine $\frac{1}{2}$ % reife Lösung von Brasilin in 70 % Alkohol übertragen. Die Reifung der Brasilinlösung dauert etwa 1 Woche. In der Brasilinlösung verbleiben die Präparate 2—6 Stunden, nach denen dann in 70 % Alkohol gewaschen und mit 1 % Eisenaun in 70 % Alkohol differenziert. Die Chromosomen erscheinen braunschwarz oder schwarz, das Cytoplasma strohgelb, die Membranen sind farblos. Nach Beendigung der Differenzierung durch Auswaschen in 70 % Alkohol wird über 95 % Alkohol, Cedernöl und Xylol in Canadabalsam eingeschlossen.

J. Kisser (Wien).

Jacobsohn, Irene: Eine neue Vorrichtung zur Färbung von Ausstrichpräparaten. (*Wiss. Abt., Staatl. Serotherapeut. Inst., Wien.*) *Zbl. Bakter. I Orig.* **118**, 110—111 (1930).

Jacobsohn macht auf eine neue, nach ihren Angaben hergestellte Färbvorrichtung aufmerksam, durch die die lästigen Begleitumstände des Färbens von Präparaten, die Manipulation mit den Objektträgern, das Spritzen der Farbflüssigkeiten vollkommen vermieden werden und so eine Zeit- und Arbeitsersparnis erzielt wird. Der Apparat wird genau beschrieben und an einer Abbildung näher erläutert. Er ist käuflich bei der Firma Rud. Bert A.-G. Wien IX, Garnisongasse 9.

Karlowa (Beuthen).^{oo}

Cardamatis, J. P.: Méthode de coloration des plasmodes et des protozoaires qui existe sans changement pendant 25 ans. (Eine Färbung von Plasmodien und Protozoen, 25 Jahre lang unverändert erhalten bleibt.) *Bull. Soc. Path. exot. Paris* **23**, 787—789 (1930).

Hierzu dienen 3 Lösungen: a) eine 1proz. Lösung von Methylenblau. (Höchst mit 0,30 g Natriumcarbonat krystall., pulverisiert kurz vor dem Herstellen der Lösung). Lösung vor Gebrauch 2—3 Tage in einem Thermostat belassen oder 2—3 Monate bei Zimmertemperatur reifen lassen, Temperatur wechselte von 10—25°. b) eine 1proz. Lösung von Methylenblau Höchst, c) eine 1prom. Lösung von eosine B.-A. extra Höchst. Will man färben, so tut man in gesonderten Flaschen erst bzw. 3 ccm von Lösung a, 1 ccm von Lösung b und 1 ccm von Lösung c. An jede Lösung 10 ccm Aqua dest. zufügen. Nun wird schnell Lösung a und Lösung b gemischt, und schließlich das so entstandene Gemisch zur Lösung c gegeben. Nahe dem Boden wird dann dem Endgemisch mit einer Pipette eine gewisse Quantität genommen und diese tropfenweise über die Oberfläche der Ausstriche verteilt. Färbzeit 10 Minuten. Abspülen unter dem Wasserstrahl. — Brumpt, Nattan-Larrier und Laveran bemerken hierzu, daß mit der Methode Laveran-Borrel in 1903—1905 von Laveran selber gefärbte Ausstriche auch jetzt noch nichts von ihrer Frische verloren haben.

Schuurmans Stekhoven (Utrecht).

Cameron, G. R.: The staining of calcium. (Der Nachweis des Calciums.) (*Univ. Hosp. Med. School, London.*) *J. of Path.* **33**, 929—955 (1930).

Verf. hat die üblichen histologischen Methoden des Calciumnachweises an einem „Gelatin-tablet“ untersucht. Hierzu wurde 25 % von alkalischen Erdmetallen, Eisen, Kupfer und Barium befreite Gelatine in kleine Gläser, von 2 cm Durchmesser und 4 cm hoch, gefüllt.

Ein lösliches Calciumsalz wurde auf die Gelatine gegossen und 24 Stunden der Diffusion überlassen. Dann wurde die Oberfläche abgespült und mit einer anderen Lösung, wie Natriumcarbo- oder -phosphat ersetzt, so daß man nach weiterer 24stündiger Diffusion die Liesegang'schen Ringe entstehen sah. So entstanden amorphe und krystallinische Niederschläge in verschiedener Größe bis zu $1\ \mu$. Die Ergebnisse der umfangreichen und umsichtigen Untersuchung lassen sich kurz folgend zusammenfassen: Silbernitrat ist kein Reagens zum Nachweis von Calcium oder Phosphat. Für das Zustandekommen der schwarzen Farbreaktion, wie sie bei verschiedenen Verbindungen entsteht, ist wichtiger das Anionenteil als das Metall. — Spezifisch wirkt das Alizarin und reagiert sehr schnell sowohl in vitro als auch in vivo. Besonders empfindlich ist die Reaktion gegenüber frischen Niederschlägen des Calciumphosphats und Calciumnats, versagt aber häufig bei älteren Niederschlägen, was seine praktische Verwendbarkeit beeinträchtigt. — Hämatoxylin ist überhaupt kein Reagens für Kalk und zeigt lediglich an jenen Stellen an, wo Stoffwechselvorgänge sich abspielen, die zu Niederschlagung des Calciums führen. Die Reaktion, welche an diesen Stellen stattfindet, hängt teils von der Anwesenheit von Eisen ab und betrifft eine eigenartige Grundsubstanz, welche normalerweise im Knochen und Knorpel vorhanden ist und auch bei der pathologischen Verkalkung kommt.

L. Schwarz (Berlin)

Petri, Svend: A new method for counting blood platelets in undiluted citrat plasma. (Neue Methode zur Zählung der Blutplättchen in unverdünntem Citratplasma.) (*Univ. Inst. f. Gen. Path., Copenhagen.*) *J. Labor. a. clin. Med.* **14**, 950 (1929).

Vgl. *Ber. Physiol.* **52**, 601.

● **Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden.** Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. III, Physikalisch-chemische Methoden, Tl. A, H. 10 (Schluß), Liefg. 342. — R. R. Äcker, Günther: Potentiometrische Mikrotitration. — Leuthardt, Franz: Pufferung Puffersysteme. — Brinkman, Robert: Registrierung der Wasserstoffionenkonzentration im strömenden Blut. — Fischer, Hans, und Otto Rebmann: Die Bestimmung von Gasen und Dampfdrücken. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1930. S. XVI, 115 bis 2201 u. 107 Abb. RM. 17.—.

Der Beitrag von G. R. Äcker bringt eine zwar knappe aber übersichtlich und klar geschriebene Einführung in Theorie und Praxis der potentiometrischen Mikrotitration, so wie der Benutzer eines Handbuches es wünscht. (Auf Seite 1916 sind leider mehrfache Druckfehler [Fe, Ti] übersehen worden.) — Der folgende Beitrag „Pufferung und Puffersysteme“ von F. Leuthardt bringt in einem 1. Teile die Einführung in die theoretischen Grundlagen des recht schwierigen Gegenstandes. In der Darstellung schließt sich Verf. der Brönsted'schen Theorie der Säuren und Basen an, beläßt aber aus Zweckmäßigkeitsgründen die klassische Nomenklatur bei. Im 2. Teil berichtet Verf. an Hand von Tabellen und Diagrammen über das gerade für den Laboratorienbedarf wichtige wahre Verhalten von Puffersystemen und seine Abweichungen von den Erwartungen der Theorie. Nach einigen Bemerkungen über Elektrotitration schließt Verf. noch zahlreiche Seiten der für biologische Fragestellungen sehr wichtigen Theorie der Ampholyte (u. a. Protein) sowie mehrphasiger und biologischer Systeme (Blut) gewidmet. Der Beitrag schließt mit einer Besprechung der theoretisch sehr interessanten starken p_H -Verschiebung durch die an sich schwache Borsäure bei Aminosäuren in Glycerin bzw. Formaldehydlösungen. — Die bei der „Registrierung der Wasserstoffionenkonzentration im strömenden Blute“ (R. Brinkmann) auftretenden Schwierigkeiten und deren Beseitigung durch passende Elektrodenwahl und -herstellung werden kurz erörtert. Prinzip und Konstruktion der für die Potentiometrie erforderlichen Apparatur sind dargestellt und schließlich wird kurz ein Wort über die Einführung der Elektroden in die Gefäße gesagt. Photogramme sind beigegeben. — Über „die Bestimmung von Gas- und Dampfdrücken“ (sowie der Stromgeschwindigkeit von Gasen in Röhren) und die erforderliche Apparatur berichten H. Fischer und O. Rebmann in einem größeren Beitrag. Theorie, Anwendung und Abbildung zahlreicher Apparate, deren Auswahl vor allem auch das Interesse biologischer Laboratorien berücksichtigt, sind in übersichtlicher Weise zusammengestellt. Die Lieferung enthält das Sachregister zu Abt. III Teil A 1. und 2. Hälfte. W. Eichler (Jena)

Physikalische und chemische Grundlagen der Lebensvorgänge.

Einwirkungen, Osmose, Permeabilität, Kolloidchemie, Biochemie, experimentelle Pharmakologie, Strahlenwirkung.)

Irwin, Marian: Studies on the penetration of dyes with the glass electrode. II. Penetration into *Nitella* from solutions of cresyl blue, azure B, and methylene blue. (Untersuchungen mit der Glaselektrode über das Eindringen von Farbstoffen. Eintritt der Lösungen von Kresylblau, Azur B und Methylenblau in Zellen von *Nitella*.) (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.*) *Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.* **27**, 991—992 (1930).

Während der Zusatz von 0,07% Kresylblau, Azur B und Methylenblau zu dem extrahierten Zellsaft die Acidität unverändert läßt, tritt bei der Aufnahme dieser Farbe in die lebende Zelle eine Steigerung des p_H ein. Das läßt darauf schließen, daß Kresylblau und Azur B als freie Base in die Zelle eintreten. Im Methylenblau ist Azur B als Verunreinigung stets vorhanden und kann allein eindringen. (Vgl. diese Zeitschr. **14**, 132.)

P. Metzner (Greifswald).

Irwin, Marian: Studies on the penetration of dyes with the glass electrode. III. Penetration into *Valonia* of cresyl blue and azure B. (Untersuchungen mit der Glaselektrode über das Eindringen von Farbstoffen. III. Eintritt von Kresylblau und Azur B in Zellen von *Valonia*.) (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.*) *Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.* **27**, 992—993 (1930).

Die Ergebnisse sind nicht so klar wie bei den vorstehend referierten Versuchen mit *Nitella*. Der Anstieg des p_H innerhalb der Zelle ist geringer als dort; es wird vermutet, daß Säurebildung innerhalb der Zelle wahrscheinlicher ist als die Annahme, daß die Farbstoffe als Salz eindringen.

P. Metzner (Greifswald).

Irwin, Marian: Studies on penetration of dyes with glass electrode. IV. Penetration of brilliant cresyl blue into *Nitella flexilis*. (Untersuchungen mit der Glaselektrode über das Eindringen von Farbstoffen. IV. Der Eintritt von Brillantkresylblau in Zellen von *Nitella flexilis*.) (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.*) *J. gen. Physiol.* **14**, 17 (1930).

Messungen mit der Glaselektrode zeigen, daß bei Aufnahme mit Brillantkresylblau in den Zellsaft eine Steigerung des p_H eintritt. Die Steigerung ist vergleichbar mit derjenigen, die beim Lösen der freien Farbstoffbase im extrahierten Zellsaft bei gleicher Farbstoffkonzentration beobachtet wird. Es wird daher vermutet, daß der Farbstoff nur in Form der freien Base eintritt; er kann aber im Zellsaft wieder in das Salz übergeführt werden. Die Geschwindigkeit der Farbstoffaufnahme ist von der Acidität des Außenmediums und der Vakuolenflüssigkeit abhängig. Durch alkalische Reaktion der Farbstofflösung (Steigerung der Dissoziation) oder geringeres p_H des Zellsaftes (Steigerung der Salzbildung im Zellsaft) wird die Farbstoffaufnahme gefördert.

P. Metzner (Greifswald).

Irwin, Marian: Studies on penetration of dyes with glass electrode. V. Why does azure B penetrate more readily than methylene blue or crystal violet? (Untersuchungen mit der Glaselektrode über das Eindringen von Farbstoffen. V. Warum tritt Azur B besser als Methylenblau oder Krystallviolett ein?) (*Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.*) *J. gen. Physiol.* **14**, 19—29 (1930).

Wie in den vorhergegangenen Mitteilungen wird von neuem konstatiert, daß Azur B als freie Base in die Zellen eindringt, was aus dem Anstieg des p_H zu schließen ist. Auch aus Methylenblau, das Azur B stets als Verunreinigung enthält, tritt hauptsächlich die freie Base in den Zellsaft über. Krystallviolett ist zwischen p_H 5 und 9,2 nur als Salz vorhanden und tritt deshalb auch nur in geschädigte Zellen ein. Die aus den p_H -Messungen abgeleiteten Schlüsse stimmen mit den früher publizierten spektrophotometrischen Ergebnissen überein.

P. Metzner (Greifswald).

Weber, Friedl: Permeabilität der Stomata-Zellen. (Vorl. Mitt.) (*Pflanzenphysiol. Inst., Univ. Graz.*) *Protoplasma* (Berl.) **10**, 608—612 (1930).

Bei Plasmolyseversuchen an Laubblättern verschiedener Pflanzen (*Hyacinthus orientalis*, *Erythronium dens canis*, *Ranunculus ficaria*, *Rumex patientia*), wobei ganze Blätter bzw. größere Blattstücke mit dem Plasmolyticum infiltriert wurden, wurde auffallende Tatsache festgestellt, daß sich die Schließzellen in starken Glycerin-Harnstofflösungen nicht plasmolisieren ließen, während die übrigen Epidermiszellen sowie die Zellen des Mesophylls hohe Grade von Plasmolyse aufwiesen. Die weitere Verfolgung dieser Tatsache ergab, daß das Unterbleiben der Plasmolyse nicht auf einem besonders hohen osmotischen Wert der Schließzellen beruht, sondern diese für Glycerin und Harnstoff ganz wesentlich stärker permeabel sind als die übrige Epidermis und die Mesophyllzellen. Infolgedessen dringen die genannten Plasmolytica so rasch in die Schließzellen ein, daß es entweder überhaupt zu keiner Plasmolyse kommt oder daß die Plasmolyse so rasch zurückgeht, daß sie, wenn nicht sofort beachtet wird, gänzlich übersehen werden kann. Infolge des raschen Eindringens der Plasmolytica in die Schließzellen bei gleichzeitiger Plasmolyse der Nebenzellen findet trotz der stark hypertonen Außenlösung ein Öffnen der Stomata statt, das Übertragen der mit Harnstoff infiltrierten Blätter in Wasser für kurze Zeit noch verstärkt wird. Werden abgezogene Epidermisstreifen in die Harnstofflösung eingelegt, so tritt momentan eine starke Plasmolyse ein, die jedoch rasch wieder zurückgeht und von einer Öffnungsbewegung der Stomata abgelöst wird. Der anfängliche Einbruch der Plasmolyse ist wohl so zu erklären, daß hier der Harnstoff in unverdünnter Konzentration etwas rascher an die Schließzellen herankommt als bei Infiltration der Blätter.

J. Kisser (Wien)

Kahler, H., Floyd de Eds, Sanford Rosenthal and Carl Voegtlin: Electron equilibrium in biological systems. III. The measurement of electrochemical potentials by means of a vacuum-tube static voltmeter which eliminates minute polarization currents. (Über elektrische Gleichgewichte in biologischen Systemen. III. Über Messung elektrochemischer Potentiale mit einem statistischen Vakuumtubusvoltmeter, die augenblickliche Polarisationsströme eliminiert.) (*Div. of Pharmacol., Hyg. Lab., U. S. Public Health Serv., Washington.*) *Amer. J. Physiol.* **91**, 225—237 (1929).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 358.

Ingold, C. Terence: Hydrogen-ion phenomena in plants. IV. Buffers of potato (tuber and leaf.) (Wasserstoffionenphänomene in pflanzlichen Geweben. IV. Puffersysteme der Pflanzensäfte.) (*Dep. of Botany, Queens Univ., Belfast.*) *Protoplasma* (Berl.) **9**, 441—446 (1930).

Der Verf. bestimmte die Titrationskurven einiger Pflanzensäfte und organischer Verbindungen, die als Puffer in Frage kommen, und findet in den Pufferungskurven (erste Ableitung der die Titrationskurve darstellenden Gleichung nach p_H) ein geeignetes Mittel, die Pufferung graphisch darzustellen. (III. Armstrong, vgl. diese *Ber.* **16**, 261.) Franz Leuthardt.

Ingold, C. Terence: Hydrogen-ion phenomena in plants. V. The buffer system of plant juices. (V. Puffersubstanzen der Kartoffel [Knolle und Blätter].) (*Dep. of Botany, Queens Univ., Belfast.*) *Protoplasma* (Berl.) **9**, 447—455 (1930).

Der Verf. kann in der Knolle Asparagin, Oxalsäure, Citronen-, Apfel- und Phosphorsäure nachweisen. Die beiden ersten spielen als Puffer nur eine geringe Rolle. Die 3 letzten bestreiten zwischen p_H 5 und 7 etwa 63% der Pufferwirkung. Sie sind auch die wichtigsten Puffersubstanzen der Blätter.

Franz Leuthardt (Basel).

Ingold, C. Terence: Hydrogen-ion phenomena in plants. VI. Apparatus for measuring the effect of carbon dioxide on the reaction of plant sap. (VI. Apparat zur Bestimmung des Effekts von Kohlendioxyd auf die Reaktion von Pflanzensäften.) (*Dep. of Botany, Queens Univ., Belfast.*) *Protoplasma* (Berl.) **9**, 456—458 (1930).

Der Verf. verwendet einen Rundkolben von 350 ccm Inhalt mit 3fach durchbohrtem Stopfen. Die eine Bohrung enthält die Elektrode (blankes Platin nicht über den Hals des Kolbens hinabreichend), die zweite ein bis zum Boden reichendes Rohr, die dritte ein kurzes Rohr, das bis zum Boden reicht.

bis zum Ende der Bohrung reichendes. Die Röhren werden durch Gummischlauch mit etskahn geschlossen. Die Flasche wird mit Wasser gefüllt, in umgekehrte Lage gebracht und das Wasser durch das zu untersuchende CO_2 -Luftgemisch verdrängt. Dann wird durch kurze Rohr der zu untersuchende Saft (mit Chinhydrin gesättigt) eingefüllt und die Flasche zu seiner Sättigung mit dem Gas geschüttelt. Das kurze Rohr wird nun mit einem Agarheber verbunden, die Flasche in umgekehrte Lage gebracht und durch den Agarheber mit der Gleichselektrode verbunden.

Franz Leuthardt (Basel)._o

Hogben, Laneelot, and Cecil Gordon: Studies on the comparative physiology of contractile tissues. II. The relation of electrolytes to electrical conductivity. (Studien vergleichenden Physiologie contractiler Gewebe. II. Die Beziehung der Elektroden zur elektrischen Leitfähigkeit.) (*Dep. of Zool., Univ., Cape Town.*) *J. of exper. Biol.* 7, 269—285 (1930).

In Anlehnung an Arbeiten von Osterhout über den Einfluß von Kationen auf Kohlrausch-Leitfähigkeit von Laminaria- und Ranageweben untersuchen die Verff. Permeabilität von tierischen Geweben und ihre Beeinflussbarkeit durch spezifische Ionenwirkung. Als Leitfähigkeitsgefäß verwenden sie einen aus 2 Hälften bestehenden Zylinder aus Glas mit einem Innendurchmesser von 5 cm $\times$ 2,3 cm $\times$ 3,1 cm. Zwischen die beiden Hälften können zwei gleiche mit kreisrunden Löchern versehene Glasplatten eingefügt werden. Dadurch wird das Leitfähigkeitsgefäß in 2 Zellen geteilt, die nur durch die kreisrunden Öffnungen miteinander in Verbindung stehen. Zwischen die beiden Glasplatten auf die Öffnungen wird das zu untersuchende Gewebe gelegt, das durch diese Öffnungen mit der Befestigung weitgehend geschont wird. Auf beiden Seiten der Glasplatten werden dicht vor dem Gewebe kreisrunde Platinelektroden angebracht. Mit Hilfe der Kohlrauschmethode wurden in der Brücke nur schlechte Nullpunkte erhalten; die Tonminima im Telefon waren sehr unscharf. Dies beruht nach den Verff. darauf, daß das Gewebestück nicht nur als Widerstand sondern auch als Kondensator wirkt. Führt man in den einen Stromzweig neben den veränderlichen Widerstand eine Kapazität in Serie geschaltete veränderliche Kapazität ein, so kann man mit deren Hilfe die scharfen Nullpunkte einstellen. Verff. berechnen, daß hierfür das Verhältnis der Widerstände umgekehrt proportional dem Verhältnis der Kapazitäten sein muß:

$$R/S = K/C.$$

R = veränderlicher Widerstand.

S = Widerstand des Gewebes.

C = veränderliche Kapazität.

K = Kapazität des Gewebes.

Mit Hilfe dieser verbesserten Versuchsanordnung und unter Ausschaltung aller aktiven und stimulierenden Einflüsse im Stromkreis wurden eine große Anzahl Widerstands- und Kapazitätsmessungen an Geweben von *Xenopus*, *Rana*, *Acanthamoeba* und *Laminaria* in reinen sowie physiologisch äquilibrierten Salzlösungen ausgeführt. Sie waren jedoch in bezug auf die Permeabilitätsfrage tierischer Gewebe wertlos; die Versuche zeigten nur rohe Übereinstimmung untereinander, und die Versuche gelangten zu dem Schluß, daß die Kohlrauschmethode zum Studium der Permeabilitätsfrage tierischer Gewebe ungeeignet ist. Bemerkenswert ist, daß die Beobachtungen, die Osterhout an der Froschhaut und bei *Laminaria* machte, nicht bestätigt werden konnten; während dort reine NaCl-Lösung den Widerstand des Gewebes herabsetzte, Calcium- und Magnesiumchloridlösungen ihn erhöhten, war hier Umgekehrte der Fall. (I. vgl. *Ber. Physiol.* 35, 691.) C. Moser-Egg (Landau [Pfalz])._o

Ewles, J., and J. B. Speakman: Examination of the fine structure of wool by X-ray diffraction analysis. (Untersuchung der Feinstruktur der Wolle mittels Röntgenstrahlenanalyse.) (*Physics Dep. a. Textile Dep., Univ., Leeds.*) *Proc. roy. Soc. Lond. B* 105, 600 bis 610 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 364.

oo

Cooper, H. P.: Ash constituents of pasture grasses, their standard electrode potential and ecological significance. (Aschenbestandteile von Weidegräsern, ihr normales

Elektrodenpotential und ökologische Bedeutung.) (*Dep. of Agronomy, Cornell Univ., Ithaca.*) *Plant Physiol.* **5**, 193—214 (1930).

Die Aschenanalysen von aus verschiedenen Assoziationen stammenden Weidgräsern werden zur Untersuchung herangezogen. Die Analysen ergeben, daß zwischen dem normalen Elektrodenpotential der Elemente und der Menge der verschiedenen Mineralien der Pflanzenasche enge Beziehungen bestehen. Die von fruchtbaren Böden entnommenen Proben enthielten verhältnismäßig große Mengen derjenigen Elemente, die starke Ionen bilden, während die Proben von unproduktiven Böden einen verhältnismäßig geringen Aschengehalt und eine hohe Anzahl Elemente mit schwachen Ionen enthielten. Zwischen K_2O und CaO sowie zwischen CaO und P_2O_5 besteht in der Pflanzenasche eine negative Korrelation. Calcium scheint in negativer Korrelation mit dem starken anionischen Material zu stehen, was vermuten läßt, daß die Pflanzen, die auf alkalischen Böden gedeihen, eine beträchtliche Menge der Hydroxyl- und Carbonationen aufnehmen. Auch zwischen der Stärke der Ionen, die eine Pflanze erträgt, ihrer Schattenverträglichkeit und dem Futterwert bestehen Beziehungen. Pflanzen, die auf fruchtbaren Böden ihr optimales Wachstum finden und starke Ionen beanspruchen, sind nicht sehr schattenverträglich und haben hohen Futterwert, während solche, die auf ärmeren Böden gedeihen und verhältnismäßig große Mengen schwacher Ionen beanspruchen, schattenverträglicher und von geringerem Futterwert sind. Die Bestrahlung kann auf die Ernährung durch Zerlegung von Nährverbindungen und durch Aktivierung verschiedener Stoffe wirksam sein. Es scheint, daß die Bestrahlungsenergie weitgehend die Aufnahme von Calciumphosphat erleichtert. Versuche bekräftigt dies mit einem Hinweis auf den Einfluß des ultravioletten Lichtes auf die Heilung und Verhütung der Rachitis. Da die Organismen in gewissen Grenzen Elemente mit einer positiven oder negativen Ladung als ein besonderes Ion aufnehmen kann, ist es möglich, daß ein Element ein anderes innerhalb einer Gruppe vertreten kann. Die mögliche Substitution schwankt wahrscheinlich je nach Organismus und nach den den Elementen anhaftenden Eigenheiten.

Joris (Bonn)

Runehjelm, Dagmar: Mikro-Eisen-Bestimmungen an chlorophyll-defekten Blätter.
(*Biochem. Inst., Univ. Stockholm.*) *Biochem. Z.* **224**, 481—486 (1930).

In Weiterführung der Arbeiten über die Konzentration der an der Chlorophyllbildung beteiligten Stoffe wie Mg und Katalase wird hier der Gehalt an Gesamt-Fe untersucht, denn außer der Erscheinung der Chlorose dürfte das an Porphyrinresten gebundene Fe einen wesentlichen Bestandteil der Katalase bilden. Zur Bestimmung des Fe wurde die von Friedenthal-Lachs (1911) und Schönheimer-Oshima (1924) ausgearbeitete colorimetrische Rhodanidmethode benützt. — Im Gesamteisengehalt der Gerstenkeimlingen (Albinatypus) läßt sich kein Unterschied zwischen chlorophylldefekten und chlorophyll-normalen Mutanten weder in Keimblättern, noch in Körnern und Wurzeln nachweisen. Eine panaschierte *Tradescantia* hingegen wies einen mehr als doppelt so hohen Gesamteisengehalt als normale Blätter auf. (Vgl. Schönheimer-Oshima diese Ber. 12, 12.)

Heinrich Härdtl (Tetschen-Liebwerd)

Lehman, Arnold J., and E. V. Lynn: The leaf oils of Washington conifers. I. Introduction. (Die Nadelöle der Washingtoner Coniferen. I. Einführung.) J. American Pharmaceut. Assoc. **19**, 840—843 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 541.

Scala, Alberto, e Sofia Jaccarino: Stati acidi e stati alcalini nel chimismo degli esseri viventi. (Acidosen und Alkalosen im Chémismus der Lebewesen.) Ann. Igiene 40, 194—201 (1930).

Verff. zeigten, wie man ein Kolloid (in diesem Falle Gelatine) mit elektropositiver Ladung und der damit zusammenhängenden Fähigkeit, bei Hydrolyse freie Basen zu bilden, mit einer elektronegativen Schicht umgeben und so die Bildung freier Säure erzeugen kann. Es schiebt dies mittels NaCl oder anderer in Wasser löslicher Neutralsalze. Nach wiederholter Behandlung mit Aqua dest. tritt die ursprüngliche alkalische Reaktion wieder auf, die gebildete Säure ausgewaschen wird und die positive Ladung im Inneren des Kolloids nicht

gegriffen, sondern vermehrt wird, denn es werden Kationen zurückgehalten. (Die Versuchspokolle und Größe des p_H nach jeder Waschung sind in der Arbeit angegeben.) Verff. ziehen aus den dargelegten Tatsachen Schlüsse für Physiologie und Pathologie. Störungen, die auf Acidose beruhen, können, da die elektronegativen Ionen sehr beweglich und leicht hydrolysierbar sind, durch Neutralisation und Auswaschung der allmählich gebildeten Säure beseitigt werden, Störungen und Krankheiten, die auf Alkalose zurückzuführen sind, wegen der geringen Hydrolysierbarkeit der Kationen und ihrem Bestreben, sich in der Zelle zu akkumulieren, überaus schwierig zu beeinflussen.

Kolliner (Wien).^o

Yoshimura, Shigeo: Beiträge zur Chemie der Ascaris. (*Inn. Klin., Univ. Nagasaki.*) *Biochem.* **12**, 27—34 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 391.

o o

Solowiew, B. M.: Über das spezifische Gewicht des Affenblutes. (*Anst. f. Wiss. Forsch. d. Affen, Suchum-Kalé, Transkaukasien.*) *Biol. Zbl.* **50**, 116—119 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 603.

o

Bertrand, Gabriel, et Y. Beauzumont: Sur les variations de la teneur en zinc des animaux avec l'âge: Influence du régime lacté. (Über die Veränderungen des Zinkgehaltes der Tiere mit dem Alter. Einfluß der Lactation.) *Bull. Soc. Chim. biol. Paris* **741**—**744**; *Ann. Inst. Pasteur* **45**, 247—250; *C. r. Acad. Sci.* **190**, 1089 bis **1092**. (1930).

Bertrand und Vladesco [*C. r. Acad. Sci. Paris* **173**, 54 (1921) u. **172**, 768 (1921)] zeigten, daß der Zinkgehalt mit dem Alter der Tiere variiert, daß bei den Säugern der Zinkgehalt im ersten Monat der Geburt am höchsten ist, während der Lactation nach und nach abnimmt, um nach Entwöhnung rasch wieder zu steigen. Bei den Erwachsenen bleibt er ziemlich konstant, steigt aber weiter beim Altern und kann dann den Gehalt bei der Geburt übersteigen. Da das Verhalten für die Stoffwechselvorgänge von Wichtigkeit ist, dürfte eine zu lange Lactation schädlich sein. Verschiedene amerikanische Autoren fanden nur minimale Schwankungen im Zinkgehalt bei verschiedenen altrigen Tiere. Aber sie untersuchten nur ganz vereinzelt frischgeborene und mit Milch ernährte Tiere. Auch hegen die Autoren Zweifel an der Exaktheit der Methodik. Denn sie konnten ihre früheren Untersuchungen an der Maus und am Kaninchen in Versuchen mit weißen Ratten bestätigen. Diese Tiere entstammten einer eigenen Zucht, wurden mit einem eingeweichtem Brot und frischer Luzerne, im Winter mit Runkelrüben gefüttert. Die Tiere wurden mit Chloroform getötet, der Darmtractus geleert, die Tiere bei 100° getrocknet, Pyrexkolben mit gereinigter Schwefelsäure und Salpetersäure verascht, zur Trockne verpufft in einer Porzellanschale, der Rückstand mit HCl aufgenommen und gewichtsanalytisch als Calciumzinkat bestimmt.

Alter der Tiere	Zahl der unters. Tiere	Wasser %	Zink in mg in		
			einem ganzen Tier	100 g frisch	trocken
1 Tag	18	82,94	0,373	6,47	37,51
2 Tage	17	82,37	0,336	5,19	29,41
5 „	8	77,04	0,393	4,43	19,29
10 „	6	71,25	0,371	2,73	9,50
15 „	7	73,86	0,411	2,73	10,44
18 „	5	75,27	0,429	2,87	11,60
20 „	4	71,20	0,536	3,28	11,38
25 „	2	67,43	1,337	3,75	11,51
6 Wochen	2	72,75	1,094	3,73	13,67
3 Monate	1	66,67	2,714	3,88	11,64
7 Monate	1	69,01	3,808	3,15	10,16

A. Jung (Basel).^{o o}

Dubuisson, M., et F. Thomas: Recherches sur la distribution du manganèse chez quelques mammifères. (Untersuchungen über die Verteilung des Mangans bei einigen Tieren.) *Ann. de Physiol.* **5**, 857—863 (1929).

Nachdem Dubuisson (vgl. diese Ber. **14**, 421) früher gezeigt hatte, daß pflanzliche Nahrung mit zunehmender Vegetationszeit mehr Mangan enthalten, untersuchen die Verff., ob sich ein analoges Verhalten beim Tier nachweisen läßt. Der Mangangehalt des Herzkreislauks war bei Rindern verschiedenen Alters annähernd konstant gleich 0,21—0,78 mg Mn pro Kilogramm frische Substanz. Offenbar scheiden die Tiere überschüssiges Mangan wieder aus, die Konstanz des Mn-Gehaltes spricht für eine physiologische Bedeutung des Mangans für den Tierkörper. In den Organen von Menschen, die an verschiedenen Krankheiten gestorben sind, fanden sich Manganmengen von 0,35—4,0 mg pro Kilogramm. Eine Deutung für die beobachteten Schwankungen kann nicht gegeben werden.

Lintzel (Berlin).^{o o}

Bierry, H., et B. Gouzon: Dosage du glycogène dans le cœur d'*Helix pomatia*. Glykogengehalt des Herzens von *Helix pomatia*.) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 594 (1927). Vgl. Ber. Physiol. **57**, 392.

Pfeiffer, G.: Die Cholesterine im Strukturverbande des Protoplasmas. IV. M Untersuchungen an der Rinderleber. (Inst. f. Tierphysiol., Landwirtschaftl. Hochschule Bonn-Poppelsdorf.) Biochem. Z. **222**, 214—220 (1930).

Im Anschluß an frühere Untersuchungen (vgl. diese Ber. **11**, 144 u. **15**, 781) wird der Gehalt an Cholesterin in der Leber bei jährigen Rindern ermittelt. Das Gesamtcholesterin weist einen hohen Gehalt an Oxycholesterin und esterifiziertem Cholesterin. Der jeweils hohe Gehalt wird der exkretorischen Funktion des Organs und seinen esterifizierenden Fermenten zugeschrieben. Die verschiedensten Zufuhrmöglichkeiten an Cholesterin in die Leber werden besprochen, und auf die beim normalen Zerfall der Erythrocyten freiwerdende Cholesterinmenge wird hingewiesen. Eine endogen-synthetische Cholesterinbildung in der Leber wird für unwahrscheinlich gehalten. Der Leber wird die Fähigkeit der Cholesterinsynthese zuerkannt, d. h. der Ringkoppelung pflanzlich vorbereiteter Cholesterinbausteine. (III. vgl. diese Ber. **15**, 781.) Jochims (Kiel)

Kotake, Munio, und Yorisaburo Kimoto: Über das Fett aus Cypridina. (Laborat. f. Organ. Chem., Forsch.-Anst. f. Physik u. Chem., Tokyo.) Proc. imp. Acad. (Tokio) **6**, 237—238 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 392.

Paget, Marcel: Nouvelle réaction colorée de l'adrénaline et de l'adrénalone. (Eigene Farbreaktion von Adrenalin und Adrenalon.) (Laborat. de Chim. Biol., Fac. L. de Méd. et de Pharmacie, Lille.) Bull. Sci. pharmacol. **37**, 537—538 (1930).

Lösungen von Adrenalinchlorhydrat (1—5‰) geben mit 10proz. Ammoniummolybdat eine bernsteingelbe bis braunrote Färbung, die durch Zusatz von Soda verschwindet. Eine grünen fluoreszierenden Färbung Platz macht. In entsprechenden Verdünnungen. Adrenalon eine gelbliche Färbung bzw. einen gelben Niederschlag, der bei weiterem Zusatz des Reagens orange wird und sich im Überschuß mit roter Farbe löst. Mit Soda verschwindet die Färbung nicht und es entsteht keine Fluorescenz. K. Fromherz (Basel)

Cannici, G.: Contributo allo studio del glutatione nei teleostei. Osservazioni sul metodo di dosaggio. I. (Beitrag zum Studium des Glutathion bei Teleostieren. Beobachtungen über die Methode der Bestimmung.) Atti Accad. naz. Lincei **11**, 509—515 (1927).

Für die Bestimmung des Glutathion stehen jodometrische Bestimmungen und die Farbreaktion mit Nitroprussid bei Gegenwart von Ammoniak zur Verfügung. Jodometrisch kann nach Vorbereitung mit Trichloressigsäure auf das Auftreten einer Blaufärbung mit Stärke oder bei anderer Versuchsanordnung auf das Verschwinden der Blaufärbung ohne und mit Zusatz von Kaliumjodid [vgl. Perlzweig und Delrue, Biochemic. J. **21**, 1416 (1927)] titriert werden. Der Vergleich fällt zugunsten der Nitroprussidmethode [vgl. Randoïn und Fabry, Bull. Soc. Chim. biol. Paris **9**, 1027 (1927)] aus, obschon auch diese nicht frei von Fehlern ist. Fr. N. Schulz (Jena).

Cannici, G.: Contributo allo studio del glutatione nei teleostei. Nota II. (Beitrag zum Studium des Glutathion bei Teleostiern.) Atti Accad. naz. Lincei **11**, 601—606 (1927).

Für den Glutathiongehalt der Leber ergaben sich bei *Box salpa* (36,75) 45,17 bis (66,81) 43 im Mittel (45,84) 56,35 mg%. *Cyprinus carpio* (24,60) 30,24 bis (44,70) 54,95 im Mittel (36,40) 44,71 mg% normal. *Cyprinus capio* (21,92) 26,98 bis (41,0) 50,43 im Mittel (31,39) 39,19 mg% hungernd. *Salmo gairdneri* (37,94) 46,63 bis (62,14) 76,37 im Mittel (54,66) 66,60 mg%. Die eingeklammerten Werte beziehen sich auf die Dipeptidformel, die offenen Werte auf die neue Tripeptidformel des Glutathion (Hopkins). Fr. N. Schulz (Jena).

Keilin, D.: Cytochrome and intracellular oxidase. (Cytochrom und intracelluläre Oxydase.) (Molteno Inst., Univ., Cambridge.) Proc. roy. Soc. Lond. B **106**, 418—444 (1930). Vgl. Ber. Physiol. **49**, 583.

Thunberg, T.: The hydrogen-activating enzymes of the cells. (Die wasserstoffaktivierenden Fermente der Zellen.) Quart. Rev. Biol. **5**, 318—347 (1930).

Zusammenfassende Übersicht über die Arbeiten von H. Wieland, dem Verf. und H. v. Euler. H. A. Krebs (Altona).

Fujiwara, Akira, und Shigeo Uchida: Über die Dopareaktion. (II. Mitt.) (Univ. Hautklin., Okayama.) Okayama-Igakkaï-Zasshi **42**, 347—355 u. dtsch. Zusammenfassung 356 (1930) [Japanisch].

Untersuchungen über die Bedingungen der Dopareaktion. Das Optimum der

enkonzentration bei Formalinfixierung der Melanoblasten liegt zwischen p_H 6,8—7,5. Sekunden langes Erhitzen in 80° warmem Wasser hebt die Reaktion auf, während die Oxydase der Leukocyten (im fixierten Gewebe) erst beim Kochen nach Minuten verlorengelht. Ultraviolette Strahlen, Alkohol und Aceton schädigen, Röntgenstrahlen, Radium, Chloroform, Äther und Toluol nicht. Die Dopareaktion der Melanoblasten scheint auf einer Fermentwirkung zu beruhen. Bei der Reaktion der Leukocyten ist das noch nicht sicher festgestellt. Alle diese Resultate sind an anderem Gewebe gewonnen. (Mitt. I, vgl. diese Ber. 13, 625.) Bloch (Zürich).

Moschini, Gaetano: Ricerche sulla quantità di fermenti contenuti nel pancreas di alcuni animali domestici (bue montone, suino). (Untersuchungen über die im Pankreas einiger Haustiere [Ochse, Schaf, Schwein] enthaltenen Fermentmengen.) (*Istit. Fisiol., Univ., Perugia.*) Riv. Biol. 11, 601—613 (1929).

Das Pankreas wurde vom Fett befreit und fein gemahlen. Dann wurde der so erhaltene 48 Stunden in einem sterilen Gefäße mit 2proz. Natriumfluorid-Lösung stehen gelassen. Dann wurde der so erhaltene Pankreasextrakt wurden die Untersuchungen ausgeführt. Trypsin wurde nach der Methode von Pignatari (Verflüssigung von Gelatine, Fol. clin. 1. et microsc. (vgl. Ber. Physiol. 44, 575) bestimmt. Im Mittel wurden gefunden: Trypsin aus dem des auf obige Weise hergestellten Pankreasextraktes von Ochs 0,0346 g, Schaf 0,154 g, Schwein 0,66 g. — Die Diastase wurde nach der Methode von Wohlgemuth (Überführung der Stärke in Dextrin) bestimmt. Die diastatische Kraft D wurde dabei gefunden für Pankreasextrakt von Ochs 34,66, Schaf 38,23, Schwein 210. — Die Lipase wurde nach Hanriot (Spaltung von Monobutyrin) bestimmt. Verbrauch an $\frac{1}{10}$ -NaOH nach 8stündiger Einwirkung des Pankreasextraktes von Ochs 4,50, Schaf 3,66, Schwein 8,60. — Das Schweinepankreas enthält die größte Menge von allen 3 Fermenten. Willstaedt (Berlin-Charlottenburg).°°

Blacher, L. J., und W. N. Samarajew: Die Organisationszentren der Hydra fusca L. Quelle mitogenetischer Ausstrahlungen. (*Inst. f. Allg. Biol., II. Staatsuniv. Moskau.*) Biol. Zbl. 50, 624—633 (1930).

Um festzustellen, ob bei Hydra Zentren für mitogenetische Ausstrahlungen vorhanden sind, zerschnitten die Autoren Hydren in 2 Stücke und bereiteten daraus Emulsionen, die als „Sender“ der Ausstrahlungen in Betracht kamen. Als Detektor diente jeweils eine Kultur der Hefe Nadsonia fulvescens. Die Hydrenemulsion wurde dem Detektor entfernt angebracht. Nach 4 Stunden wurden Striche gemacht und pro Glas etwa 1000 Zellen durchgezählt. Das Ergebnis war positiv. Ein Kontrollversuch sollte zeigen, ob etwa die Verletzung bzw. die beginnende Regeneration an den Hydrenhälften die Strahlungen bewirke. So wurde eine ganze Hydra emulgiert und ergab ebenfalls positiven Befund. Die gesonderte Prüfung der einzelnen Körperpartien der Hydra zeigte dann weiterhin, daß Hypostom und Knospungszone strahlen, die Zone zwischen den beiden und der Fuß dagegen nicht. Eine ganze Hydra, mit Mundpol dem Detektor zugewandt, gibt einen Effekt, um 180° gedreht, d. h. mit Fußende dem Detektor zugewandt — dagegen nicht. Wichtig ist die Feststellung, daß der Regenerationsprozeß die Strahlung nicht verstärkt. Die Verf. weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß ja bei der Regeneration der Hydra keine Zellvermehrung stattfindet, sondern lediglich eine Zellverlagerung. Über die Natur der Strahlungen sind die Verf. nicht klar. Da es ihnen gelang, durch eine Beifügung von Cyankali-Natriumhydrenemulsion deren Strahlung aufzuheben, glauben sie, „daß die Ausstrahlung der Organisationszentren auf eine lokale Steigerung der Oxydationsprozesse zurückzuführen ist“. Es ist klar, daß eine derartige „Erklärung“ nicht befriedigen kann, da sie ja höchstens einen „Begleitumstand“ erfaßt und über die Herkunft der Strahlung selber nichts auszusagen vermag. P. Steinmann (Aarau).

Czaja, A. Th.: Zur Frage der Beeinflussung der Liesegangsehen Ringbildung durch Silbernitrat. Biol. Zbl. 50, 577—581 (1930).

Der von W. Stempell angegebene sog. objektive Nachweis der mitogenetischen Ausstrahlungen durch Beeinflussung der Liesegang-Ringe bei der Diffusion von Silbernitrat durch Agarosegelatine wird einer kritischen Nachprüfung unterzogen. Die gleichen Störungen der Ringe und die Verfärbung der Störungszone tritt auf, wenn statt des Breies

der Zwiebelsohle solcher von ausgewachsenen Blättern derselben Pflanze verweird. Die gleichen Störungen der Ringe treten ebenfalls auf, wenn statt des Orbreies angefeuchtete Sägespäne oder Watte mit geringen Konzentrationen von Asulfid in Äthylalkohol getränkt verwendet wurden, höhere Konzentrationen ristarke Diffusionshemmung hervor. Sehr starke Diffusionshemmung, Entquellund Verfärbung der Gelatine sind zu beobachten, wenn statt des Allylsulfids ebenfalls in der Zwiebel vorkommende Allylsenfö in gleicher Weise angewendet v. Aus den Versuchen geht mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß in den Stemschen Versuchen die Störung der Liesegangschen Ringe durch Allylsulfid (oder entsprechende Verbindung des Zwiebelgewebes), die Verfärbung der Störungsaber durch Allylsenfö hervorgerufen wurde. A. Th. Czaja (Berlin-Dahlem)

Iterson jr., G. van, und C. Homan van der Heide: Stempells Versuche zum Nachder mitogenetischen Strahlung mit Hilfe der Liesegangschen Ringe. Proc. roy. AAmsterd. 33, 702—706 (1930).

Sorgfältige Nachprüfung der Stempellschen Versuche, die eine Störung Liesegangschen Ringbildung durch mitogenetische Strahlung nachweisen soll. Ähnlich wie W. Siebert (1930) kommen die Verff. zu dem Schluß, daß die beobacht. Ringstörungen nicht auf strahlende, sondern lediglich auf chemische Fernwirkdes Zwiebelsohlenbreis zurückzuführen sind. (Stempell, vgl. diese Ber. 15, 2; Siebert, 16, 262.) G. Koller (Berlin-Dahlem)

Tokin, P. B., und A. S. Baranenkowa: Über die Ätheröle und die Zellteilu (Vorl. Mitt.) (Laborat. f. Exp. Biol., Zoopark, Moskau.) Biol. Zbl. 50, 633—636 (1930).

Verff. setzten *Nadsonia fulvescens*, sowie Eier von *Physa fontinalis* der Wirk von Dämpfen eines Zwiebelsohlenbreies aus. Dadurch wurde in den meisten Fällen die Sprossungsintensität der Hefekulturen erhöht. Bei den Molluskeneiern wufolgende Abhängigkeit des Effektes von der Einwirkungsdauer gefunden: bis zu 1 Min Beschleunigung der Embryonenbewegung in den Eiern; 3 Minuten zunächst norEntwicklung, jedoch früher oder später Tod der Embryonen; 5—10 sofortiger der Embryonen. Diese Wirkung ist nur mit frischem Brei zu erreichen. Verff. we die Frage auf, ob nicht die bisher unter Anwendung von Zwiebelsohlenbrei beobachte „mitogenetischen“ Erscheinungen auf die Wirkung von Ätherölen zurückzufüh sind, insbesondere weil der bei diesen Versuchen verwendete Schutz gegen chemis Einwirkung ihnen nicht einwandfrei erscheint. A. Luntz (Berlin)

Mayer, Edmund: Die Wirkung der Quarzlampenbestrahlung auf Gewebekultu (Gewebezücht.-Laborat., Path.-Anat. Abt., Städt. Krankenh. am Urban, Berlin.) Virch Arch. 277, 263—304 (1930).

Kulturen von Hühnerfibroblasten erleiden durch Ultraviolettbestrahlungen Wachstumshemmung, die im Gegensatz zur Röntgen- und Radiumwirkung unmittel nach der Bestrahlung einsetzt. Nach intensiven Bestrahlungen hört das Wachst endgültig auf, nach schwächeren Bestrahlungen nur vorübergehend. Außer der Sof wirkung kommen als Spätwirkung erneute Wachstumsstillstände vor. Die Beobacht der Strahlenwirkung wird dadurch kompliziert, daß die einzelnen Zellen verschie reagieren und daß allem Anschein nach eine Auslese unter den Zellen stattfindet. Auffä ist eine starke Fettanhäufung in älteren Zellen nach der Lichteinwirkung. Rothman.

Chemin, E.: Action des radiations ultraviolettes sur les spores et les germinati des floridées. (Einfluß von Ultraviolettbestrahlungen auf die Sporen und Keimli der Floriden.) C. r. Acad. Sci. Paris 191, 727—729 (1930).

Kurze Mitteilung über den schädlichen Einfluß, der durch Bestrahlung von 5 15 Minuten ausgelöst, sich nach einigen Stunden durch Entfärben und völlige Desorga sation geltend macht. Benutzt wurde eine „Gallois“-Lampe, Typ NL. (Wechselstr 110 Volt, Stromstärke 2,5 Amp.). Versuchsobjekte waren: *Gelidium latifolium*, *C lithamnion corymbosum*, *Griffithsia corallina*, *Schizymenia Dubyi*, *Monospora pe cellata*.

E. Stein (Berlin-Lichterfelde)

Jüngling, O., und H. Langendorff: Über die Wirkung verschieden hoher Röntgenstrahlen auf den Kernteilungsablauf bei *Vicia faba equina*. (Röntgenlaborat., Techn. hochsch. u. Chir. Abt., Städt. Katharinenhosp., Stuttgart.) Strahlenther. 38, 1—10 (1930).

Der Tagesrhythmus der Kernteilungen wurde an Wurzelspitzenschnitten aus Zuckerrüben nach je 2 Stunden verfolgt. Er ergab im Normalverlauf ein Tagesmaximum und ein nächtliches Minimum. Zur Bestimmung der Mitosenziffer diente das jedesmalige Verhältnis zwischen Ruhekerne und Mitosen. Dann wurden die Veränderungen der Tagesrhythmischen Kurve nach schwachen Röntgenbestrahlungen bestimmt (Röhre mit Iridiumberkeleinstrahlung, $\lambda = 0,56 \text{ \AA}$, Bestrahlungszeit für 100 R = 4 Minuten 30 Sekunden bis 5 Minuten 30 Sekunden). Eine Dosis von 40 R, die weder makroskopisch noch mikroskopisch wahrnehmbare Veränderungen hervorruft, ergibt innerhalb eines Tages ein Maximum, es wurde eine Beschleunigung des Kernteilungsablaufs gefunden. Bei 80 R zeigte die Kurve eines Tages 3 Gipfel. Bei höheren Dosen bestand der Primäreffekt in einer Abnahme der Teilungen bis zu ihrem völligen Stillstand, sekundär traten dann wieder abnorme Figuren auf. Mehr als 420 R (für 90% der Wurzeln tödlich) und 550 R zeigten einen schwach wellenförmig abklingenden Verlauf der Teilungsvorgänge zur Folge, in denen ein Tagesrhythmus nicht mehr erkennbar ist. E. Stein (Berlin).

Tiffeneau, M., Jeanne Lévy et D. Broun: Influence exercée par les variations de la réaction du milieu intérieur chez l'épinoche sur l'action d'un hypnotique barbiturique (Sonéryl). (Einfluß von Reaktionsänderungen des inneren Milieus beim Stichling auf die Wirkung eines Barbitursäurenarkoticum des Sonéryl.) Paris méd. 1930 I, 583—590.

Die Untersuchungen schließen an die frühere Beobachtung an, daß die Wirkungsstärke der Narkotica abhängig ist von der Reaktion. Bei saurer Reaktion ist die Wirksamkeit vermindert. Zur Klärung der Ursachen dieser Abhängigkeit (eventuell Veränderung der Empfindlichkeit der nervösen Zentren oder Veränderungen der Verteilung oder der Permeabilität) wurden am Stichling vergleichende Untersuchungen über die Geschwindigkeit der Lähmung sowie der Erholung in wechselnden Konzentrationen und bei verschiedener Reaktion unternommen. Als Narkoticum wurde ein Barbitursäurederivat, das Sonéryl, verwendet. In neutralen Lösungen wurde zunächst die Abhängigkeit der Zeitwerte von der Konzentration bestimmt. Die Lähmungsgeschwindigkeit nahm dabei zu mit Steigerung der einwirkenden Konzentrationen, während die Erholungsgeschwindigkeit mit steigender Dosierung abnahm. Bei einer Konzentration von 1/1450 Sonéryl waren Lähmungs- und Erholungszeiten annähernd gleich groß. Verff. folgern aus diesen Versuchsergebnissen zunächst, daß etwaige Verschiebungen der Zeitwerte bei Einwirkung gleich konzentrierter Lösungen unter verschiedenen Bedingungen folgende Ursachen haben können: eine kürzere Lähmungszeit sei der Ausdruck einer Permeabilitätssteigerung oder einer erhöhten Empfindlichkeit der nervösen Zentren. Eine längere Erholungszeit sei der Ausdruck einer geringeren Bindung der Substanz im Nervengewebe oder im Blut. (Verff. berücksichtigen nicht die Möglichkeit einer beschleunigten Aufnahme bzw. Ausscheidung des Narkoticums mit Veränderungen der Atmung, woraus sich die genannten Ergebnisse vielleicht zwangloser erklären ließen. Ref.) Der Einfluß der sauren und alkalischen Reaktion wurde geprüft, indem die Zeitwerte bei Einwirkung einer bestimmten Konzentration (1/1400 Sonéryl) unter Zusatz von 1/1000 bzw. 1/750 Milchsäure oder 1/3000 Natriumcarbonat verglichen wurden mit den Zeitwerten in neutraler Lösung der gleichen Konzentration des Narkoticums. Es ergab sich, daß der Säurezusatz die Lähmungszeit und die Erholungszeit erheblich verkürzt (9 und 8 Minuten statt 26 und 87 Minuten). Auch Säureveränderung war in ähnlicher Richtung, nur weniger stark, wirksam. Alkalische Reaktion bei gleicher Versuchsanordnung verlängerte die Lähmungszeiten deutlich, beeinflusste aber die Erholungszeit nicht wesentlich. — Verff. deuten diese Befunde dahingehend, daß durch die Säurewirkung die narkotische Empfindlichkeit vermehrt und durch Alkalieinwirkung diese vermindert wird. Lendle (Leipzig).

McKinley, Earl B., and Margaret Douglass: Further note on the salivary gland secretion of *Aedes aegypti*. (Weitere Mitteilungen über die giftige Speicheldrüse von *Aedes aegypti*.) (School of Trop. Med., Univ., Porto Rico.) Proc. Soc. exper. Biol. Med. 27, 845—846 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 511.

Kengragsat, Sanit: Recherches des venins dans la série animale (invertébrés) au Cambodge, qui se composent des aranéides, des scorpionides, des myriopodes et des insectes. Untersuchungen über tierische Gifte Siams. Wirbellose: Spinnen, Skorpione, Myria-

poden und Insekten.) (*Inst. Pasteur, Bangkok.*) Rev. Path. comp. et Hyg. gén. 515—523 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 511.

Duhig, J. V.: The nature of the venom of „*Synanceja horrida*“ (the stonefish) (Die Natur des Giftes von *Synanceja horrida*.) (*Brisbane a. District Laborat., Queensland.*) Z. Immunforsch. 62, 185—189 (1929).

Genaue Untersuchung über den Giftapparat dieses Fisches und toxikologische Prüfung des Giftes. Die Giftsäcke sitzen in den dorsalen Flossenstacheln, die bei erwachsenen Exemplaren 3 cm lang sind. Die Giftsäcke liegen am oberen Drittel des Stachels, paarweise geordnet, und sind 1 cm lang und 0,25 cm breit. Das Gift hat neurotoxische und hämolytische Wirkung. 0,03 mg bewirken nach subcutaner Einspritzung bei Meerschweinchen von 3 deutliche Vergiftungserscheinungen, vor allem Lähmung des Zwerchfells, Verschwinden Cornealreflexes und Lähmung der Extremitätenmuskulatur. Das Gift von *Synanceja horrida* erinnert an Kobragift. Die roten Blutkörperchen von Meerschweinchen werden hämolysiert, dagegen hemmt stark verdünntes Serum dieser Tiere die Hämolysierung durch das Gift. *Synanceja horrida* soll der giftigste Fisch in den Gewässern von Queensland sein. Flury (Würzburg).

Zellen- und Gewebelehre.

Morphologie und Physiologie der Zellen und Gewebe.

(*Cytologie, allgemeine Histologie, Histopathologie.*)

Collin, Remy: Croissance rythmique et division cellulaire. (Rhythmisches Wachstum und Zellteilung.) Conférences Labor. Microbiol. Fac. Pharmacie Nancy 1930, 143—150.

Eine knappe, klare und sachkundige Darstellung des im Titel angegebenen Problemkreises. Verf. stellt sich auf den Standpunkt der Protomerentheorie Heidenhains mit der Einschränkung, daß die kleinsten Teilkörper nicht selbst lebende, sondern mit einem Teil der Lebenseigenschaften begabte Mikromeren sind. Wassermann.

Caffier, P.: Über das Verhältnis der Zellachse zur Achse der Teilungsspindel der Mitose menschlicher Zellen in vitro. (*Univ.-Frauenklin. u. Inst. f. Exp. Zellforschung Charité, Berlin.*) Arch. exper. Zellforsch. 10, 260—266 (1930).

Langgestreckte, stereotropisch ans Deckglas geschniegte explantierte Bindegewebszellen aus der embryonalen Lunge zeigen wie den Zelleib auch den Kern stets parallel zum Deckglas abgeplattet. Bei ihren Mitosen kommt die normale Verkürzung und Abrundungstendenz an Zelle und Kern erst gegen die Anaphase hin zu deutlicher Wirksamkeit und Ausprägung. Offenbar infolgedessen stellt sich erst in diesem Stadium die Spindelachse der großen Zellachse parallel: noch in der Metaphase findet man Mutterstern mit seiner Fläche derjenigen des Deckglases parallel gelagert. L. Brücke.

Scott, Gordon H.: The disposition of the fixed mineral salts during mitosis. (Verteilung der fixierten Mineralsalze während der Mitose.) (*Dep. of Anat., Washington Univ. School of Med., St.-Louis.*) Bull. Histol. appl. 7, 251—256 (1930).

An einem Material von Zellen der Haut von Kaulquappen, sowie aus dem Hoden der weißen Ratte versuchte Verf. die Methode der Mikroveraschung mit der gewöhnlichen Färbetechnik unter Anwendung starker Vergrößerungen zu vereinigen. Schnitte des mit Alkohol fixierten Gewebes wurden abwechselnd verascht und gefärbt. Der Gerüstkern der Amphibienzellen enthielt kleine Klumpen von Asche, welche Chromatinschollen entsprachen. In den Hodenzellen waren die Aschenansammlungen mehr auf die Kernwand beschränkt. Der Nucleolus war in den veraschten Kernen immer gut abgegrenzt. In den Prophasenstadien ergaben sich Aschenbezirke von Stöcker- oder Bandform, in der Anaphase entsprachen sie den Chromosomen, in der Telophase war die Asche gleichmäßig im Kern verteilt. Bei den Metaphasenstadien ist bis jetzt die vollkommene Veraschung nicht gelungen, die Kerne enthielten immer noch mehr oder weniger organische Substanz; der Grund für diese Besonderheit ist unbekannt. Aus den erhaltenen Kernbildern läßt sich der Schluß ziehen, daß die fixierten Mineralsalze in ihrer Verteilung bei der Mitose in der Hauptsache den Chromatinstoffen folgen.

Wassermann (München).

Pfuhl, Wilhelm: Untersuchungen über zweikernige Zellen. I. Mitt. Die Berechnung der zweikernigen Zellen nach der Auszählung im mikroskopischen Schnitt. (*Anat. t., Univ. Greifswald.*) *Z. mikrosk.-anat. Forschg* 22, 557—578 (1930).

Die zweikernigen Zellen besitzen eine erhebliche Wichtigkeit für mancherlei zellphysiologische Fragen, z. B. für das Hertwigsche Gesetz von der Beständigkeit des Cytoplasmaverhältnisses, für die Heidenhainsche Teilkörpertheorie und für die Amitose-theorie. Praktisch wichtig sind die zweikernigen Zellen, weil bei vielen pathologischen Vorgängen eine Vermehrung derselben eintritt. Die Zahl der zweikernigen Zellen in einem Gewebe läßt sich nicht durch einfache Auszählung im mikroskopischen Schnittmitteln, da das Mikrotommesser sehr viele Zellen so zerschneidet, daß beide Kerne zusammen oder mit ihrem größten Durchmesser in 2 verschiedenen Schnitten liegen. — Die Wichtigkeit der zweikernigen Zellen macht es notwendig, daß wir uns nicht mit einer einfachen Auszählung im Schnitt begnügen, die ja immer zu niedrige Resultate liefert, sondern daß wir stets die wirkliche Zahl der zweikernigen Zellen berechnen. — Der Fehler, den wir machen, wenn wir uns mit der einfachen Auszählung im Schnitt begnügen, ist um so größer, je dünner die Schnitte und je größer Durchmesser und Abstand sind. In 5μ dicken Leberschnitten wird beispielsweise nur wenig mehr als ein Drittel der wirklich vorhandenen zweikernigen Zellen durch die Auszählung erfaßt. — Bei der Auszählung im Schnitt, die die Grundlage für die Berechnung bildet, werden nur solche Kerne berücksichtigt werden, deren Mittelzone getroffen ist. Wir kennen die Mittelzone an der Größe des Durchmessers sowie an der Scharfeinstellung und dunklen Färbung der Kernmembran. — Die Berechnung erfolgt aus der Zahl, die durch Aufzählung im Schnitt gefunden wurde, aus Kerndurchmesser + Kernabstand und der Schnittdicke. Berücksichtigt werden muß auch die Entfernung, die ein Kernmittelpunkt außerhalb des Schnittes liegen darf, wenn der Kern noch „Mittelschnitt“ gezählt werden soll. Diese Entfernung beträgt etwa $\frac{1}{3}\mu$. — Da wir bei der Berechnung der Zahl der zweikernigen Zellen uns etwas wieder herstellen, was das Mikrotommesser zerstört hatte, so können wir von einer Methode der mathematischen Rekonstruktion sprechen.

Fr. Th. Münzer (Prag).

Abele, Karl: Untersuchungen über die Nucleolen. *Protoplasma* (Berl.) 10, 550—567 (1930).

Die Arbeit soll einen Beitrag darstellen zur Frage über die Verteilung der Nucleolen in der Nucleolarsubstanz auf die Tochterzellen während der Kernteilung und über die Neubildung von Nucleolen. Als Untersuchungsmaterial diente *Vicia amphiparva*, *Panicum californicum* (Wurzelspitzen) und *Helodea canadensis* (vegetationskegel). In einer 9 Seiten langen Tabelle werden die Messungen an 350 Nucleolen veröffentlicht. Als Ergebnis wird mitgeteilt: Die Nucleolarsubstanz wird bei der Karyokinese in gleichen Mengen auf die Tochterzellen verteilt, infolgedessen sind die Nucleolen oder Nucleolensätze beider Tochterkerne gleich groß. Sie sind auch in ihrer Anordnung in Zahl, Form und Anordnung ähnlich. Jeder Nucleolus hat seinen Platz in der anderen Tochterzelle. In der ersten Zeit nach der Kernteilung liegen die Nucleolen in einer Ebene, die der Äquatorialplatte der karyokinetischen Spindel parallel ist. Die Nucleolen können verschmelzen. Es sind aber auch alte Zellen anzutreffen, die eine höhere Nucleolenzahl im Kerne führen. Eine Neubildung von Nucleolen außerhalb der Kernteilung wurde nicht beobachtet. Die Nucleolen von *V. amphiparva* sind rundlich, beide in einem Kern annähernd gleich, die von *P. cal.* länglich, die von *canad.* rundlich. Hier variiert die Nucleolengarnitur in einem Kern sehr stark in ihrer Größe. In vielen Fällen läßt sich ein besonders großer Nucleolus von 1 oder 2 kleineren unterscheiden.

W. Albach (Gießen).

Weber, Friedl: Vakuolenkontraktion und Protoplasmaentmischung in Blütenblättern. (*Pflanzenphysiol. Inst., Univ. Graz.*) *Protoplasma* (Berl.) 10, 598—607 (1930).

Verf. berichtet über seine an den Zellen der Blütenblätter von *Thea japonica* gemachten Beobachtungen. Zieht man von den Blütenblättern ober- und unterseits

Epidermisstreifen ab und untersucht sie in Leitungswasser, so sieht man an a lebend gebliebenen Zellen Vakuolenkontraktion gleichmäßigen und starken Gra Auch an abgefallenen, vollkommen lebensfrischen Blütenblättern ist diese Kontrak zu beobachten. Die Blütenblätter bleiben noch wochenlang am Leben, turges und äußerlich unverändert frisch. Die Vakuolenkontraktion ist demnach als phylogische Alterserscheinung zu deuten. Werden die Epidermiszellen, welche Vakuolenkontraktion zeigen, plasmolysiert, so stellen sich im Cytoplasma auffällige strukturelle Veränderungen ein, die als Entmischung bezeichnet werden. Es entstehen dabei fest stark lichtbrechende Fäden, die sich verdicken und spiremartig untereinander verschlungen sind. Sie zerfallen schließlich in zahlreiche Tröpfchen. Bei langsamer Deplasmolyse erweisen sich die Veränderungen als reversibel, so daß schließlich wieder homogene, optisch leere Cytoplasmateile resultieren. Es wird auf die morphologische Ähnlichkeit dieser Vorgänge und Gebilde mit der tropfigen Entmischung des Zellsaftes einerseits und mit der Bildung von kinoplasmatischen Fäden andererseits, sowie mit anderen Cytoplasma- und Zellkernbildungen hingewiesen. W. Albach (Gießen).

Keil, Rudolf: Über systolische und diastolische Veränderungen der Vakuole in den Zellen höherer Pflanzen. (Botan. Inst., Univ. Gießen.) Protoplasma (Berl.) 568—597 (1930).

Verf. stellte nähere Untersuchungen über die Erscheinung der Vakuolenkontraktion an, besonders im Hinblick auf die Geschwindigkeit des Eintrittes, der Dauer, und der Veränderungen, welche die Vakuolen während und nach ihrer Kontraktion erfahren können. Als Objekte dienten Epidermen von *Allium cepa*, Kronblätter von *Boraginaceae* und Tentakel von *Drosera capensis*. Folgende Arten der Kontraktion wurden beobachtet: 1. Die Vakuolenwand weicht nicht konvex gerundet von der Plasma zurück, sondern bleibt punkt- oder streckenweise an diesem haften (wundnahe Zellen) 2. Die Kontraktion erfolgt 30—60 Minuten nach Anfertigung des Präparates und geht innerhalb 1 Stunde wieder zurück (Systole und Diastole). 3. Nach 10—20 Minuten zieht sich die Vakuole mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit zusammen, bis sie sich nach einem längeren Stillstand mit geringerer Geschwindigkeit wieder ausdehnt. Durch die Diastole wird in der Mehrzahl der Fälle das ursprüngliche Volumen nicht erreicht. Eine 2. Systole kann folgen. Sämtliche Arten werden als Reaktion auf einen Wundreiz angesehen und bestehen in einer Volumzunahme des Protoplasmas. Die Latenzzeit ist sehr unterschiedlich. Ebenso der Verlauf von Systole und Diastole. Die Faktoren, welche die Geschwindigkeit beeinflussen, konnten nicht ermittelt werden. Im allgemeinen verlieren die systolischen und diastolischen Bewegungen im Lauf der Zeit an Energie. Auch wiederholte Erschütterungen (durch Klopfen) veranlassen Kontraktion an intakten Zellen. Der Kontraktionsort liegt in der Regel von der Wundreizstelle abgekehrt. Für die Kontraktion ist die Anwesenheit „tropfbar flüssigen Wassers“ als Außenmedium erforderlich. Sauerstoff darf fehlen. Die Kontraktion der Vakuole scheint durchweg mit einer Permeabilitätsänderung der äußeren Plasmahaut verknüpft zu sein. Fixierungsmittel wirken in den Zellen zuvorderst in denen Vakuolen sich kontrahiert hatten. Der Arbeit sind zahlreiche Tabellen und Kurven beigegeben, die den Verlauf der Kontraktionen erläutern. W. Albach (Gießen).

Koch, Anton: Über das Vorkommen von Mitochondrien in Mycetocyten. (Zool. Inst., Univ. Breslau.) Z. Morph. u. Ökol. Tiere 19, 259—290 (1930).

Verf. hat auf breiter Basis das stete Vorkommen von Chondriosomen in tierischen Mycetocyten zu bestätigen versucht. Untersucht wurden daraufhin: *Periplaneta orientalis*, *Sitodrepa panicea* L., *Aphis rumicis* L., *Pseudococcus citri* Risso und *Phyllaenus leucopthalmus* L. Mit den verschiedensten Fixierungs- und Färbungsmethoden hat Verf. die Mitochondrien darzustellen versucht. Gute Resultate erzielte er mit Zenker-Formol nach Helly, Chromoformol nach Régaud und mit Chrom-Osmiumgemischen von Benda und Altmann und die klarsten Bilder bei Färbung mit dem Altmannschen Säurefuchsin und nachfolgender Differenzierung in Pikrinsäure-Alkohol.

in 1proz. wässriger Methylgrünlösung (nach Bensley). An Hand seiner Untersuchungen und der Befunde der neueren Literatur beleuchtet Verf. kritisch das Tatzenmaterial von Wallin und kommt zu einer ablehnenden Haltung gegenüber lins Anschauungen von der symbiontischen Natur der Mitochondrien. So hat Mitochondrien gut neben Symbionten aber nur nach Fixierung von Benda, aud oder Zenker-Formol nicht nach Bouin, Carnoy, Petrunkewitsch oder oz. Alkohol nachweisen können. Der rasche Formenwechsel der Mitochondrien ergleich zu der großen Zeitspanne, die bei einer Formenveränderung der Bakterien notwendig ist, mindestens doch mehrere Stunden, läßt ebenfalls einen Unterschied zhen Mitochondrien und Bakterien erkennen. Wallin hat auch das Symplasmaungsvermögen der Mitochondrien als Beweis für ihre Mikroorganismennatur an- art, bei der Bildung des Nebenkernes. Auch diese Tatsache hat Verf. entkräftet. nach Wallin die Mitochondrien den höchsten Grad symbiontischer Anpassung cht haben, die Symbionten aber nur in den seltensten Fällen mit Sicherheit ge- tet werden konnten, liegt die Möglichkeit ihrer Züchtung nach dem Verf. kaum im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Ein genetischer Zusammenhang der von lin gezüchteten Mikroorganismen aus den Leberzellen mit Chondriosomen sei doch sehr in Frage zu stellen.

Pfeiffer (Breslau).

Bouygues, H.: La pression de la zone cambiale proprement dite de la tige a-t-elle influence sur l'orientation des cloisons de l'assise phellogénique? (Hat der Druck Cambiumzone einen Einfluß auf die Richtung der Wände des Phellogens?) Bull. bot. France **77**, 374—383 (1930).

Kny gelang der Nachweis, daß man durch Zug bzw. Druck die Richtung der Kernungsfigur in Pflanzenzellen und damit die der Teilungswand festlegen kann. Die ngswand liegt in der Richtung des Druckes. Der Verf. wundert sich nun darüber, ie Teilungswände in den Phellogenzellen in perikliner Richtung verlaufen und nicht tikliner (oder wie er sagt „radialer“), obwohl durch die Zellteilungen in der Cam- zone (Dickenwachstum) auf die Phellogenzellen ein Druck in radialer Richtung übt werden soll. Bei der Durchsicht einer Reihe von Präparaten stellt sich dann lings heraus, daß durch die in der Rinde zwischen Cambium und Phellogen liegen- Sclerenchym- und Collenchymschichten und durch dicht gelagerte Oxalatkrystalle Cambiumdruck abgefangen wird. Die Phellogenschicht ist also gar nicht einem len Druck ausgesetzt, eine vorherrschend antikline Richtung der Teilungswände Phellogenzellen also auch nicht zu erwarten. — Die tangentialen Zugspannung, as Phellogen beim Dickenwachstum auszuhalten hat und die zum Zerreißen des ogenrings führen müßte, wenn er nicht durch antikline Teilungen seinen Umfang ößerte, bleibt bei den Überlegungen des Verf. unberücksichtigt. *Schneider* (Breslau).

Chadefaud, M.: Observations cytologiques sur les confervacées. (Cytologische Be- ntungen an den Coniferen.) Bull. Soc. bot. France **77**, 358—366 (1930).

Die Zellen von *Conferva bombycina* enthalten ein Cytoplasma und besonders r Nähe des Zellkerns Anhäufungen kleiner Kügelchen, die eine große Affinität en gebräuchlichsten Vitalfarbstoffen aufweisen. Das „perinucleäre“ Protoplasma, m sie sich meistens befinden, ist von dem übrigen durch eine spumöse Zone ge- t. Ihr Durchmesser ist kleiner als 1μ , ihre Gestalt nicht immer kugelförmig. Anordnung um den Kern scheint mit der Polarität der Zelle im Zusammenhang ehen, wie sich auch aus derselben Anordnung in den Zoosporen vermuten läßt. G teilt dann die färberischen und mikrochemischen Reaktionen mit, die er auch an onfervaceen: *Ophiocytium cochleare* festgestellt hat. Vermutlich sind diese de Tannoidexkrete, doch können sie auch irgendwelche Speicherorgane dar- n. Sie erinnern sehr an die „Physoden“ der Phaeophyceen und das Vakuom cher Zellen. Allgemein läßt sich sagen: Die Confervaceen scheinen durch ihre eichen, plattenförmigen, homogenen, pyrenoidfreien Chromatophoren, durch ihre eugeln und die beschriebenen „Physoden“ charakterisiert. Oft sind die Vakuolen

mit einer Art Krystallsand erfüllt. Sie gehören weder zu den Protococcaceen, noch den Ulvaceen oder Ulothrichaceen. Vieles erinnert an die Phaeophyceen, so auch gelbe Thallusfarbe und die heteroconten Zoosporen. W. Albach (Gießel)

Schlottke, Egon: Zellstudien an Hydra. I. Altern und Abbau von Zellen und Kernen. (Zool. Inst., Univ. Rostock.) Z. mikrosk.-anat. Forschg 22, 493—532 (1930).

Es werden die Altersvorgänge verschiedener Zellarten bei *Hydra vulgaris* att. Pall. verfolgt. Die Fußdrüsenzellen, deren Entstehung aus den interstitiellen Zellen kurz sog. I-Zellen, man leicht verfolgen kann, zeigen nach Erreichung des Endpunktes ihrer Funktion eine Altersdegeneration, die mit deutlicher Kernpyknotose beginnt. Das fein verteilte Chromatin geht in den Zustand stärker färbbarer Kügelchen (Feulgensche Reaktion wurde vielfach angewendet) über. Die Zelle zieht sich zur Abkuglung an die Stützlamelle zurück und wandert durch diese ins Entoderm, so durch den Aboralporus, dessen konstantes Vorkommen bestätigt wird. Die Wanderung durch die Stützlamelle ist dank deren gallertiger Beschaffenheit möglich, vorgegebene Löcher gibt es nicht. Die Entodermzellen nehmen die degenerierenden Elemente von der Basalseite her auf, welche Fähigkeit sie neben der, von der freien Seite aus dem Gastralraum Nahrungskörper aufzunehmen, besitzen. Die degenerierenden Zellen werden verdaut, was wohl durch den Mangel entsprechender Antifermente möglich ist. Schließlich treten dicht an dem abzubauenden Chromatin schwache Körnchen auf, deren Guaninnatur ausführlich begründet und auf die purinkörperartigen Komponenten des Chromatins zurückgeführt wird. Bei den Nesselzellen finden analoge Vorgänge statt. Da die Knide selbst ein komplizierter Apparat mit einem starken spezifischen Kolloidgehalt ist, wird aus der allgemeinen Erfahrung über Altern der organischen Kolloide die Wahrscheinlichkeit abgeleitet, daß die nichtbrauchbaren Kniden bald altern dürften. Tatsächlich zeigen alle die zahlreichen Entoderm vorfindlichen Nesselzellen Degenerationerscheinungen, und zwar in der Form, daß zuerst in der Knide selbst der Abbau beginnt und die Kernpyknotose später eintritt, was die Priorität des Altersvorganges in der Knide gegenüber dem Karyokinesis beweisen soll. Verf. schließt, daß die Lehre von der Wanderung der Kniden durch das Entoderm an ihren Bestimmungsort nicht richtig sein kann, da man sonst im Entoderm auch normale, nicht alternde Nesselzellen finden müßte. Die Wanderung kann also nur durch das Ektoderm erfolgen. Ektodermale Epithelzellen und entodermale Drüsenzellen altern gleichfalls unter Erscheinungen der Kernpyknotose und mit Guaninkörperbildung. Die Entodermzellen altern unter Karyolyse (allmähliches Schwinden der Nuclealreaktion, Aufhellung des Kernes) und ohne nachweisbare Guaninkörperbildung. Auch die in das Ei aufgenommenen I-Zellen degenerieren mit Karyolyseerscheinungen, doch betrifft das nur die in unmittelbarer Einähe gelegenen Zellen. Was später die I-Zellen ins Ei einrückt, zeigt Pyknotose, die um so früher eintritt, je weiter die I-Zelle vom Ei entfernt liegt. Die cytolisierten Zellen verschmelzen mit dem Ei, die pyknotischen wandern in das Ei ein bzw. werden von diesem aufgenommen und werden zu Pseudozellen. Das Ei nimmt aus dem Entoderm nicht nur flüssige, vorverdaute Nahrung auf, sondern auch feste, durchwandernde Elemente, z. B. I-Zellen. Spermien, die im Hoden selbst degenerieren, zeigen zwar Pyknotose, aber keine Guaninkörperbildung, in denen aber, die ins Entoderm einwandern und dort verdaut werden, treten Guaninkörper auf. Im Entoderm kann geformte Nahrung zirkulieren, sei es, daß sie von Zelle zu Zelle weiter gegeben wird (z. B. Spermien, die bis ins Tentakelentoderm gelangen können), sei es, daß distale Entodermzellpartien mit Nahrungsinhalt abgeschnitten und von anderen Entodermzellen wieder aufgenommen und verdaut werden. Transport von Zelle zu Zelle wird wahrscheinlich durch eine Art syncytialen Verbindungsbandes der distalen Zellenden bewirkt. Unter der Annahme, daß nur Zellen mit ersetzbaren Dauerdifferenzierungen altern können und daher ein Organismus sich immer von neuem verjüngen kann, wenn er imstande ist, alle seine Organe auszuwechseln, auf Grund eines vorhandenen Fonds von undifferenziertem Material, werden die I-Zellen

potentiell unsterblich bezeichnet, somit die Hydra als Ganzes auch. In diesen Tieren gewissermaßen ein ganz geringer Grad von Individualität verkörpert, der sogar leicht geringer ist als der mancher Protozoen.

H. Joseph (Wien).

Krukower, I. M.: Über einige Verhältnisse, welche die Bewegungsfähigkeit des Epithels beeinflussen und über die Methodik ihrer Untersuchung. (*Klin. f. Hals- u. Nasenkrankh., Nordkaukas. Staatsuniv. Rostov a. D.*) *Otolaryngologia* 2, 318—341 (1930).

Die Tätigkeit des Flimmerepithels wurde am freigelegten Froschoesophagus durch kymographische Registrierung der Fortbewegung aufgelegter kleiner Stückchen Cammer, Schellack u. ä. bestimmt. Einwirkung heißer und kühler Luft hemmt, ebenso leichtes Reiben der Schleimhaut, stärkeres bringt die Flimmerbewegung zum Stillstand. Benetzung beschleunigt infolge der Viscositätsveränderung des Schleimes, Viscositätsveränderung durch Öle verringert die Tätigkeit, ebenso Inhalation. Dünne Salzwasser- und Alkalilösungen fördern, stärkere hemmen; in gleicher Weise hemmt Staub, verschieden nach der Art des Staubes.

Grahe (Frankfurt a. M.).

Ham, Arthur W.: A histological study of the early phases of bone repair. (Eine histologische Untersuchung der frühen Stadien der Knochenheilung.) (*Dep. of Path., Univ. of Toronto.*) *J. Bone Surg.* 12, 827—844 (1930).

Die histologische Untersuchung verschiedener Stadien der Heilung von Knochenbrüchen (Rippe und Fibula der Ratte, untersucht 24 Stunden bis 28 Tage nach der Verletzung) ergibt, daß die Knochenzellen erwachsener Tiere an dem Heilungsprozeß einen Anteil haben. Es ist die osteogene Zelllage in der Grenzschicht des Periostes des Endostes sowie in den Haversschen Kanälen, die sich vermehrt und Knorpel bildet. Eine Metaplasie von Fibroblasten in diese spezifischen osteogenen Zellen findet dabei nicht statt. Von besonderer Wichtigkeit sind für die Bildung von Knochen aus den osteogenen Zellen die Anwesenheit einer lokalen Kalkanhäufung und eine gute Blutversorgung. Bei Abwesenheit dieser beiden Faktoren entsteht aus der osteogenen Zelllage Knorpel. Hervorzuheben ist, daß der Verf. die Bezeichnung „osteogene Zellen“ nicht gleichbedeutend mit „Osteoblasten“ gebraucht, nach Codman sind osteogene Zellen von den „Geweben, die vermutlich bestimmt sind, Knochen zu bilden“.

Hintzsche (Bern).

Ponder, Eric: The measurement of the diameter of erythrocytes. V. The relation of the diameter to the thickness. (Die Messung des Erythrocytendurchmessers. V. Über die Beziehung zwischen Durchmesser und Dicke der Zelle.) *Quart. J. exper. Physiol.* 29—39 (1930).

Es wird in allen Einzelheiten ein Verfahren geschildert, das eine ausreichend genaue Messung der Erythrocyten in allen Dimensionen gestattet. Es beruht darauf, daß die Erythrocyten in einem Serum suspendierten Zellen mit einer kleinen mikrophotographischen Kamera (am von Leitz) bei sehr kurzer Belichtungszeit aufgenommen und dann die Platten gemessen werden. Die wichtigsten erhaltenen Werte sind in der Tabelle zusammengefaßt. Bemerkenswert ist die geringe Korrelation zwischen Durchmesser und Dicke der menschlichen Erythrocyten, d. h. die Vielgestaltigkeit ihrer Form. Außerdem wurden eine Reihe von Vergleichsmessungen vorgenommen, um im gleichen Präparat die Dicke und Dicke frei schwimmender Zellen zu messen und daneben die Maße von Zellen zu nehmen, welche in Geldrollenform zusammenhaften. Dabei stellt sich heraus,

Mittelwerte, z. T. mit Angabe der Streuung σ	Mensch		Kaninchen		Schaf	
	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ	$\bar{x}$	σ
Durchmesser	8,55	0,41	7,3	0,37	5,2	0,24
größte Dicke	2,40	0,13	1,7	0,13	1,9	0,10
geringste Dicke	1,02	0,08	1,0	0,08	1,0	0,07
Abstand der dicksten Stelle vom Rand	1,34		1,1		0,7	
Durchmesser/größte Dicke	3,56 : 1		4,29 : 1		2,74 : 1	
Korrelation (r)	0,397		0,437		0,421	
Durchmesser/geringste Dicke	8,38 : 1		7,3 : 1		5,2 : 1	
Korrelation (r)	0,390		0,390		0,442	

daß in den Rollen der Durchmesser der Zelle $0,2-0,4\mu$ größer ist als bei der Zelle, während die Dicke um etwa $0,7\mu$ geringer ist. Eine Erklärung dieses Phänomen ist bisher nicht möglich. (IV. vgl. diese Ber. 13, 503.) *H. Simmel* (Gera)

Ponder, Eric, and George Saslow: The measurement of the diameter of erythrocytes. VI. The diurnal variation and the effect of exercise. (Die Messung des Erythrocytendurchmessers. VI. Tagesschwankung und Wirkung körperlicher Arbeit.) *Q. J. exper. Physiol.* 20, 41—50 (1930).

Nach der in den früheren Mitteilungen des Verf. geschilderten mikrophotographischen Methode wird bei zahlreichen Versuchspersonen eine große Anzahl Blutzellen im Ausstrichpräparat gemessen. Irgendeine regelmäßige Tagesschwankung des Erythrocytendurchmessers konnte aber nicht gefunden werden. Auch Veränderungen, die nach einer kurzdauernden, aber energischen Muskelarbeit eintreten, sind sehr geringfügig und bewegen sich bald in der einen, bald in der anderen Richtung. Ein Zusammenhang zwischen Erythrocytengröße und Muskelarbeit ist somit nicht nachzuweisen. *H. Simmel* (Gera)

Dawson, Alden B.: Chondriome and vacuome of the differentiating erythrocytes of Necturus and their relation to the so-called Golgi substance of erythrocytes. (Chondriom und Vakuom während der Differenzierung der Erythrocyten von Necturus in Verhältnis zu ihrer sog. Golgi-Substanz.) (*Zoöl. Laborat., Harvard Univ., Cambridge.*) *Anat. Rec.* 46, 281—295 (1930).

Der Verf. stellte im Blute von Necturus (Amphibia) der durch Blei vergifteten, anfangs Anämie, dann aber eine intensive Blutregeneration fest. In dieser Periode konnte der Verf. die aufeinanderfolgenden Stadien der Erythrocyten im peripherischen Blute beobachten. In seinen Untersuchungen bediente er sich der Supravitalfärbung, die ihm recht interessante Ergebnisse gab. Die noch jungen Stadien, die erst Spuren von Hämoglobin besitzen, weisen verhältnismäßig breite Mitochondrien auf, die im Cytoplasma verstreut sind. Die Neutralrotkörper sind klein und gleichförmig verteilt. Im nächsten Stadium, das schon mehr Hämoglobin enthält, treten die Mitochondrienkörner in größerer Zahl auf. In erwachsenen Erythrocyten dagegen sind die Mitochondrien reduziert und treten nur in der perinuclearen Zone auf. Die Neutralrotkörperchen haben sich nicht vermehrt und befinden sich als 2 bipolare Gruppen verteilt. Endlich gibt der Verf. den Unterschied zwischen der Verteilung von Mitochondrien in den sich teilenden Zellen wie auch in der Wachstumsperiode der jungen Erythrocyten an. *Piotr Słonimski* (Warschau)

Roo, Grace I. de, and Elizabeth H. Ufford: An investigation of the staining reaction of erythrocytes of the leopard frog to Nile-blue sulphate, with special reference to the nature of the segregation apparatus and the Golgi substance. (Untersuchungen über die farbbaren Reaktionen von Erythrocyten des Leopardschnecken auf Nilblausulfat mit spezieller Berücksichtigung von Natur des Segregationsapparates und der Golgi-Substanz.) *Anat. Rec.* 46, 297—304 (1930).

Die Verf. stellten fest, daß die Körner des Segregationsapparates nicht mit Neutralrot und Brillant-Kresylblau, sondern auch mit Nilblausulfat sich färben. Der Wert der Beobachtungen wird jedoch durch keineswegs begründete Interpretationen dieser Phänomene geschwächt. Die Verf., die die entsprechende Literatur über die Methodik dieses Problems nicht berücksichtigt haben, nehmen die Anwesenheit von Fettsäuren in diesem Apparat als festgestellt an. Die von ihnen gebrauchte Methode der Färbung durch Nilblausulfat ist bloß anwendbar zur Trennung von Neutralfetten nicht aber von Fettsäuren. (S. Kleeberg 1923, Kaufmann und Lehmann 1929.) *P. Słonimski* (Warschau)

Troilo, E.: Instabilité du nombre des globules rouges chez les animaux spéculométrisés. (Unbeständigkeit der Zahl der roten Blutzellen bei entmilzten Tieren.) (*Inst. de Physiol., Fac. de Méd., Rosario.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* 99, 1008—1009 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 49, 228.

Kerti, F., und Franziska Stengel: Resistenz und Spontanhämolyse der Mäuse-erythrocyten. (IV. Med. Abt., Allg. Krankenh., Wien.) Z. exper. Med. **72**, 371—383 (1930).
Vgl. Ber. Physiol. **57**, 604.

Wallgren, Axel: Die Entzündungszellen. Arb. path. Inst. Helsingfors (Jena), **F. 6**, 65—80 (1930).

Das Referat bringt eine gute Übersicht unserer Kenntnisse von den sog. freien Entzündungszellen, ihrem Ursprung und ihren Beziehungen zueinander. Behandelt werden granulierten Entzündungszellen, ungranulierte freie Entzündungszellen und Mastzellen. Die Darstellung gewinnt durch die reiche Erfahrung des Verf.s., die sich besonders auf Untersuchungen im Dunkelfeld stützt. Hinsichtlich der Einzelheiten, die nichts wesentlich Neues bringen, muß auf das Original verwiesen werden.

Krauspe (Leipzig).

Wright, Arthur William: The local effect of the injection of gases into the subcutaneous tissues. (Die lokale Wirkung der Injektion von Gasen in subcutanem Gewebe.) (Dep. of Path. a. Anat., Vanderbilt Univ. Med. School, Nashville a. Bender Lab. Laborat., Albany.) Amer. J. Path. **6**, 87—124 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 390.

Mas y Magro, F.: Les cellules phagocytaires de la moelle osseuse normale chez les mammifères supérieurs. (Die Phagocyten des Knochenmarkes bei den höheren Wirbeltieren.) Sang **4**, 513—523 (1930).

In früheren Untersuchungen hat der Verf. im Blut der primitiven Gefäße Hühnerembryos 2 verschiedene Zelltypen festgestellt, „Mesenchymzellen“ und „Phagocyten“, die beide vom primitiven Gefäßendothel abstammen sollen. Die einen haben verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten, sie können Megaloblasten oder Makrophagen werden oder undifferenziert bleiben. Die anderen sind differenzierte Makrophagen, welche die Reinigung des Blutes besorgen, eine Aufgabe, die später im erwachsenen Tiere nur von den Zellen der Milz übernommen wird. In der jetzigen Arbeit wird das Verhalten der Phagocyten des Knochenmarkes bei Vögeln und Säugern untersucht, um ihre Beziehungen zu den Phagocyten im Blut der primitiven Gefäße des Hühnerembryos festzustellen. Die Untersuchungen sind am Huhn, Kaninchen, an der Ratte und Meerschweinchen angestellt. Methode: Gefrierschnitte nach Formolhärtung und Ausstrichpräparate nach Ausschütteln der Zellen in Kochsalzlösung. Färbungen: Giemsa- und Silberfärbung von Horta mit nachfolgender Ausstrichung in wässriger Methylenblaulösung. Vor der Giemsa-Färbung werden die Gefrierschnitte zunächst durch eine aufsteigende Alkoholreihe in Methylalkohol gebracht und von da wieder zurück in destilliertes Wasser. Nach der Giemsa-Färbung wird in verdünnter Essig- und Pikrinsäure differenziert. Die Ausstriche werden für die Horta-Färbung in Formoldämpfen fixiert. Ergebnisse: Die Knochenmarksphagocyten werden von den Endothelzellen abgeleitet, ebenso die Erythrocyten. Gegen sie sollen die Granulocyten und Megakaryocyten von den Reticulumzellen abstammen. Diese Schlüsse werden aus dem Stadium von Übergangsbildern unter besonderer Berücksichtigung der feineren Kernstruktur bei den angegebenen Färbemethoden gezogen. Die biologische Aufgabe der Knochenmarksphagocyten besteht in der Aufnahme der Kerne der roten Blutkörperchen, die diese bei dem Reifungsstadium ausstoßen, während ganze rote Blutkörperchen unter physiologischen Bedingungen nicht von ihnen phagocytiert werden. Dieser Knochenmarksphagocyt ist keine Zelle, die wahllos alles aufnimmt, sondern sie hat die spezifische Fähigkeit, die ausgestoßenen Zellkerne der roten Blutkörperchen aufzufressen. Aber unter pathologischen Verhältnissen, z. B. nach der Injektion von hämolytischem Serum, kann sie auch ganze Erythrocyten fressen und Blutpigmente zeigen. Verf. meint, diese Zellen würden eine Spezifität verlieren und sich dem Typus der embryonalen Blutmakrophagen nähern, wie sie beim erwachsenen Tier sonst nur in der Milz vorkommen. Der Knochenmarksphagocyt der Vögel ist dagegen indifferent und inaktiv, er zeigt keine spezielle Funktion, da die reifen Blutkörperchen bei den Vögeln ihre Kerne nicht ausstoßen.

Tannenbergl (Frankfurt a. M.).

Keimzellen.

Ohashi, Hiro: Cytological study of *Oedogonium*. (Cytologische Untersuchung an *Oedogonium*.) (*Hull Botan. Laborat., Univ. of Chicago, Chicago.*) Bot. Gaz. 177—197 (1930).

Die Fixierung erfolgt meist mit Chrom-Osmium-Essigsäure, die Färbung nach Heidenhain. Die Mitose von *Oedogonium grande* wird in allen ihren Phasen genau beschrieben und abgebildet. Das Verhalten der Chromosomen und des Spindelgerüsts ähnelt sehr dem bei höheren Pflanzen. Die Chromosomenzahl ist 13, ebenfalls eine ungerade Zahl wie die von Wisselingh für *Oed. cyathigerum* gefundene Zahl. Die Bildung der Antheridien und der Spermatozoiden, sowie die Spermiogenese der Zwergmännchen von *Oed. nebraskense* werden cytologisch untersucht und beschrieben. Die Androsporangien der letzteren Art sind durch normale Teilung entstanden, kurze Fadenzellen, deren ganzer Inhalt als Androspore ausschlüpft. Bei der Bildung der Oogonien lassen sich 2 Typen unterscheiden, der eine mit Ausbildung einer Stützzelle (*Oed. nebraskense*), der andere ohne Stützzelle (*Oed. americanum*). Der Kern liegt bei der Oogoniumbildung vorangehenden Teilung im unteren Teil der Zelle im Gegensatz zu allen vegetativen Teilungen, bei denen er sich stets im oberen Teil der Zelle aufhält. Alle der Bildung der Gameten vorausgehenden Kernteilungen sind homöotypisch. Auch die Cytologie der Befruchtung wird geschildert. Die Zygote von *Oed. americanum* hat eine dreifache Membran. Bei der Zoosporenbildung konnten Beziehungen des Blepharoplasten zum Kern nachgewiesen werden. *F. Mainx* (Prag).

Zavadovskij, M.: Die Eier des *Nematodirus spatiger* und die Eigenschaften ihrer Schalen. Trudy Labor. eksper. Biol. moskov. Zooparka 5, 251—253 u. engl. Zusammenfassung 254 (1929) [Russisch].

Die Schale der Eier von *Nematodirus spatiger* besteht aus 4 Häuten. Die innere Haut ist sehr gut entwickelt, beinahe impermeabel für Wasser und schützt das Embryo gegen die Einwirkung von Chemikalien. Austrocknung wird gut ertragen. Diese Haut löst in Alkohol 100°, aber kaum in Äther. Die semipermeable Natur dieser Membran ist Lipoiden zu verdanken. *Schuurmans Stekhoven* (Utrecht).

Portmann, Adolf: Die Entstehung der Nähreier bei *Purpura lapillus* durch atypische Befruchtung. (Zool. Anst., Univ. Basel.) Z. Zellforschg 12, 167—178 (1930).

Nach den Untersuchungen von Hyman und Portmann konnte, wenigstens bei den Prosobranchierarten *Fasciolaria tulipa* und *Buccinum undatum*, die Nähreierbildung auf eine Besamung normaler Eier durch atypische Spermien zurückgeführt werden. Auch bei *Purpura lapillus* kommen Nähreier vor, doch waren hier atypische Spermien bisher nicht bekannt. Portmann hat neuerdings bei dieser Art einen verborgenen Spermatozoendimorphismus entdeckt, dessen nähere Beschreibung an anderer Stelle erschienen ist. Die vorliegende Mitteilung schildert die eigenartigen „Befruchtungsercheinungen bei den Nähreiern von *Purpura*, die auf das Eindringen eines atypischen Spermatozoons zurückgeführt werden. Das Eindringen von Spermien in das Ei konnte allerdings weder im typischen noch im atypischen Falle beobachtet werden. In den typischen Eiern setzen etwa 24 Stunden nach der Kapselablage die Reifungsteilungen ein, in den Nähreiern dagegen bleiben diese Teilungen aus. Wenn die typischen Eizellen auf dem 3—5-Zellenstadium angelangt sind, erscheint im vegetativen Bereich des Nähreies das „männliche Feld“ als eine kleine dotterfreie Zone, an der bald darauf eine Strahlung erkennbar wird. Innerhalb des männlichen Feldes sind gelegentlich Chromosomen nachzuweisen. Wenn im Laufe der normalen Entwicklung die Mikromerenkapitula die Makromeren zu überwachsen beginnt, verschmilzt in den Nähreiern das „männliche Feld“ mit dem unreduzierten weiblichen Kern, der seinen Platz am animalen Pol der Zelle nicht verlassen hat; es bildet sich eine „Pseudozygote“. Nach der Verschmelzung erfährt das Chromatin eine völlige Auflösung. Das kernlose Ei durchläuft rasch hintereinander eine Reihe von Teilungen, um dann in Form einer unregelmäßigen Ansammlung kleiner Kugeln zu verharren, bis es von den Embryonen als Nahrung aufgenommen wird.

Interpretationen werden auf ihre Brauchbarkeit als Erklärung der geschilderten Vorgänge geprüft: 1. Es gibt 2 Sorten von Spermien, die auf einheitliches Eimaterial offen. 2. Es gibt 2 Sorten von Eiern, die von normalen Spermien besamt werden. Es gibt 2 Sorten von Eiern und 2 Sorten von Spermien, so daß 4 Möglichkeiten der Befruchtung bestehen. Der ersten der 3 Hypothesen wird von P. nach Abwägung pro und contra am meisten Wahrscheinlichkeit zugesprochen. Außerhalb des Protons der Nähreierbildung ist unter den Befunden P.s der Nachweis von Wichtigkeit, 3 „die Anziehung der Geschlechtskerne auch dann stattfindet, wenn die Partner keine typischen Vorkerne sind“, daß also die Reifungserscheinungen nicht Voraussetzung für den Ablauf der Befruchtungsphänomene sind, was als eine Erweiterung des Brachetschen Gesetzes (Vorkerne in ein und derselben Zelle ziehen sich an, unabhängig von ihrem Geschlecht) bezeichnet wird. — Der Verf. warnt bei dem augenblicklichen Stand der Kenntnisse vor einer phylogenetischen Deutung der verschiedenen Formen der Nähreierbildung. Befunde bei der atypischen Spermatogenese von *Bucinum* möchte er im Sinne der Hypothese Ankels deuten, wonach die atypischen Formen der Prosobranchierspermatogenesen einen oogenetischen Einschlag aufweisen.

Ankel (Gießen).

Dracincshi, Margit: Über das reife Spermium der Filicales und von *Pilularia bulbifera* L. (Vorl. Mitt.) (Botan. Inst., Univ. Cernăuți, Rumänien.) Ber. dtsch. bot. Ges. 48, 295—311 (1930).

Es werden einige von anderen Autoren bisher nicht erwähnte Ergänzungen über den Bau des reifen Spermiums gegeben. Bei der Untersuchung der Spermatozoiden verschiedener Filicales wird gezeigt, daß jedes Flagellum ein Basalkorn besitzt, das auch am lebenden Spermium zu sehen ist; ferner lassen die Befunde der Verf. bisherigen Ansichten über den Randsaum als unrichtig erscheinen, wobei jedoch eine sichere Entscheidung seiner Natur die Verf. nicht zu geben vermag; es wird ein Mitochondrienkörper vermutet. Genauer untersucht ist das Plasmastück, wobei versucht wird die Natur der Granula zu deuten. Auch bei *Pilularia globulifera* ist die Morphologie von Bewegungsapparat, Kernstück und Plasmastück untersucht (speziell Inhaltsbestandteile des letzteren).

Bergdolt (München).

Radu, V.: Spermatogenèse chez *Armadillidium opacum* (C.-L. Koch). (Spermatogenese bei *Armadillidium opacum* [C. L. Koch].) (Laborat. de Morphol. Animale, Univ., Jassy.) C. r. Soc. Biol. Paris 105, 77—78 (1930).

Die Zahl der Chromosomen in den Spermatogonien ist $2n = 54$. Die Chromosomen adjugieren parallel und erscheinen in der Äquatorialplatte der 1. Reifungsteilung als $n = 27$ Di-Tetraten. Auch in der 2. Reifungsteilung konnten $n = 27$ Chromosomen zählt werden. Zwischen den beiden Reifungsteilungen findet eine Interkinese statt, deren Verlauf die Chromosomen ihren glatten Kontur eine Zeitlang verlieren. Heterochromosomen konnten nicht gefunden werden.

Ankel (Gießen).

Pennypacker, Miriam I.: The germ cells in the hermaphroditic gland of *Polygyra apressa*. (Die Geschlechtszellen in der Zwitterdrüse von *Polygyra apressa*.) (Dep. of Biol., Univ. of Pennsylvania, Philadelphia.) J. Morphol. u. Physiol. 49, 415—453 (1930).

Die Untersuchung der Keimzellenentwicklung der im Titel genannten pulmonaten Schnecke wurde mit der Absicht unternommen, zum Problem der Geschlechtszellenreferenzierung in der zwittrigen Gonade beizutragen. In den jüngsten Stadien der Gonade, die der Verf. zur Verfügung standen, fanden sich an der Wand der Acini bereits junge Oocyten, im Lumen Spermatogonien. Im Laufe der weiteren Entwicklung ändert diese Verteilung beibehalten, weibliche Keimzellen liegen stets der Wandung der Gonade an, in ihrer Nachbarschaft finden sich Nährzellen, männliche entwickeln sich im Lumen. Vor dem Beginn der Wachstumsperiode zeigen die Zellen der männlichen und weiblichen Linie keinerlei morphologische Unterschiede. Die Entwicklung der Sorten von Geschlechtszellen wird eingehend beschrieben, Tabellen geben einen Überblick über die Unterschiede des Kernbildes der Oocyten nach Behandlung

mit verschiedenen Fixierern und bei verschiedenen Färbungen. Die Chromosomenzahl beträgt nach Zählungen der Prophasenchromosomen in der Oocyte $n = 3$, in den Spermatogonien $2n = 60-62$, in den Spermatocyten $n = 31$. Die Spermatocyten reifen früher als die Eier. An Hand einer Literaturbesprechung (Ancel, Bresch, Demoll) wird das Problem der Geschlechtszellendifferenzierung in der zwitterigen Gonade diskutiert und für *Polygyra* dahin beantwortet, daß keine sichtbare Struktur in den Keimzellen nachzuweisen sei, die für die Differenzierung verantwortlich gemacht werden könne. Die Beteiligung des Nebenkerns (Demoll) wird aus Grund der Untersuchungsergebnisse ausdrücklich abgelehnt. Die Zeichnungen des Verf. berücksichtigen nur eine optische Ebene, geben also über das Aussehen der betreffenden Zellen nur unvollkommen Aufschluß. Ankel (Gießen).

Vergleichende Morphologie. Organographie der Pflanzen.

Kormophyten.

Fortpflanzungsorgane.

Daumann, Erich: Nektarabsecheidung in der Blütenregion einiger Araceen. Zugleich ein Hinweis auf die Bargscherse Methode. (*Botan. Inst., Dtsch. Univ. Prag, Planta* (Berl.) **12**, 38—48 (1930).

Bei den Araceen findet sich nicht selten Nektar als Anlockungsmittel für Insekten. Der Verf. schildert die Verhältnisse eingehend für *Anthurium digitatum*. Die Blüten dieser Art sind zwittrig und protogyn; zu Beginn der Anthese werden aus den Narbenhaare Tropfen abgeschieden, gegen Ende des weiblichen Zustandes wird die Sekretion von den Perianthblättern übernommen, die in kleinen Grübchen Saftspalten (umgewandelte Spaltöffnungen) besitzen; diese Sekretion hält während des männlichen Zustandes an. Im Sekret konnte Fructose, Glykose, Biosen und teilweise Schleim nachgewiesen werden. Mit Hilfe der Bargscherse Methode (Aufnahme der Sekrettröpfchen in Capillaren neben Tröpfchen von Lösungen bekannten Molengehaltes und Beobachtung der eintretenden Längenveränderung der Tröpfchen) lassen sich die Konzentrationsverhältnisse des Nektars an kleinsten Flüssigkeitsmengen bestimmen. — Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei *Anthurium cristallinum*. Bei 2 Spezies von *Arisaema* (die eine ist zisch) wurde Nektarabsecheidung an den männlichen Blütenständen festgestellt; sie erfolgt hier durch normal funktionsfähige Spaltöffnungen oder durch die Epidermisaußenwände der Perianthblätter. Bei *Aglaonema hospitum* wird außer von den Narben der basalen weiblichen Blüten Nektar in größerer Menge von Staminodien abgeschieden, die sich in der Nähe der weiblichen Blüten befinden; daß das Auftreten von Sekretion im Zusammenhang mit Reduktion der Antheren auch bei anderen nicht verwandten Pflanzen festzustellen ist, ist für die Phylogenie der Nektarien von Wichtigkeit. Auch bei *Arum maculatum* läßt sich Nektarausscheidung an den Narben beobachten. Filzer.

Beutler, Ruth: Biologische Beobachtungen über die Zusammensetzung des Blütennektars. Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Münch. **39**, 41—48 (1930).

Es sollte die Frage entschieden werden, ob die von Sprengel als Nektarschutz angesprochenen Blütenbildungen tatsächlich als solcher dienen. Durch Versuche an Kapuzinerkresse, Boretsch und Raute ermittelte Verf., daß die Zuckerabscheidung kaum, der Wassergehalt des Nektars von der Luftfeuchtigkeit stark, von der Bodenfeuchtigkeit nicht oder wenig beeinflusst wird. Eine Veränderung des Stoffwechsels der Pflanze, die bei Steigerung der Luftfeuchtigkeit die Absonderung von stärker wasserhaltigem Nektar zur Folge hätte, findet nicht statt. Die geringere Nektarkonzentration ist in erster Linie bedingt durch die hygroskopischen Eigenschaften des stärker konzentrierten Nektars, der Wasser aus der Luft aufnimmt. Es wurde weiter festgestellt, daß die bereits von Sprengel beschriebenen Schutzeinrichtungen vieler Blüten tatsächlich zum Schutze des Nektars gegen Regen beitragen. Ungeklärt bleibt die Frage, wie die

stark konzentrierte Zuckerlösung, welche der Nektar darstellt, die Zellwände durchdringen kann. Im Safthalter selbst findet nämlich eine Wasserverdunstung oder eine Rückresorption von Wasser aus dünnflüssigerem Nektar nicht statt, so daß diese Erklärungsmöglichkeiten entfallen.

Evenius (Stettin).

Martin-Sans, E.: Hexamérie normale du *Reseda glauca* L. (Hexamerie als Norm bei *Reseda glauca*.) Bull. Soc. bot. France 77, 259—261 (1930).

Reseda glauca, eine pyrenäische Spezies, wird von fast allen Autoren seit Tournefort als pentamer zitiert; Verf. weist nach, daß dies nicht richtig ist; fast sämtliche von ihm gesammelten Proben zeigten ganz überwiegend hexamere Blüten. *Filzer*.

Pitot, A.: Observations sur la graine des légumineuses. II. (Beobachtungen über den Samen der Leguminosen.) Bull. Soc. bot. France 77, 354—358 (1930).

Anschließend an die Untersuchung der Protuberanz wird das Hilum in verschiedenen Stadien der Entwicklung geprüft. Auch hier ist das Hilumgewebe ursprünglich wie die übrige Testa gebaut. Erst allmählich bilden sich die einzelnen Teile aus: Die beiden Palisadenzellen und die Tracheideninsel. Die äußere Palisadenreihe bildet sich aus dem Funiculusgewebe, die innere aus dem Testagewebe. *Esdorn* (Hamburg).

Pitot, A.: Observations sur le tégument de la graine des Légumineuses. (Beobachtungen über die Samenschale der Leguminosen.) Bull. Soc. bot. France 77, 289—294 (1930).

Die Arbeit bringt eine anatomische Untersuchung der Samenschale von *Phaseolus vulgaris* und *Arnagyris foetida*, und zwar wird speziell die Protuberanz (Strophium, Nabelschwiele) untersucht. Diese stellt eine nachträgliche Bildung der Testa dar und darf weder mit der Chalaza noch mit der Raphe verwechselt werden, wie es häufig in der älteren Literatur geschehen ist. Ursprünglich ist die Testa an dieser Stelle identisch mit der normalen Testa mit 3 bereits erkennbaren Zonen. Während sich bei *Arnagyris* bei der späteren Entwicklung besonders die ersten beiden Schichten vergrößern, ist es bei *Phaseolus* die 3. Zone, die die Hauptmasse der Protuberanz ergibt.

Esdorn (Hamburg).

Vergleichende Anatomie der Tiere.

Belekt.

Naio, Y.: Untersuchungen über die Ossificationslücke in der Entwicklungszone des Wirbelkörpers. (*Orthop. Klin., Univ. Fukuoka.*) Fukuoka-Ikwadaigaku-Zasshi 23, 1—10 (1930) [Japanisch]. Zusammenfassung 31—32 (1930) [Japanisch].

Das Vorkommen der „Ossificationslücke“ (Schmorl), d. h. eines umschriebenen Nekroseherdes in der Säulenschicht und der Verkalkungszone wird an 36 Wirbelsäulen vom Säuglingsalter bis zum 25. Lebensjahr untersucht. Am häufigsten ist sie im unteren Brustabschnitt, ferner ist die kraniale Wirbelfläche häufiger betroffen als die caudale. Seltener sind Ossificationslücken bei Kindern, die noch nicht stehen können; bis zum 12. Lebensjahr nehmen sie allmählich an Zahl zu, dann vermehren sie sich plötzlich und bleiben bis zum 16. Jahr fast unverändert, jenseits dieser Zeit vermindern sie sich, und nach dem Stillstand des enchondralen Verknöcherungsvorganges sind keine Ossificationslücken mehr zu beobachten. Wahrscheinlich wird in der 2. Wachstumsperiode die Differenzierung der Knorpelzellen besonders lebhaft — wenn gerade zu dieser Zeit verstärkte mechanische Beeinflussung eintritt, nimmt Zahl und Größe der Ossificationslücken zu.

Hintzsche (Bern).

Boyd, G. I.: The emissary foramina of the cranium in man and the anthropoids. (Die Emissarien des Schädels beim Menschen und den Anthropoiden.) J. of Anat. 65, 108—121 (1930).

Beschreibung der Emissarien und ihrer Häufigkeit nach Untersuchungen an 1500 Schädeln. Als ungewöhnlich wird ein Emissarium des Stirnbeins beschrieben, das dieses vom Sulcus sagittalis schräg asymmetrisch gegen die Außenfläche durchbohrt, was etwas über der Incisura frontalis endet. Die Emissaria sind bei den Affen seltener als beim Menschen und noch seltener bei niedrigeren Säugetieren. *v. Hayek* (Rostock).

Matwejew, D. N., und N. M. Pautkin: Die Gesetzmäßigkeit im Bau des Schläfenknochens. (*Rhino-Oto-Laryngol. Klin., Staatl. Inst. f. Ärtzl. Fortbild. u. Mathemat. Kabinett, Polytechn. Inst., Kasan.*) Mschr. Ohrenheilk. 64, 978—992 (1930).

An einem Schädelmaterial von etwa 300 Schädeln, das sich aus 17 verschiedenen Völkerschaften zusammensetzte, wurde auf Grund von Schläfendreiecksbestimmungen ein feststehender Zusammenhang zwischen gegenseitigen Beziehungen der einzelnen Abschnitte des Schläfenknochens erwiesen. Die Lage der inneren Teile des Schläfenknochens befindet sich in funktioneller Abhängigkeit von seinen äußeren Abschnitten. Eine mehr oder weniger starke Asymmetrie des Schädels ist auch von vornherein von einer entsprechend starken Abweichung der Schläfendreiecke nach Form und Größe begleitet. Das Schläfendreieck wird durch 3 Punkte gebildet, die auf den meist hervortretenden Teilen des Kieferfortsatzes (Punkt c), des Warzenfortsatzes (Punkt d) und der Schläfenlinie (Punkt l) liegen. Verff. kommen zum Ergebnis, daß die Zugangsmöglichkeiten zu den verschiedenen inneren Abschnitten des Schläfenknochens durch das Schläfendreieck bestimmt werden, da erstere auf die Schläfendreiecksebene in genau feststehenden und stets denselben Gebieten des Dreiecks projiziert werden. Bei der vorgenommenen Untersuchung wurden in der Schläfendreiecksebene die Gebiete festgestellt, innerhalb deren die Projektionen des Sulcus sinus petrosi superioris, des Sinus sigmoideus, der Bulbus venae jugularis, der inneren Schläfenarterie, des äußeren und inneren Gehörganges des Gesichtsnerven, der Bogengänge, der Schnecke, des runden und ovalen Fensters, zu liegen kommen. Einzelheiten müssen im Original nachgelesen werden. *Kindler (Solingen).*

Sergi, Sergio, e Vincenzo Capritti: Osservazioni sui rapporti di forma e dimensioni tra le volte delle orbite ed il cranio cerebrale. (Beobachtungen über die Beziehungen der Form und Größe des Daches der Augenhöhle und des Hirnschädels.) (*Istit. d'Antropol., Univ., Roma.*) Riv. Antrop. 28, 327—345 (1930).

Untersucht wird das Verhalten des sog. oberen Augenhöhlendreieckes Sergis, das durch folgende 3 Punkte gegeben ist, das Dacryon, das Punktum Fonto-malaris orbitale und das Hypopticon. Von 60 Schädeln werden verschiedene Maße in langen Tabellen wiedergegeben. Das Dreieck ist gegen den Hintergrund der Augenhöhle zu bei dolichocephalen Schädeln spitzer und länger als bei brachycephalen und außerdem noch der Fläche nach größer. Weiter steht die mediale Fläche der Augenhöhle bei dolichocephalen Schädeln nahezu sagittal und der Augenhöhleneingang ist mehr nach der Seite zu gerichtet, während das ganze Dreieck bei brachycephalen Schädeln mehr nach vorn zu sieht. Bei plagiocephalen Schädeln ist eine weitgehende Asymmetrie in der Form und der Lage der beiden Dreiecke erkennbar. *v. Hayek (Rostock).*

Klaauw, C. J. van der: La région tympanique du crâne du Scelidotherium. (Die Tympanalgegend des Schädels von Scelidotherium.) (*Laborat. Zool., Univ., Leiden.*) Tijdschr. nederl. dierkd. Verigg III s. 2, 83—87 (1930).

Ergänzende Arbeit über die Tympanalgegend des Schädels von Scelidotherium leptocephalum mit eingehender Beschreibung der Umgebung, des Entotympanicum und des sog. Ossiculum accessorium malleoli. Feststellung der Charaktere des Entotympanicums des Scelidotherium-Typus, welcher abweicht von Glossotherium und (Pseudo-) Lestodon. *C. J. van der Klaauw (Leiden).*

Klaauw, C. J. van der: La région tympanique du crâne du Megatherium. (Die Tympanalgegend des Schädels von Megatherium.) (*Laborat. Zool., Univ., Leiden.*) Tijdschr. nederl. dierkd. Verigg III s. 2, 77—82 (1930).

Ergänzende Arbeit über die Tympanalgegend des Schädels von Megatherium mit eingehender Beschreibung von Tympanicum und Entotympanicum und Umgebung von einem Objekt in Paris und Stellungnahme zu einer Arbeit von Ameghino und Kraglievich. Die Funktion des Entotympanicums kann nicht nur sein die skeletöse Bekleidung der ventralen Wand der Paukenhöhle, sondern hat vielleicht auch gedient zur Insertion von Muskeln. *C. J. van der Klaauw (Leiden).*

Sergi, Giuseppe: Uno studio sopra i caratteri della faccia umana. I. Le forme dell'arcata alveolopalatina nell'uomo e negli antropoidi. (Eine Untersuchung über das

menschliche Gesicht. I. Der Oberkieferbogen des Menschen und der Anthropoden.) Riv. Antrop. 28, 3—23 (1930).

Es werden für die Form des Oberkieferbogens verschiedene Typen aufgestellt: bogenförmig, kreisförmig, parabolisch, elliptisch usw. und daraufhin im Verein mit dem Längenbreitenindex des Oberkieferbogens werden die Schädel verschiedener Menschenrassen, insbesondere auch fossiler untersucht. Auf Grund der großen Verschiedenheiten der Form im Verein mit anderen Tatsachen gelangt Verf. auf den polygenetischen Standpunkt.

v. Hayek (Rostock).

Bernard, Raymond, Henri Fruchaud et Riveron: Etude anatomo-chirurgicale de la première côte. (Anatomisch-chirurgische Studie über die 1. Rippe.) Ann. d'Anat. Path. 7, 813—841 (1930).

Zunächst erfolgt ein Vergleich der 1. Rippe bezüglich ihrer Morphologie mit den übrigen Rippen, dann eine Schilderung der Lagebeziehungen zwischen 1. und 2. Rippe. In der Hand sehr instruktiver Abbildungen werden die Lagebeziehungen der 1. Rippe zur Pleura, zu den Hals- und Schultermuskeln, den Nerven und Gefäßen eingehend beschrieben. Die chirurgische Bedeutung der topographisch-anatomischen Verhältnisse dieser Gegend wird in ausführlicher Weise in Erwägung gezogen. Stöhr jr.

Schijfsma, K.: Das Brustbein von Ooeidozyga (Oxyglossus). (Zool. Laborat., Univ. Leiden.) Tijdschr. nederl. dierkd. Ver. 1930 III s. 2, 51—53 (1930).

Bei der systematischen Bearbeitung einer Sammlung javanischer Frösche und deren Laichquappen ergab sich, daß Ooeidozyga lima (Kuhl) (= Oxyglossus lima) ein knöchernes Sternum besitzt. Die Verknöcherung ist schon deutlich bei Fröschen von 21 mm Länge. Auch 4 untersuchte Exemplare von Ooeidozyga laevis haben ein knöchernes Sternum. Früher war die Angabe von Boulenger, nach der diese Gattung ein knorpeliges Brustbein besitzt, unbezweifelt geblieben.

Heidsieck (Breslau).

Guoth, G., und Z. Csukás: Histologische Untersuchungen über die Verdickung der Metakarpalen Kompakta. Állatorvosi Lapok 53, 29—34 (1930) [Ungarisch].

Verff. wiesen mit eingehenden histologischen Untersuchungen nach, daß die Knochenhypertrophie am Metacarpus bei jungen Vollblutpferden eher infolge Entzündungen auftritt, während bei älteren die funktionelle Beanspruchung eine größere Rolle spielt. Bei jungen Vollblutpferden entsteht die periostale Knochensubstanzvermehrung durch Metaplasie der Fibroblasten, bei 3—5jährigen infolge Neoplasie der Osteoblasten der Cambiumschichten.

Zimmermann (Budapest).

Organe der Ernährung.

Cawston, F. G.: Some observations on the embryonic radula of Limnaeidae. (Einige Beobachtungen über die embryonale Radula der Limnaeidae.) Trans. roy. Soc. S. Africa 18, 325—326 (1930).

Verf. hat die embryonale Radula verschiedener Basommatophora des Süßwassers untersucht. Die Strukturverhältnisse werden offenbar schon frühzeitig angelegt, und mit dem Alter nehmen nur die Größe der Radula, sowie der Anzahl der Zahnreihen und der Zähne zu.

Caesar R. Boettger (Berlin).

Hübner, O.: Überzählige Zähne bei Anthropomorphen. (Abt. f. Zahnerhaltungswunde, Zahnärztl. Univ.-Inst., Breslau.) Z. Stomat. 28, 397—408 (1930).

Es ist eine außerordentliche Seltenheit, wenn im Ober- und Unterkiefer derselben Seite, an gleicher Stelle, überzählige Zähne erscheinen. Der Verf. sah 2 solcher Fälle bei Orangschädeln. Bei einem jungen Orang, der im Zahnwechsel war, fand er palatinal im Oberkiefer und lingual im Unterkiefer von den beiden linken Incisivi einen Zahn, der einem lateralen Incisivus ähnlich sieht und die beide miteinander artikulieren. Bei einem männlichen Orang, der ungefähr 20—25 Jahre alt gewesen sein mag, fand der Verf. im hinteren Ober- und Unterkiefer einen vierten Molaren. Er bespricht jetzt kurz die Hypothesen und Erklärungen, wozu die unter- und überzähligen Gebißelemente bei Anthropomorphen Anleitung gegeben haben und nimmt für den 2. Fall die Erklärung

Bolks an, daß der 1. Molar ein permanent gewordener 3. Prämolare sein soll. Der von Verf. gefundene 4. Molar wäre dann eigentlich der 3. Molar des permanenten Gebisses. (Wenn der Verf. schreibt, daß der Ref. für Bolks Auffassung des Primatengebisses Belege erbracht hat, so soll das so verstanden werden, daß der Ref. für den zweireihigen Bau des Reptiliengebisses, worauf Bolk sich stützt, Beweise erbracht hat.) Auch für den 1. Fall zieht der Verf. die Erklärung des überzähligen Incisivus als Atavismus vor.
M. W. Woerdeman (Amsterdam).

Ostrouch, M.: Chondriom und Golgi-Apparat in den Fundusdrüsenstellen. (*Histoembriol. Inst., Univ. Warszawa.*) C. r. Soc. Sci. et Lettr. Varsovie 4, 1—22 u. franz. Zusammenfassung 18—20 (1930) [Polnisch].

Der Verf. untersuchte das Verhalten von cytoplasmatischen Strukturen in Fundusdrüsenzellen im Zustande des Hungers und während verschiedener Verdauungsstadien mit spezieller Berücksichtigung der Belegzellen. In den letzteren konnte man bloß mit Hilfe von Cajal-Verratis Methode den Golgi-Apparat aufweisen. Während des Verdauungsprozesses wurde die Umwandlung der stabförmigen Chondriosomen in Granula und die Verminderung derselben festgestellt. Die Chondriosomen der Belegzellen wiesen im Vergleich mit denen anderer Zellen nicht nur morphologische Unterschiede, sondern auch sowohl in chemischer Struktur wie auch in vitaler Färbung Unterschiede auf. Was den Netzapparat anbetrifft, so vergrößert er seine Dimension während der Verdauung, indem zuerst die osmophile Substanz sich vermehrt, die nachher der nicht osmophilen, reduzierenden Substanz Platz macht. Die ersten Ausscheidungsgranula erscheinen im Bereich vom Netzapparat. Nach Ausbleichung dieser Struktur kann man in ihnen die Chondriosomen anfärben. In den Belegzellen färbt das Neutralrot vital die Ausscheidungskanälchen, die dort, wo gewöhnlich der Netzapparat sich befindet, liegen. Diese Tatsache läßt eine Beziehung zwischen den beiden Strukturen vermuten.

Piotr Stonimski (Warschau).

De Filippi, Pietro: Le cellule enterocromaffini degli anfi. (Die enterochromaffinen Zellen der Amphibien.) (*Istit. di Anat. e Fisiol. Comp., Univ., Pavia.*) Arch. zool. ital. 14, 365—371 (1930).

In fast allen untersuchten Species der Anuren (*Dicoglossus pictus* Otth., *Pelodobates fuscus* Laur., *Bufo vulgaris* Laur., *Hyla arborea* L., *Rana esculenta* L., *Rana temporaria* L. und *Rana latastei* Blgr.) und Urodelen (*Spelerpes fuscus* Bonap., *Amblystoma tigrinum* Gray., *Salamandra maculosa* Laur., *Salamandrina perspicillata* Savi, *Triton cristatus* Laur., *Triton alpestris* Laur.) konnten die basalkörnigen Zellen beobachtet werden, welche jedoch im Gegensatz zu den entsprechenden Elementen bei den höheren Wirbeltieren außer ihrer Chromaffinität keinerlei Besonderheiten besonders im Hinblick auf die Kernstruktur erkennen lassen. Die topographische Verteilung und die Zahl dieser Zellen wechselt sowohl von Art zu Art wie auch bei derselben Art von einem Darmabschnitt zum anderen. Max Clara (Blumau b. Bozen).

Frazzetto, Salvatore: Sulla interpretazione delle cosiddette „figure del Mingazzini nel villo intestinale. (Über die Deutung der sogenannten „Mingazzinischen Figuren in der Darmzotte.) (*Istit. Anat., Univ., Cagliari.*) Atti Soc. Cult. Sci. Med. e Nat. Cagliari 32, 129—134 (1930).

Beim Meerschweinchen löst die Inanition 2 aufeinander folgende Hauptstadien von Schleimhautverletzungen im Dünndarm aus: Zuerst tritt Kreislaufstauung und Transsudation auf, wodurch zuerst die Zottenspitzen, dann aber auch die Seitenteile der Zotten ödematös werden; in dem 2. Stadium kommt es zur Degeneration und Abstoßung der Gewebe in den apikalen Anteilen der Zotten. Damit glaubt der Autor eine logische Deutung der „Mingazzinischen Figuren“ („Grünhagensche Räume“) in dem Sinne gegeben zu haben, daß sie als abnormale morphologische Zustände aufgefaßt werden, welche gleichzeitig Abweichungen im Stoffwechsel zeigen.

Max Clara (Blumau b. Bozen).

Kolosow, N. G., und J. F. Iwanow: Zur Frage der Innervation des Verdauungsaktes einiger Fische. (*Acipenser ruthenus*, *Silurus glanis*.) (*Histol. Laborat., Univ. asan.*) Z. mikrosk.-anat. Forschg 22, 533—556 (1930).

Die Verff. haben mit der Bielschowsky-Gros-Methode die Nervenelemente im Oesophagus, Magen und Darm von *Acipenser ruthenus* und *Silurus glanis* untersucht. Es erfolgt eine genaue Schilderung der Konstruktion des Auerbachschen und des Meissnerschen Geflechtes. Die Nervenzellen zeigen keine Neigung zur Bildung von Ganglien, sondern sind meist vereinzelt anzutreffen oder in Reihenform angeordnet; ihrer Form nach lassen sie sich nicht ganz in das Dogielsche Schema einreihen, wenn sie auch mancherlei Ähnlichkeit mit dem Typus I Dogiels aufweisen. Sehr gut dargestellte fibrilläre Verbreiterungen der kurzen Fortsätze der Ganglienzellen sowie anatomische Verbindungen zwischen denselben werden schließlich noch beschrieben.

Stöhr jr. (Bonn).

Stieve, H.: Über den Verschuß des menschlichen Afters. (*Anat. Anst., Univ. Halle a. S.*) Z. mikrosk.-anat. Forschg 21, 642—653 (1930).

Versuche, naturgetreue Präparate vom menschlichen After zu erhalten, führten bei einem plötzlich verstorbenen 17jährigen Mädchen zu gutem Erfolg, indem der Sphinkter am ganzen Becken samt Inhalt die Arterien mit Formol (1:5) füllte und die Muskulatur abtötete, dann alles für 4 Wochen in die gleiche Formollösung legte, in steigendem Alkohol härtete, darauf die aus dem Knochen herausgelösten Organe im ganzen durch 4 Monate in Celloidin einbettete und quer zum Afterring Schnitte anfertigte. Diese zeigten zu äußerst den M. sphincter ani externus, dessen Fasern nicht vollkommen ringförmig verlaufen, sondern mit verschiedenen benachbarten Gebilden in Verbindung stehen. Durch lockeres Bindegewebe getrennt, liegt nach innen davon die 2—3 mm dicke Längsfaserlage aus glatter Muskulatur, bis nahe unter die Haut verfolgbar, die sich in den Fasern der inneren Ringmuskellage verliert. Darauf folgt nach innen eine sehr deutlich abgesetzte, 2—4 mm dicke Lage ringförmiger glatter Muskelfasern, die besonders im Bereiche der Mittellinie zum Teil in die Längsfasern übergehen. Dieser Sphinkter ani internus reicht von der äußeren Afteröffnung zunächst dicker werdend innerhalb des ganzen äußeren Schließmuskels 16—20 mm aufwärts, wo er sich rasch verdünnt, um in die dünne Ringschicht des Mastdarmes überzugehen, welche fälschlich allein als innerer Afterschließmuskel bezeichnet wird. Dieser umgibt den After in sagittaler Richtung 14—20, in querer 8—10 mm breiten ovalen Raum, ganz gefüllt von den sich ebensoweit erstreckenden, vollkommen aneinanderschließenden Ringmuskulaturen, deren in diesem Falle 4 große und 4 kleine vorhanden sind. Sie sind mit unverhorntem geschichtetem Pflasterepithel überkleidet und bestehen aus lockerem fülltem Bindegewebe mit vereinzelt elastischen Fasern, aber ohne glatte Muskelfasern, wie besonders gegenüber Henle betont wird. In der Umgebung der größeren Hohlräume kommen vereinzelt Muskelzellen vor, eine eigentliche Längsmuskelschicht (Musc. mucosae) aber fehlt vollkommen, und erst an der inneren Grenze des inneren Afterschließmuskels, wo häufig einzelne seiner Ringfasern in die Längsrichtung umgehen, finden sich manchmal der Ringmuskelschicht innen unmittelbar angelagert einzelne Züge glatter Muskelzellen, wie gegenüber Tandler und gegenüber Lubosch und Schaller betont wird. Die Grundlage der Wülste selbst bildet nicht glatte Muskulatur, sondern ein zusammendrückbares Schwellgewebe, das zahlreiche Nerven und auch vereinzelt, freimündende Talgdrüsen enthält. Die zutretenden Arterien lösen sich in Capillaren auf, die besonders unterhalb des Epithels feinmaschige Geflechte bilden, aus denen das Blut in weite, untereinander in Verbindung stehende und Netze bildende Räume fließt, deren Wand nur aus dem Endothel und einzelnen angelagerten Leukozyten besteht, und aus diesen gelangt es dann in kleine Venen, um durch die oberen, mittleren und unteren Hämorrhoidalvenen abzufließen. Die Schwellkörper der einzelnen Wülste stehen untereinander, wie auch mit dem Plexus hämorrhoidalis ext. in Verbindung, sind aber normalerweise auf die Schleimhautwülste beschränkt. Reichen

die Blutgefäßgeflechte nach außen unter die Haut oder nach innen in die Mastdarmschleimhaut hinein, so entstehen als krankhafte Erscheinung Hämorrhoiden, deren Bildung im Bereiche der Wülste des Afterringes durch die Schließmuskeln verhindert wird. Als Hauptursache für die Entstehung der Hämorrhoiden betrachtet Stieglitz neben Vererbung und anderem das lange Liegenbleiben von Kot im Anfang des Dickdarmes, wodurch der Blutabfluß aus dem ganzen Bereiche des Beckenbodens behindert wird. Die Columnae rectales dienen somit als zusammendrückbare, prall elastische Schwellkissen, die durch die Schließmuskeln aneinandergedrückt den Mastdarm vollkommen verschließen; gleichzeitig aber erleichtern sie auch den Durchtritt der Kotmassen, indem diese dabei das Blut aus den Schwellkörpern verdrängen, wodurch der ganze Raum innerhalb des Schließmuskels ohne starke Dehnung durchgängig wird. Die beiden Muskeln allein können den After nicht vollkommen abschließen, wie es bei Säuglingen zeigt, da sich die Wülste erst im 7. bis 10. Monat nach der Geburt entwickeln. (Lubosch, vgl. diese Ber. 7, 793.) V. Patzelt (Wien)

Gefäßsystem, Leibeshöhlen, blutbildende Organe.

Williams, G. D., R. J. Sindelar, J. C. Peart, N. A. Martin, L. R. McIntire, C. H. Martin: Origin of the deep and circumflex femoral group of arteries. (Ursprung der Äste der Arteria circumflexa femoris.) (*Dep. of Anat., Washington Univ. School of Med., Saint Louis.*) *Anat. Rec.* 46, 273—279 (1930).

Verf. untersuchte an 166 Präparaten, von denen 107 von Männern der weißen Rasse und 59 von männlichen Negern stammten, den Ursprung folgender 4 Äste der Arteria femoralis: Art. circumflexa femoris medialis, Art. profunda femoris, Art. circumflexa femoris lateralis und Art. circumflexa femoris descendens. Es wurden die folgenden Ursprungstypen festgestellt: Die genannten 4 Arterien entsprangen mit 3 getrennten Ästen, mit 2 getrennten Ästen und schließlich mit einem gemeinschaftlichen Stamm. Diese Typen werden in schematischen Skizzen der Abb. 1 dargestellt, während in einer Tabelle das prozentuale Vorkommen der einzelnen Typen erläutert wird. Zum Schluss vergleicht Verf. seine Befunde mit denen Adachis bei den Japanern. Ballou

Kisch, Bruno: Die Zentralwülste im Conus arteriosus der Selachier. (*Zool. Station Neapel.*) *Anat. Anz.* 70, 462—470 (1930).

Ist eine Fortsetzung früherer Arbeiten des Verf. über den Ventilverschluß der Ostia arteriosa des Herzens von Selachiern, die 1927 von ihm veröffentlicht wurden. Er fand im Conus arteriosus von Trygon violaceus mächtige Bindegewebswülste, die er als Zentralwülste des Conus arteriosus bezeichnet hat, und wies auf ihre Analogie zu an Masse den Klappen gegenüber viel weniger vorherrschenden Gebilden im Conus arteriosus von Torpedo und Scyllium hin. Außer den früher in Betracht gezogenen Selachierarten untersuchte Verf. die Zentralwülste von Squatina angelus und Trygon pastinacea und fand hier ähnliche Verhältnisse wie bei Trygon violaceus. Trygon und Squatina haben zwischen der kammerfernten und der nächsten kammernahen Klappe jeder Längsreihe einen besonders großen Abstand, der durch die mächtig entwickelten Zentralwülste erfüllt ist. Bei diesen Selachiern spielen die Zentralwülste zweifellos auch beim erwachsenen Tiere eine bedeutende Rolle für den Ventilverschluß des Conus arteriosus. Weniger stark ins Conuslumen vorspringend sind diese Wülste bei Raja, Torpedo und Scyllium. Wie die mikroskopische Untersuchung ergab, besteht die Masse der Zentralwülste aus einem von mehrschichtigem Epithel überzogenen lockeren Bindegewebe, das sehr viele kollagene Fasern, aber auch reichlich elastische Fasern enthält. Die Klappenreihen und Wülste des Conus arteriosus mehrerer Selachier (Squatina, Raja, Scyllium) werden eingehend beschrieben und abgebildet. Ballou

Moore, Robert A.: The coronary arteries of the dog. (Die Kranzgefäße des Hundes.) (*Inst. of Path., Western Reserve Univ., Cleveland.*) *Amer. Heart J.* 5, 743—749 (1930).

Der Autor untersuchte 63 Hundeherzen, deren Kranzgefäße nach Spülung mit 45° warmem Wasser mit einer Suspension von Bariumsulfat in Gelatinelösung (m

ross) gefüllt wurde, radiographisch (auch stereoradiographisch). Vor der Herstellung der Radiogramme wurde das Herz in bestimmter Weise so zerschnitten, daß die Herzhöhle und das Kammerseptum ausgebreitet aufgelegt werden konnten, so daß die Abbildung ohne Überdeckungen der Teile erfolgte. Auch astweise Injektion und Injektion nach Unterbindung eines bestimmten Astes wurde ausgeführt. Als Resultat bringt der Autor die Verschiedenheit der arteriellen Gefäßversorgung des Herzens bei Hund und Mensch. Der Ramus descendens posterior wird beim Hunde immer (Mensch 20%) von der linken Kranzschlagader beigestellt. Ferner besteht beim Hunde eine separate, separate Septumarterie als Ast der linken Kranzschlagader; ihr versteckter Ursprung und ihr Verlauf in die Tiefe machen es schwer, sie zu unterbinden, so daß es unwahrscheinlich ist, daß frühere Experimentatoren die Blutzufuhr zur Kammerwand isoliert unterbrochen haben. Die Coronararterien und ihre Äste anastomosieren beim Hunde reichlich.

W. Wirtinger (Wien).

Ottaviani, Gaetano: Indagini radiografiche sul sistema linfatico. (Röntgenologische Untersuchung über die Lymphwege.) (*Istit. Anat., Univ., Padova.*) *Arch. I. Anat.* 28, 38—58 (1930).

Verf. empfiehlt Injektion von schattenden Substanzen (Quecksilber, Quecksilberze u. a.) in die Lymphgefäße und nachfolgende radiographische Abbildung. Die anatomischen Ergebnisse der Untersuchung sind einer späteren Veröffentlichung vorbehalten. Zahlreiche Bildproben.

Politzer (Wien).

Férester, Marie: Sur les afférents des ganglions lymphatiques. (Über die zuleitenden Lymphgefäße der Lymphknoten.) (*Laborat. d'Histophysiol., Coll. de France, Paris.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* 104, 1170—1172 (1930).

Bekanntlich treten die zuführenden Lymphgefäße bei den Säugetieren an der konvexen Seite der Lymphknoten in den Randsinus ein, und zwar nach den Untersuchungen der Verf. stets unter sehr spitzem Winkel. Häufig durchzieht ein zuführendes Lymphgefäß in tangentialer Richtung auf eine längere Strecke die Kapsel und öffnet sich dann in der Weise in den Randsinus, daß dieser seine unmittelbare Fortsetzung bildet. An der Einmündungsstelle oder unmittelbar vorher findet sich in der Regel ein Klappenpaar.

v. Schumacher (Innsbruck).

Lympensystem, Zentren.

Ayers, Howard: Amphioxine nerve in myxinoids. (Ein Amphioxus-artiger Nerv bei Myxinoiden.) *J. comp. Neur.* 50, 469—478 (1930).

Verf. weist einen dorsalen Ast des (sensiblen) dorsalen Spinalnerven bei *Bdellostoma dombeyi* als homolog mit dem dorsalen Spinalnerv bei *Amphioxus* an; dieser amphioxus-artige Nerv innerviert die innere Cutisschicht, welche die Rumpfmuskulatur durchdringt und den Boden des intradermalen Blutsinus bildet. Die anderen Äste des dorsalen Spinalnervs sind im Vergleich mit *Amphioxus* Neubildungen in Korrelation mit dem komplizierteren, gefalteten und kegelförmigen Bau des Myotoms und der viel mehr differenzierten Epidermis. Verf. sieht hierin auch einen Schlüssel zur Phylogenie der Trigeminiisgruppe: Dieser Nervenkomplex soll (wenn Ref. recht versteht) aufzuweisen sein als weiter entwickelte „lanzettförmliche“ Nerven, übereinstimmend mit den ersten Nerven von *Amphioxus*, während caudalwärts dieser Ast des Dorsalnervs bei *Myxine* schon reduziert und bei höheren Vertebraten verschwunden sein soll. Die Behandlung macht den Eindruck einer vorläufigen Mitteilung, deren Text und Zeichnungen die interessanten Befunde des Verf. noch nicht deutlich und überzeugend wiedergeben.

P. J. van der Feen jr. (Domburg).

Triumfow, A.: Über den inneren Bau des Nervus medianus. (*Histol. Laborat., Inst. f. Chir. Neuropath. u. Nervenklin., Milit.-Med. Akad., Leningrad.*) *Z. Neur.* 126, 50—535 (1930).

A. Triumfows Untersuchungen am N. medianus verfolgten den Zweck, den Verlauf der Faserbündel in diesem Nerven sowohl bei Tieren wie beim Menschen

festzustellen, er benutzte für seine Untersuchungen auch pathologisches Material von Menschen, um Klarheit über den Verlauf der motorischen und sensiblen Fasern im Nervenstamm bzw. seinen Ästen zu erlangen. Die Mediani kleiner Tiere sowie die dünnen Nervenäste des Medianus des Menschen zeigen einen einfachen inneren Bau und zwar entspricht ihr Verlauf dem Kabeltypus oder nähert sich diesem an. Die Schnittserien durch den Medianus von verschiedenen Menschen zeigen auffallende individuelle Unterschiede. Einzelne zeigen einen einfacher gebauten Typus, andere enthalten eine große Anzahl von Nervenbündeln bei äußerst verwickeltem inneren Geflecht. Die Zahl der Nervenfaserbündel wechselt in den einzelnen Abschnitten des Medianus außerordentlich. Die großkalibrigen Fasern herrschen vor; Anastomosen finden sich vorzugsweise zwischen den größeren Nervenfaserbündeln. Der Nerv enthält zahlreiche marklose Fasern, die meist gruppenweise angeordnet sind. Die sensiblen und motorischen Nervenfasern sind im Medianusstamm mehr oder weniger vermischt.

L. Jacobsohn-Lask (Berlin-Lichterfelde).

Thomas, L.: Les variations du plexus brachial chez les mammifères. (Die Variationen des Plexus brachialis bei den Säugetieren.) (*Laborat. d'Anat., Fac. de Médecine Toulouse.*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 11–12 (1930).

Vergleichende Untersuchung des Plexus brachialis. Während bei den niederen Vertebraten noch keine eigentliche Plexusbildung mit Trennung in vorderes und hinteres Bündel vorhanden ist, tritt diese Bildung bei allen Säugetieren mit „aufgerichteter Extremität auf. Die Monotremen zeigen noch einfache Verhältnisse, die sich an die bei Amphibien, Reptilien und Vögeln erhobenen Befunde anschließen. Es besteht noch keine Trennung in vorderes und hinteres Bündel, und die Nerven für die Extensoren zerfallen in einen N. radialis sup. und profundus. Bei allen übrigen Säugern besteht eine deutliche Trennung in ein vorderes Bündel für die Flexoren und ein hinteres für die Extensoren. Die Verschiebung in der Anordnung entsprechend der Stellung der Säuger im System liegt darin, daß die unterste (caudale) Ursprungsstelle der Nerven für den Plexus brachialis in kranialer Richtung verschoben wird, und der Plexus dadurch komplexer wird. An der Bildung von Geflechten innerhalb der Nerven haben die sensiblen Fasern allem Anschein nach einen wesentlich größeren Anteil als die motorischen. Beim Menschen wird weiterhin beobachtet, daß ein einzelner Spinalnerv vielfach häufiger an der Bildung mehrerer efferenter Nerven beteiligt ist als bei den niederen Vertebraten.

Hirt (Heidelberg).

Thomas, L.: Topographie fasciculaire des nerfs périphériques et configuration extérieure du plexus brachial. (Topographie der Faserbündel der peripherischen Nerven und die äußere Form des Plexus brachialis.) (*Laborat. d'Anat., Fac. de Médecine Toulouse.*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 13–14 (1930).

Untersuchung über die Topographie der Faserbündel im peripherischen Nerven. Methode: Erregung der entsprechenden Nerven mit kleinsten elektrischen Reizen. Die Wurzeln C8 und D1 sind die komplexesten Wurzeln, C7 ist einfacher gebaut. In den motorischen Wurzeln gibt es stumme Zonen scheinbar sensibel, deren Reizung nicht zu einer Kontraktion führt. Die motorischen Fasern einer Wurzel sind zu Faserbündeln zusammengefaßt, die stets eine Muskelgruppe (Flexoren oder Extensoren), nie einen einzigen Muskel versorgen. Die peripherischen und vorderen Fasern der Wurzel sind fast immer motorisch, die hinteren und zentralen Fasern meist sensibel. Nerv: In den efferenten Nerven scheinen die Fasern parallel zu laufen. Auch im Nervenstamm bleiben die Fasern für bestimmte Muskelgruppen beisammen. In den verschiedenen Armgeflechten der Wirbeltiere scheint das vordere Flexorenbündel früher entwickelt zu sein und auch stärker verflochten zu sein als das hintere Extensorenbündel. In letzterem sind die motorischen Fasern parallel angeordnet, während im vorderen Bündel neben den immer verflochtenen sensiblen Faserbündeln auch die motorischen untereinander verflochten sind. Nach der Ansicht der Autoren scheint die Anatomie des Nerven und der Aufbau des Plexus in gegenseitiger Abhängigkeit zu stehen. Hirt (Heidelberg).

Mussgnug, Hans: Der Anteil des Nervus phrenicus an der Innervation von Brust- und Bauchorganen beim Hunde. (*Anat. u. Pharmakol. Inst., Univ. Heidelberg.*) Dtsch. Chir. 227, 132—144 (1930).

Der Zwerchfellnerv des Menschen setzt sich aus 2—3 Wurzeln zusammen, die in der Hauptsache aus dem 4. Cervicalsegment stammen. Die beiden anderen Wurzeln entspringen dem 3. und 5. Halsmarksegment. Beim Hunde liegen die Verhältnisse ganz anders; nur stammt dort die Hauptwurzel aus C 6, die anderen Anteile aus C 5 und C 7. Der Phrenicus hat nun beim Hunde recht häufig starke Verbindungen zum Vagus und Sympathicus, die an der Innervation der Brust- und Bauchorgane beteiligt sind. Die Beziehungen dieser Anastomosen werden vom Verf. am Hunde nachgeprüft. Zunächst den Einfluß auf das Herz angeht, so kommt der Phrenicus-Sympathicus-Anastomose keinerlei Bedeutung auf die Herztätigkeit zu. Der Blutdruck erfährt dagegen eine Steigerung, die jedoch nur als sensible Reaktion zu werten ist. Auf den Einfluß des Phrenicus auf die Atmung ist ein Einfluß nicht nachweisbar. Die Atemfrequenz, die Tiefe und ihre Größe, erfährt bei der Reizung keine Schwankungen. Beim Vorhandensein einer Verbindung zwischen Zwerchfellnerv und Sympathicus ist dagegen ein Einfluß auf die Speiseröhre nachweisbar, so daß auf diesem Wege motorische Fasern dem Oesophagus zugeführt werden. Auch ist in den unteren Wurzeln des Phrenicus eine Reihe motorischer Fasern für den Magen enthalten, ihre Wirkung beschränkt sich auf den Pylorus.

A. Meyer (Köln).^{oo}

Wenderowicz, Eugen: Das myelogenetische Studium des Nervensystems nach Flechsig als eine der Grundlagen zur Erkenntnis seiner Struktur und Funktionen u. a. Verhaltens- und über die Beziehungen zwischen physiologischer und morphologischer Untersuchung. (*Neurol. Abt., Inst. f. Pädol. u. Neuropath. d. Säuglingsalters, Volkskrankheitswiss., Leningrad.*) Arch. f. Psychiatr. 90, 789—804 (1930). Der Autor vertritt den richtigen, aber nicht ganz neuen und originellen Standpunkt, daß für die Erforschung des Nervensystems Morphologie und Physiologie sich gegenseitig ergänzen und durchdringen müssen. Das von Flechsig vertretene myelogenetische Studium sei in der anatomischen Forschung der letzten Zeit zu sehr vernachlässigt worden. Er weist an einigen Beispielen darauf hin, daß gerade die Myelogenese wichtigen biologischen Erkenntnissen führen könne. In einer Fußnote polemisiert gegen C. und O. Vogt, deren cytoarchitektonische und myeloarchitektonische Einteilung für die Gliederung des Cortex grade durch das Studium der Myelogenese benutzt werden müsse, weil sie die Fähigkeit besitze, cytologisch und myeloarchitektonisch differente Felder zu größeren Einheiten zusammenzufassen und damit einen Hinweis auf physiologisch Zusammengehöriges zu geben. Der Physiologe muß über anatomisches Wissen verfügen und umgekehrt der Anatom die Ergebnisse der Physiologie beherrschen. „Nur mit anatomischen Sehvermögen bewaffnete Physiologie ist der Schlüssel zur wirklichen Analyse der psychischen Erscheinungen in Händen.“

Max Bielschowsky (Berlin).

Michaels, Joseph J., and Walter M. Kraus: Measurements of cerebral and cerebellar surfaces. IX. Measurement of cortical areas in cat, dog and monkey. (Ausmessung der Oberflächen von Groß- und Kleinhirn. IX. Ausmessung der Rindenfelder bei Katze, Hund und Affe.) (*Neuropath. Laborat., Montefiore Hosp., New York.*) Arch. of Neur. 24—101 (1930).

Vgl. diese Ber. 16, 549. Abgesehen von den sensorischen Anteilen der Rinde sind Frontal- und temporoparietale Region als größere, später für weitere Teilung gedachte Abschnitte abgegrenzt. Beim Affen sind Frontal- und Sehregion relativ am größten. Den größten Teil des Gehirns nimmt die temporoparietale Region ein. Hallervorden (Landsberg).

Musio, Zely: Neuriti dei nuclei dei nervi oculomotori che si dirigono entro il fascio longitudinale mediale omolaterale. (Neuriten der Kerne der Augenmuskelnerven, die zum mittleren homolateralen Längsbündel entlang ziehen.) (*Istit. Zool., Univ. Cagliari.*) Scritti biol. 5, 521—524 (1930).

Bei den Selachiern waren schon efferente Fasern von den Kernen der Augenmuskeln-

nerven zum mittleren Längsbündel bekannt. Verf. weist sie auch bei Teleostier 30—40 Tage alten Karpfenembryonen — nach; sie sichern wahrscheinlich den Symmetrie des Augenbewegungen. *Kastan* (Hamburg).

Davenport, H. A., and S. W. Ranson: The red nucleus and adjacent cell groups. A topographic study in the cat and in the rabbit. (Der rote Kern und benachbarte Zellgruppen: Eine topographische Studie bei der Katze und beim Kaninchen.) (*Int. Neurol., Northwestern Univ. Med. School, Chicago.*) Arch. of Neur. **24**, 257—266 (1930).

Um die Ausdehnung und Verteilung der großen Zellen im roten Haubenkern der Katze und des Kaninchens sowie unmittelbar frontal von ihm gelegener Zellen-Ansammlungen zu studieren, haben Davenport und Ranson außer Frontalschnitten (Weills Markscheidenfärbung, Neutralrot- und Kresylviolett-Zellenfärbung) auch eine Sagittalschnittserie mit gleicher Färbung benutzt. Ausgezeichnet exakte Rekonstruktionen, die einen klaren Überblick über die topographischen Verhältnisse bringen. Außer der Cytoarchitektonik des roten Haubenkernes wurden untersucht: Nucleus interstitialis, Nucleus parafascicularis, die subthalamischen Kerne (Nucleus subthalamicus Luys, Zona incerta) und die benachbarten Zellansammlungen, wie die im pedunculären und peripedunculären Kerne innerhalb der Zona incerta, der Nucleus Darkschewitsch, der Nucleus entopeduncularis. Die Autoren kamen zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Kerne der Haube und des Subthalamus nehmen bei der Katze und dem Kaninchen etwa die gleichen Höhen ein, daher läßt sich irgendeine Differenz im Verhalten der beiden Tierarten nach Durchschneidung in der gleichen Höhe nicht durch anatomische Differenzen erklären. 2. Der rote Kern ist bei beiden Arten ähnlich gebaut und kann passend in einen caudalen kompakten und einen frontalen diffus zerlegt werden. 3. Die kleinen Zellen innerhalb des großzelligen Gebiets sind nahe dem Zentrum zahlreicher, d. h. der Gegend, die den frontalsten III-Wurzelfasern anliegt. 4. Eine eigene abgegrenzte kleinzellige Abteilung des roten Kernes wurde weder beim Kaninchen noch bei der Katze gefunden. *Wallenberg* (Danzig).

Sinnesorgane.

Lewis, Dean, and Walter E. Dandy: The course of the nerve fibers transmitting sensation of taste. (Verlauf der Geschmacksfasern.) (*Johns Hopkins Hosp., Baltimore.*) Arch. Surg. **21**, 249—288 (1930).

Die Verff. besprechen die verschiedenen Theorien über den Verlauf der Geschmacksfasern (Schiff, Lussana, Ziehen). Auf Grund ihrer Beobachtungen an Operationen kommen sie zu dem Ergebnis, daß nur ein Nerv, der Intermedius oder Glossopalatinus der Geschmacksnerv für die vorderen zwei Drittel der Zunge ist. Er entspricht dem sensorischen Anteil des Nervus VII. Der Verlauf der Fasern ist ein direkter; Geschmacksreize gehen durch die Chorda tympani über das Ganglion geniculatum und Nervus intermedius in den Pons. Diese Annahme, die sich mit der Lussanaschen Ansicht deckt, stützt sich auf folgende Beobachtungen. 1. Durchtrennung der sensorischen Wurzel des Nervus V macht keine Geschmacksstörungen. 2. Nach Durchtrennung des Nervus VII einschließlich seines sensorischen Anteils ist der Geschmacksinn auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge völlig und dauernd verloren. 3. Durchtrennung des Facialis zwischen Ganglion geniculatum und Abgangsstelle der Chorda tympani ist regelmäßig von völligem und dauerndem Geschmacksverlust gefolgt. 4. Intrakranielle Durchtrennung des Glossopharyngeus führt zu völligem und dauerndem Verlust des Geschmacksinns im hinteren Drittel der Zunge, aber zu keinen Störungen in den vorderen zwei Dritteln. Die Prüfung des Geschmacks muß bei diesen Patienten mit allen Kautelen durchgeführt werden; es gibt zahlreiche Fehlerquellen, die von den früheren Untersuchern nicht immer beachtet wurden. Daher auch die verschiedenen Theorien über den Verlauf der Geschmacksfasern. *Josephy* (Hamburg).

Tanturri, D.: Die Lymphbahnen zwischen Mittelohr und Schädelinnerem. *Mse. Ohrenheilk.* **64**, 1005—1015 (1930).

Nach Ansicht des Verf. stellen das perilymphatische System des Innenohrs

ie die Lymphspalten des Nervus facialis und acusticus, wichtige, vorgebildete breitungsbahnen für die Mittelohrinfektion nach dem Schädelinnern dar. Sie sind i lymphatischen System zuzurechnen, auch die perilymphatischen Räume sind diesem System zu vergleichen. Zwischen Mittelohr und Schädelinnern gibt es erlei Verbindungswege: Der Nervus facialis stellt einen Leitungsweg dar, in dem die Infektion längs seines Verlaufes im inneren Gehörgang und in der hinteren ädelgrube verbreiten kann; dieser Weg scheint nicht allzu häufig beschritten zu den. Facialislähmung ergäbe eine dringende Indikation für den chirurgischen griff. Ein 2. indirekter Verbindungsweg führt vom Mittelohr über das Labyrinth as Schädelinnere. Farbstoff, durch das runde Fenster injiziert, verbreitet sich in Pars inferior des perilymphatischen Raumes ohne die Grenzmembran zu überreiten; die Umgebung von Utriculus und Bogengängen bleibt farbstofffrei. Ähnlich alten sich entzündliche Prozesse. Ihre Ausdehnung schließt sich den anatomischen ähnissen an. Sie können mittels des Aquaeductus cochleae ins Schädelinnere ngen. Umgekehrt können Prozesse des Schädelinnern auf diesem Wege das innere erreichen, manchmal auch längs der Blutwege, seltener durch den inneren Gehör- g, nie aber durch den Aquaeductus vestibuli. *de Burlet (Bilthoven).*

Dempster, W. T.: The morphology of the amphibian endolymphatic organ. (Der des endolymphatischen Organes der Amphibien.) (*Dep. of Anat., Zool. Laborat., v. of Michigan, Ann Arbor.*) J. Morph. u. Physiol. **50**, 71—126 (1930).

Unter endolymphatischem Organ wird der Ductus + Saccus endolymphaticus tanden. Dieses Organ erreicht bei den Amphibien eine viel mächtigere Entfaltung ei anderen Wirbeltieren. Die Untersuchungen erstrecken sich auf 34 Arten. Bei reren Arten wurde auch die Entwicklung des Organes verfolgt. In typischer Aus- ung entspringt das Organ aus dem Sacculus, dringt durch das Foramen endolympha- n in die Schädelhöhle ein und breitet sich sackförmig im extraduralen Raume aus. reinstimmend erscheint bei allen Arten der Saccus von kubischem Epithel, der us von Zylinderepithel ausgekleidet, das im ganzen oder nur stellenweise aus endym-ähnlichen“ Zellen besteht. Es lassen sich 6 verschiedene Typen des endo- phatischen Organes unterscheiden. 1. Das Organ bildet jederseits einen kleinen enförmigen Anhang (Necturus, Cryptobranchus, Amphiuma, Siren, racotriton, Gyrinophilus, Eurycea, Desmognathus, Hemidactyl, Stereochilus, Typhlotriton, Manculus, Typhlomolge). 2. Das n breitet sich sackförmig in der Schädelhöhle aus, ohne daß die beiderseitigen Säcke inander verschmelzen (Salamandra, Triton, Triturus). 3. Ähnlich wie ur findet sich hier zwischen Ductus und Saccus eine deutliche Einschnürung (Ple- lon, Batrachoseps, Aneides). 4. Die beiderseitigen großen Säcke sind mit- nder verschmolzen (Amblystoma). 5. Die miteinander verschmolzenen Säcke assen ringförmig das Gehirn. Dieser Ring entsendet dorsal einen Fortsatz in den helkanal (Rana, Xenopus). 6. Ähnlich wie 5., aber mit einem nach vorn gerich- t., intercerebralen Fortsatz (Bufo, Hyla, Acris, Pseudacris, Scaphiopus). r verschiedenen Typen lassen sich nicht mit der Lebensweise in Zusammenhang ngen. Die endgültige Form des endolymphatischen Organes wird zur Zeit der Meta- hiose erreicht. *v. Schumacher (Innsbruck).*

Loddoni, Giovanni: Sul decorso delle fibre nervose nel nervo ottico e nella retina. ir den Verlauf der Nervenfasern im Sehnerven und in der Netzhaut.) (*Reperto gOsp. Magg. d. Carità, Novara.*) Ann. Ottalm. **58**, 468—490 (1930).

Einleitend werden die Anschauungen Lebers, Wilbrands und Henschens glich der Lokalisierung von bestimmten Netzhautbezirken entstammenden Nerven- n innerhalb des Sehnerven ausführlicher wiedergegeben und, nach einem ganz n Überblick über die Entwicklungsgeschichte des Sehnerven, die experimentellen eibnisse von Krenchel, Lehmann, Wagemann des näheren erörtert. Verf.s önliche Untersuchungen beziehen sich auf Augen von Kaninchen, denen im Äquator

oder, in anderen Fällen, diesseits oder jenseits desselben, lineare, transsclerale, 2 cm lange Schnitte zugefügt worden waren. Die histologische Untersuchung des nerven, Papille einbegriffen, wurde nach Ablauf von $1\frac{1}{2}$ —5 Monaten nach dem griff vorgenommen. Es wurde ausschließlich nach Marchi gearbeitet. Es wird vorgeschickt, daß der Verlauf der Nervenfasern in der Netzhaut des Kaninchens bekannt sei. Chiasma und Tractus wurden nicht untersucht. Verf. beschränkt darauf, aus den Ergebnissen den Schluß zu ziehen, daß peripheren Partien Retina — bezüglich des Verlaufes der Nervenfasern — periphere, gleichnamige toren des Sehnerven zugeordnet sind. Doch können vereinzelte Fasern auch z verlaufen oder zur gegenüberliegenden Peripherie des Sehnerven kreuzen. We Schlüsse oder Übertragungen auf Verhältnisse beim Menschen möchte Verf. u lassen. Der noch klärungsbedürftige Komplex dieser Fragestellung geht aus Gegenüberstellung der Ansichten Igersheimers und van der Hoeve (Graefes A 1918, 1919) hervor.

Koch (Triest)

Kolmer, W.: Über das Verhalten der Krystalloide in der menschlichen Netzhaut, besonders im Gebiete cystischer Degeneration. (*Morphol.-Physiol. Abt., Physiol. Z. Univ. Wien.*) Graefes Arch. 124, 661—664 (1930).

Verf. fand in den äußeren Zellen der inneren Körnerschicht 1918 ein stäbchenförmiges, an den Enden meist zugespitztes oder abgeschrägtes Gebilde, welches an sog. Krystalloide der Zwischenzellen des menschlichen Hodens erinnert. Außer bei Menschen fand Verf. solche auch beim Schimpansen, aber weder bei einem anderen Menschenaffen noch überhaupt bei einem anderen Wirbeltier. Sie fehlen in der Makula. Besonders groß fand sie Verf. neuerdings in der Peripherie bei cystoider Entartung der Netzhaut. Es scheint sich um eiweißartige Stoffe zu handeln, die vielleicht „Reservesubstanz“ aufzufassen sind. In der Leichenretina werden sie weitgehend zerstört.

Ginsberg (Berlin)

Eisler, P.: Descemetische Haut und Linsenkapsel. Graefes Arch. 124, 705—710 (1930).

Es wird nach einer Erklärung gesucht, warum die Descemetische Haut sich in isolierten Zustand über ihre Konvexität einrollt, ebenso wie auch ein isolierter Streifen der Linsenkapsel. Die histologische Struktur ergibt keinen Aufschluß, ebenso sind die Wirkungen aus der Umgebung nicht vorhanden. Die Entwicklung der Membranen und die Aufschlüsse geben über ihre Eigenspannung. Descemet und Kapsel entstehen als sekundäre Ausscheidung, die zu einer homogenen Schicht zusammenfließt. Die ausscheidende Zellschicht wird durch Zellteilung in ihrem ganzen Bereich größer und übt schließlich nach der Peripherie zu einen Zug aus. Da ihre Unterlage, d. h. die cuticuläre Ausscheidung sich nicht dehnt, so wird ein zentraler Gegenzug ausgeübt. Es folgt daraus, daß die älteren Schichten kürzer sind als die jüngeren. Sobald die Membran isoliert wird, gibt sie ihrer Eigenspannung nach und rollt sich über ihre Konvexität, also in die Richtung der älteren Schichten zu ein.

W. Rauh (Gießen)

Harn- und Geschlechtsorgane.

Vonwiller, P., und R. Allemann: Vitalanatomische Beobachtungen an der lebenden Kaninchenniere. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Erzeugung der experimentellen Hydronephrose. (*Anat. Inst., Univ. Zürich.*) Bruns' Beitr. 149, 226—247 (1930).

Die Verff. beobachten zunächst die Kaninchenniere und deren Gefäßstiel unter der binokularen Lupe. Beschreibung der Topographie der Gefäße und der Lymphgefäße, die bei der Betrachtung am lebenden Objekt deutlich zu sehen sind. Anschließend Beobachtung der Nierenoberfläche mit auffallendem Licht unter Verwendung eines metallumrandeten Deckglases. Vergr. 220 x—270 x (letztere Vergr. mit Ölimmersierung). Es werden die Umrisse der Kanälchen erkannt, deren Lumen nach Abklemmung des Ureters sichtbar wird. Malpighische Körperchen sind nicht sichtbar, da sie zu tief liegen. Ein pathologisch verändertes M.K. war zufällig zwischen den Kanälchen sichtbar.

er und wird genau beschrieben und auch am Schnittpräparat untersucht (Meerweinchen). Weiterhin Darstellung der Nierennerven beim Kaninchen, die im wesentlichen mit den schon bekannten Tatsachen übereinstimmen. Die zur Niere ziehenden Nerven wurden durchtrennt, die Tiere 6 Wochen bis 8 Monate nach der Operation getötet. In keinem Falle (24) konnte auch nur eine Andeutung einer Hydronephrose gefunden werden.

Hirt (Heidelberg).

Flynn, T. Thomson: On the unsegmented ovum of *Echidna* (*Tachyglossus*). (Über gefurchte Eier von *Echidna* [*Tachyglossus*].) Quart. J. microsc. Sci. 74, 119 bis 121 (1930).

Beschreibung zweier Eier von *Echidna setosa*. (In Tasmanien gesammeltes Material.) Bei den in Bouin fixierten Eiern wurden die Keimscheiben vorsichtig herauspräpariert, vom Dotter befreit, in Celloidinparaffin eingebettet und 5 μ dick geschnitten. Die Gebilde besitzen eine Schale und darunter eine Eiweißhülle, auf die erst die Zona lucida folgt. Die Keimscheibe liegt dem Dotter dicht auf. Bei dem 1. Ei, das in diesem Zustande 4 mm Durchmesser hatte, waren 2 Polkörperchen gebildet; das 1. war etwas größer und hatte sich nicht weiter geteilt, das 2. lag dicht in der Nähe des weiblichen Vorkernes. Der männliche Vorkern konnte nicht nachgewiesen werden. Das 2. Ei wies ebenfalls 2 Polkörperchen auf, auch hier war das 1. größer als das 2. Ei. Im Eioplasma lagen die beiden Vorkerne, von denen der eine ein wenig größer war, länglich ovale Gebilde derart zusammen, daß an der Berührungsstelle nur noch eine dünne Kernmembran vorhanden war. Aus den Beobachtungen geht hervor, daß die Furchung erst einsetzt, wenn das Ei im Uterus angelangt ist. Polyspermie scheint im Gegensatz zu *Ornithorhynchus* bei *Echidna* nicht vorzukommen. Hett (Halle).

Wallart, J.: Entfaltung und Rückbildung der paranganglionären Zellen im menschlichen Eierstocke. (*Frauenspit.*, Basel.) Arch. Gynäk. 143, 176—187 (1930).

Die paranganglionären Elemente im Bereich des Eierstockhilus leiten sich nach Ansicht des Verf. von Sympathogonien ab. Wahrscheinlich haben sie einen bestimmten Typus, der vorläufig nur durch Aneinanderreihung verschiedener Zelltypen festgelegt werden kann. Die Jugend- oder Ruheform der Hiluszellen hat nur spärliches basales Protoplasma; in der ausgebildeten Form enthält dieses acido-, baso- und neutrophile Teilchen. Vakuolen im Protoplasma enthalten nicht immer Fett. Im übrigen beruht der Lipidgehalt der Zellen noch einer genaueren Untersuchung. Wahrscheinlich ändern die Gebilde sich mehrmals cyclisch verändern, einige sterben hierbei ab. Wie schon früher erwähnt, sind die Hiluszellen besonders gut beim Neugeborenen, ferner in der Pubertät an nachzuweisen. Während der geschlechtsreifen Periode beteiligen sie sich an dem regelmäßigen sexuellen Cyclus. Während der Schwangerschaft und bei gewissen pathologischen Zuständen werden sie zu besonderem Wachstum angeregt.

Hett (Halle).

Stieve, H.: Beobachtungen an menschlichen Eierstöcken. (*Anat. Anst., Univ. Halle a. S.*) Z. mikrosk.-anat. Forschg 22, 591—659 (1930).

Die Eierstöcke des Kindes enthalten in der Zeit vor der Pubertät neben einer sehr großen Zahl von Primordialfollikeln nur wenige wachsende und Bläschenfollikel, von denen zahlreiche in Rückbildung begriffen sind. Während der Entwicklung im Alter von 15—19 Jahren ändert sich das Bild. Es fallen im Eierstock die vielen Bläschenfollikel auf, deren Zahl viel größer ist als bisher angenommen. Bei der Besprechung dieses solches Zustands physiologisch ist, geht Verf. besonders auf die sog. kleincystische Degeneration der Eierstöcke ein. Die Cyste ist ein Gebilde, in der das Ei zugrunde gegangen, die Granulosa aber noch erhalten ist und weiter sezerniert. In atretischen Follikeln, die ja auch cystisch werden können, geht die Granulosa mitsamt dem Ei schnell zugrunde. Bei den großen Bläschen, die sich in den Eierstöcken der Entwicklungsjahre finden, lassen sich Cumulus oophorus nebst Ei nachweisen, so daß es sich nicht um eine kleincystische Degeneration handelt. Daß durch äußere Faktoren ein solcher Eierstock sich schnell zurückbilden kann, geht wohl aus dem geschilderten

Beispiel einer 21jährigen Frau hervor, bei der seit 3 Monaten eine Blasenscheidenfistel bestand. Die wachsenden und Bläschenfollikel waren zurückgebildet, ein großer der Primärfollikel zugrunde gegangen. Am Ende der Schwangerschaft verhalten die Eierstöcke bei den einzelnen Frauen sehr verschieden; manche enthalten so wiederum größere Bläschenfollikel, während solche in anderen noch nicht herangeren sind. In ersterem Falle waren die Schwangerschaftsgelbkörper vollkommen zurückgebildet. Aus diesen Befunden erklärt sich das verschiedene Verhalten der Frauen hinsichtlich des Auftretens der Regel nach der Entbindung. Hett (Halle)

Adachi, T., and M. Fukuda: On corpus luteum gravidarum. (Über das Corpus luteum graviditatis.) Jap. J. Obstetr. 13, 141—147 (1930).

Eine ganze Reihe von Beobachtungen deuten darauf hin, daß das Corpus luteum bei Störungen des normalen Stoffwechsels und durch anderweitige Schädigungen des Körpers verändert wird. Es bedarf daher einer genauen Auswahl an Material, um bei Menschen sichere Daten über die feineren Verhältnisse dieses Organs zu sammeln. Zu dieser Arbeit wurden 27 Fälle untersucht, von denen 22 von extrauterinen Gravitationen stammten. Die Größe des gelben Körpers ist starken individuellen Schwankungen unterworfen. Zu Beginn der Gravidität hat das Gebilde einen Durchmesser von 2,5 cm, wobei die Follikelhöhle teilweise noch zu sehen ist. Von der Mitte der Schwangerschaft nimmt die Größe ab. In 7 Fällen von ektopischer Gravidität lagen Hämorrhagien vor. Der gelbe Körper ist aber sonst genau so gebaut wie bei einer normalen Gravidität. Nach Kaiserschnitt und Entfernung der Frucht soll die Rückbildung des gelben Körpers schneller vor sich gehen. Die Menge der fettartigen Substanzen, die mit Eiweiß verbunden vorkommen, ist kein verlässlicher Maßstab für die Rückbildung der einzelnen Zellen. Fettartige Substanzen wurden sowohl in den Granulosa- als auch in den Theca luteinzellen, ferner in hystiocytären Elementen der Theca nachgewiesen. Hett (Halle)

Rousset, J.: La constitution anatomique du mamelon humain. Ses conséquences pathologiques. (Der anatomische Bau der menschlichen Brustwarze.) (Clin. Dermatol. de l'Antiquaille, Univ., Lyon.) Gynéc. et Obstétr. 22, 205—228 (1930).

Die Untersuchung gründet sich auf die in Serien teils quer, teils längs geschnittenen Brustwarzen von 24 Frauen im Alter zwischen 16 und 84 Jahren. Verschiedene Fixierungsmittel wurden verwendet. Die Untersuchung zeigt große individuelle Variationen. Nach der Anordnung der Milchgänge im zentralen Teil der Warze werden 2 Typen unterschieden. Beim 1. Typus bleiben die Milchgänge zusammen, erhalten in verschiedenen Höhen ein epidermisartiges Epithel und münden seltener einzeln nebeneinander, häufiger unter allmählicher Vereinigung in einer zentralen Vertiefung von verschiedenem Umfang. Beim 2. Typus weichen die Gänge auseinander und treffen tangential auf die Hautbedeckung der Warze, wo sie in verschiedenen Höhen münden. Das wechselnde Verhalten der Ausführungsgänge bestimmt die Lage der mit ihnen verbundenen Talgdrüsen. — In besonderen Abschnitten werden dann im einzelnen beschrieben der periphere Teil der Warze (die Haut, deren Talgdrüsen, isolierte kleine Milchdrüsen), und der zentrale Teil (Milchgänge mit ihren Talgdrüsen, Stützgewebe, Muskulatur, Gefäße und Nerven). Bei der Schilderung der Haut wird besonders auf Mängel in der Verhornung hingewiesen. Die Formen und Ausführungsgänge der auf der Haut unmittelbar mündenden Talgdrüsen sind eingehend beschrieben. Selbständige ausmündende kleine Milchdrüsen wurden in der Warze niemals gefunden. Benachbarte Milchgänge besitzen öfters kurze, quere, engere Anastomosen. Auf die Einteilung der Milchgänge und deren Epithelien wird nicht näher eingegangen, ebenso wenig auf die Anordnung der Muskulatur in der Warze. Genauer sind die Schilderungen der Talgdrüsen und deren Mündungen. Zum Schluß werden noch einige Angaben gemacht über die Warze einer stillenden Frau, die Rückbildungsvorgänge bei der Menopause, die Brustwarze beim Manne, die normalen Erscheinungen von Dyskeratose und die Beziehungen der Untersuchungsbefunde zu Erkrankungen der Warze. v. Eggeling.

Ras'hodowa, Wera: Beiträge zum Studium des histologischen Baues der Milchdrüse bei den Rassen des Berg-, Kuban- und Kalmückenrindes im Nordkaukasus. (*Laborat. f. Allg. Zootechnik, Kuban. Landwirtschaftl. Inst., Krasnodar.*) Z. Züchtg B 19, 1930—470 (1930).

Verf. will zwischen dem mikroskopischen Bau der Milchdrüse und dem Milchtrag eine Beziehung herstellen und hat zu diesem Zweck Stücke aus verschiedenen Teilen des Euters von 36 Kühen der 3 im Titel genannten Rinderrassen in Gefrierblöcken mikroskopisch untersucht. Die meist trächtigen Tiere sind nach Alter, Gewicht und Ernährungszustand näher charakterisiert. Auf den Schnitten wurde durch Messungen festgestellt: ein mittlerer Durchmesser der Drüsenschläuche und Alveolen, die Breite der dickeren Bindegewebssepten zwischen den Drüsenläppchen; ferner die Anzahl der die Drüsenhölräume auskleidenden Zellen, berechnet nach der Zahl der Epithelkerne. Die Menge des aktiven Gewebes, d. h. des Parenchyms gegenüber dem Stützgewebe wurde durch Aufzeichnen der Grenzlinien auf Papierblätter, Ausschneiden der von den Grenzlinien umzogenen Papiergebiete und Wiegen derselben festgestellt. Die Maße und Gewichte sind in Tabellen mitgeteilt, werden näher besprochen und untereinander sowie mit den Ergebnissen anderer Forscher verglichen. Aus den Beobachtungen gelangt Verf. zu folgenden Schlüssen: Das Bergrind hat die besten organisierte Milchdrüse mit viel aktivem Gewebe (68—69%), mittelgroßen Alveolen, großen Epithelzellen und schmalen Bindegewebssepten. Der Milchtrag ist sehr groß. Die Milchdrüse des Kuban- und Kalmückenrindes ist schlecht organisiert mit spärlichem aktivem Gewebe (etwa 34—36%), engen Alveolen, kleinen Epithelzellen, dicken Bindegewebssepten. Zur Feststellung eines Zusammenhanges zwischen Drüsen-, Alter, Trächtigkeitszustand und Laktationsstadium genügt das untersuchte Material nicht. Beim Kuban- und Kalmückenrind ergab sich ein Zusammenhang zwischen Drüsenbau und Lebendgewicht. Bei großen Tieren ist die aktive Substanz spärlicher gebaut.

v. Eggeling (Breslau).

Grégoire, Ch.: Nature épithéliale de certains corpuscules de colostrum. (Epithelialer gewisser Colostrumkörperchen.) (*Inst. d'Histol., Fac. de Méd., Strasbourg.*) C. r. Acad. Biol. Paris 104, 1308—1310 (1930).

Verf. untersuchte die stark milchabsondernden Milchdrüsen eines Kaninchens, das 9 Jahre alt an einem Hodentumor erkrankt war. Infolge der Milchretention fanden sich Befunde von Colostrumkörperchen, die näher beschrieben wurden. Verf. kam zu der Auffassung, daß eine große Zahl dieser Körperchen aus dem Epithel besteht und Epithelzellen darstellt, die entweder abgestoßen sind oder noch an der Wand hängen mit Phagocytose der in den Endkammern zurückgehaltenen Absonderungsprodukte.

v. Eggeling (Breslau).

Entwicklungsgeschichte.

Chaloud, G.: Le cycle évolutif de *Fossombronina pusilla* Dum. (Der Entwicklungslauf von *Fossombronina pusilla*.) Rev. gén. Bot. 41, 24—34, 95—105, 129—141, 193—236, 292—306, 353—364, 409—423, 474—497, 541—554, 606—621, 676—699, 741—771 (1929); 42, 31—45, 99—114, 159—163, 219—232, 297—312, 366—384, 428—448, 505—512, u. 553—588 (1930).

Es handelt sich um eine sehr ausführliche Entwicklungsgeschichte des Lebermooses *Fossombronina pusilla*. Geschildert wird die Bildung des Protonemas (die Stadien des Sprossvorkeimes und des Flächenvorkeimes) sowie Variationen in dessen Gestalt und Ursache, ferner das Auftreten der Scheitelzelle. Das 2. Kapitel behandelt Scheitelzelle und Vegetationspunkt, Form und Segmentierung der jungen Pflanze, die Art und Weise des Segmentwachstums, Bildung des Stengels und der Insertionsreihe der Blätter. Das 3. Kapitel ist den Blättern gewidmet, ihrer Stellung und Form, der Art ihres Wachstums sowie vorkommenden Anomalien. Auch die Entstehung der Wurzelhaarpillen ist geschildert. Theoretische Erörterungen über das Wachstum der

Muscineenblättchen schließen sich an. Im 4. Kapitel behandelt Verf. die dorsalen und ventralen Anhangsorgane, Haare und Schuppen, ihren Bau, Wachstum, Ort des Auftretens und Funktion; ferner sekundäre Auswüchse an Stengel und Blättern. Verf. liefert eine Kritik der Leitgeb'schen Hypothese über dorsale und ventrale Blätter (Anhangsorgane). Berücksichtigt ist ferner die Morphologie und Funktion der Eizoiden. Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit den normalen und adventitiven Verzweigungen, deren Zustandekommen eingehend geschildert ist. Kapitel 6 bringt die Schilderung der Sexualorgane (Antheridien und Archegonien): ihre Entwicklung und Platzierung und die Beziehungen zu den Segmenten. Auch die Befruchtung der Eizelle ist berücksichtigt. 2 weitere Kapitel behandeln die Morphologie des Sporophyten. Die Embryoentwicklung von *Fossombronina pusilla* ist beschrieben und ein Vergleich mit den Embryonen der übrigen *Fossombronina*-Arten durchgeführt, der Unterschiede aufzeigt. Entwicklung und Bau des Sporogons werden eingehend geschildert. Berücksichtigt sind auch die Schutz- und Ernährungsorgane (Archegonienwarzen, Perigyne und Perianth). Allen Kapiteln gehen historische und meist auch technische Angaben voraus. Die Literatur ist im allgemeinen gut berücksichtigt. Zahlreiche Abbildungen vervollständigen die umfangreiche Arbeit. *Ernst Bergdolt* (München).

Dahlgren, K. V. Ossian: Zur Embryologie der Saxifragoideen. Sv. bot. Tidskr. 24, 429—448 (1930).

Die vorliegende Arbeit baut auf embryologischen Untersuchungen auf, welche E. Gäumann vor Jahren in Angriff genommen, aber nicht zu Ende hatte führen können. Sie befaßt sich vor allem mit der Endospermentwicklung der Untergruppe „Saxifragoideae“ der Saxifragaceen in der neuen erweiterten Fassung Engler's. Sämtlichen hier behandelten Objekten gemeinsam ist die charakteristische Lage des sekundären Embryosackkernes, der nicht in der Nähe des Eiapparates, sondern weit unten, oft dicht oberhalb der Antipoden, zu suchen ist. Vor allem nimmt der primäre Endospermkern kurz vor der 1. Teilung immer eine ausgesprochen basale Lage ein. Wenn man von *Frankoa* absieht, welche ein nucleares Endosperm besitzt, so ist die Endosperm-bildung bei den übrigen untersuchten Gattungen ziemlich einheitlich, insofern, als durchwegs nach der Teilung des primären Endospermkernes im Chalazal eine kleine basale Zelle von dem übrigen Embryosack abgegliedert wird. Die weitere Entwicklung zeigt teils Endosperm-bildung nach dem „*Helobiae*“-Typus — so die meisten Vertreter der Gattung *Saxifraga* selbst neben *Chrysosplenium* (— die früheren Angaben von Eichinger sind unrichtig! —), teils celluläres Endosperm, so z. B. *Astilbe*, *Heuchera*, *Peltiphyllum*, *Tellima* und *Ribes*. Von den Gattungen *Mitella* und *Boykinia* besitzt je eine untersuchte Art ein „*Helobiae*“- und je eine ein „celluläres“ Endosperm. Unter Einschluß der isoliert stehenden *Frankoa* (— zu der auch *Parnassia* mit ebenfalls nuclearem Endosperm zu stellen wäre —) läßt sich also eine neue Serie vom rein nuclearen zum rein cellulären Endospermtypus aufstellen. Die für die ganze Gruppe charakteristische Abgrenzung eines besonderen Teiles des Embryosackes hängt nach einer vom Verf. bereits früher geäußerten Ansicht mit trophischen Verhältnissen zusammen, indem eine Arbeitsteilung zwischen dem Hauptendosperm und demjenigen Teil eintritt, der den größeren Teil des Nahrungsstromes erhält. Erwähnen seien schließlich noch einige Fälle von ausgebliebener Endosperm-bildung, z. B. *Mitella pentandra* und *Heuchera sanguinea*. Die Untersuchungen sollen noch auf weitere Unterfamilien ausgedehnt werden.

E. Esenbeck (München).

Dejdar, Emil: Die Funktion der „blattförmigen Anhänge“ der Embryonen von *Asellus aquaticus* (L.). (Versuch einer Analyse mit Hilfe vitaler Elektivfärbung.) (Zool. Inst., Dtsch. Univ. Prag.) Z. Morph. u. Ökol. Tiere 19, 321—329 (1930).

Gegenstand der Untersuchung sind Embryonalorgane von *Asellus aquaticus*, die sich vor Abgrenzung der Kopfklappen im vorderen Teile des Keimstreifens symmetrisch zur späteren Körpermedianen anlegen, und zwar zunächst als kugelige Zellhaufen, die aber später 2 spitz ausgezogene Seitenzipfel ausbilden. Diese dreigelappte

organe („blattförmige Anhänge“) sind an frisch ausschlüpfenden Tieren nicht mehr vorhanden. Bisher wurden den Organen verschiedene Funktionen zugeschrieben (Respirationsepithel, Exkretions-, Resorptionsorgan, Schildrudiment mit Drüsen- bzw. Kiemenfunktion, Rudiment ohne Funktion). Der Autor untersuchte die Organe mittels elektiver Vitalfärbung mit Leukomethylenblau, Leukoazur bzw. leicht reduzierbaren Metallsalzen (AgNO_3 und KMnO_4), einer Methode, die Gicklhorn und Keller als geeignet zur elektiven Darstellung von Respirationsorganen niederer Tiere gefunden haben. Nach dieser Methode fand Dejdar in den ersten Entwicklungsstadien (Bildung des Keimstreifens, Anlage der ersten und zweiten Maxillenpaare) eine unspezifische diffuse Färbung. Nach der deutlichen Differenzierung der Organe findet jedoch eine scharfe elektive Vitalfärbung derselben statt, die mit zunehmender Differenzierung des Embryos an Intensität gewinnt. In einem Stadium aber, in dem an den Pleopodenmembranen, die als sichere Respirationsorgane anzusehen sind, die elektive Vitalfärbung nach der gleichen Methode beginnt und fortschreitend zunimmt (nach Gicklhorn und Keller und dem Autor gleichbedeutend mit dem Funktionsbeginn), tritt die Färbung der blattförmigen Anhänge in den Hintergrund. Gleichzeitig bleibt auch ihre Größe im Vergleich zum Wachstum des Embryos zurück. Es bleiben an den fraglichen Orten zunächst die mittleren Lappen, später der Stiel und endlich auch die Seitenzipfel farblos, so daß zum Schluß nur mehr noch die Basis der „Anhänge“ gefärbt erscheint. Durch Ausbildung eines ringförmigen Verschlusses zwischen blattförmigen Anhängen und Leibeshöhle werden die Organe funktionell isoliert und werden bei der Häutung zusammen mit der Exuvie abgestreift. Auf Grund dieser Erfahrungen entscheidet sich, die fraglichen Organe als Embryonalkiemen anzusprechen, welche gleichzeitig mit der Ausbildung der Pleopodenkiemen funktionsuntüchtig werden. Die Untersuchung soll zu weiterer Beitrag zum Werte der elektiven Vitalfärbung angesehen werden, welche nicht nur Form, Größe und Entwicklung eines Organes im lebenden Organismus zu kennen gibt, sondern auch ausreichend begründete Rückschlüsse über jeweilige Funktionen zu ziehen erlaubt.

Pischinger (Graz).

Simkins, Cleveland Sylvester, and J. J. Asana: Development of the sex glands of Calotes. I. Cytology and growth of the gonads prior to hatching. (Die Entwicklung der Keimdrüsen bei Calotes. I. Verhalten vor dem Schlüpfen.) (*Div. of Anat., School of Med., Univ. of Tennessee, Memphis.*) *Quart. J. microsc. Sci.* **74**, 133—149 (1930).

Das Material bestand aus Embryonen von der Eiablage bis zum Ausschlüpfen. Es wurde in Bouin fixiert. Frisch abgelegte Eier enthalten Embryonen von 2—2,5 mm Länge, bei denen die Organe schon relativ weit entwickelt sind. Das Neuralrohr ist nun schon geschlossen bis auf den vorderen und hinteren Neuroporus, die Urniere erstreckt sich vom caudalen Ende der Lungenknospen an über die hintere Leibeshöhle und an abwärts. Am ventro-medialen Rande der Urnierenfalte bis zum Ansatz des Mesenteriums ist das Epithel der Leibeshöhle verdickt. Das kraniale Feld bildet das Ende der Nebenniere, das caudale die Keimdrüse. Im Bereich des verdickten Epithels finden besonders große Zellen mit zum Teil unregelmäßiger Begrenzung auf, die mit Eosin rot, mit Osmiumsäure dunkel gefärbte Einschlüsse enthalten. Sie werden als Nährzellen bezeichnet und konnten auch an anderen Stellen des embryonalen Körpers, wie z. B. am Epithel der Urniere, im Lumen des Vorder- und Hinterdarmes und im Mesophocoel gesehen werden. Mit der weiteren Entwicklung verlieren diese Gebilde allmählich ihre dotterartigen Einschlüsse und färben sich intensiver mit Hämatoxylin; in der 2. Woche nach der Eiablage werden sie spärlicher und verschwinden am Ende der 3. Die Epithelverdickung, die später zur Keimdrüse wird, läßt sich bald von derjenigen der Nebenniere unterscheiden. Letztere rückt mehr an die Wurzel des Mesenteriums, während die Keimdrüse sich in Rinde und Marksubstanz zu differenzieren beginnt. Am Ende der 2. Woche erscheinen in der Rindenanlage der Keimdrüse etwas größere Zellen, die als primäre Keimzellen aufgefaßt werden; sie fehlen in der Nebennierenrinde. Die Unterschiede in der Ausbildung der Rinden- und Marksubstanz

lassen schon in der 5. Woche die beginnende geschlechtliche Differenzierung ahnen. Beim Männchen ordnen sich die Zellen der Marksubstanz in Reihen, während die Rindensubstanz im Wachstum zurücktritt, beim Weibchen ist letztere besonders gut entwickelt. Ob die erwähnten größeren Zellen (primäre Geschlechtszellen) zu späteren Eiern oder Samenzellen werden, ist fraglich. Hett (Halle).

Weber, A.: Recherches sur les premières manifestations des ébauches d'origine épithéliale. (Untersuchungen über das erste Sichtbarwerden von Organanlagen epithelialen Ursprungs.) *Archives Anat. microsc.* **25**, 132—136 (1929).

Der Verf. hat mit einer 1902 von ihm ausgearbeiteten Methode (der höhenkurvenartigen Verbindung von Punkten gleicher Dicke und der verschiedenen Tönung der verschiedenen Dickenzonen) das Darmtodermblatt bei einem Kanarienvogel von 57 und einem Hühnchen von 48 Brutstunden untersucht. Die gefundenen Verdickungen (die einander bei beiden Tieren nicht genau entsprechen) sind nur topographische Anhaltspunkte für Orte regerer Zellvermehrung, die allerdings zur Ausbuchtung der Bronchialanlage führen wird; der Verf. betont aber selbst, daß diese sichtbaren Verdickungen weder eine Lokalisation des Lungenmaterials noch irgend eine Vermutung über seine Organisation und Determination erlauben. Robert Wetzel (Würzburg).

Kingsbury, B. F.: The developmental significance of the floor-plate of the brain and spinal cord. (Die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung der Bodenplatte des Hirns und Rückenmarks.) (*Laborat. of Histol. a. Embryol., Cornell Univ., Ithaca*) *J. comp. Neur.* **50**, 177—207 (1930).

In früheren Arbeiten hatte Verf. gezeigt, daß sich eine differenzierende Bodenplatte des Neuralrohres als ein Septum nur bis zur caudalen Grenze des Mittelhirns erstreckt. Weiters wies er nach, daß die Chorda-Anlage — im Gegensatz zur Auffassung von His und Keibel — nicht bis an den Frontalpol der Neuralplatte, sondern nur bis zur Fovea isthmi reicht. An dieser Stelle findet man eine dorsale Furche. In der vorliegenden Mitteilung beschäftigt sich Verf. mit der Bedeutung dieser Dorsalfurche in ihrer Beziehung zur Bodenplatte. Dann behandelt er unter Hinweis auf eigene frühere Arbeiten und solche der neueren Literatur die Frage nach der Existenz einer „Naht“ innerhalb der Neuralplatte, die Frage der „Neurochordalnaht“, der „Bodenplatte“ überhaupt und der primitiven Dorsalfurche. Fr. Th. Münzer (Prag).

Fischer, Franz: Über die Abschnürung der Linse vom Ektoderm beim Menschen. (*Embryol. Inst. u. I. Augenklin., Univ. Wien.*) *Graefes Arch.* **124**, 507—520 (1930).

Fischer hat den Abschnürungsvorgang der menschlichen Linse an der Hand von 11 gut erhaltenen Embryonen von 6,5—9 mm des Wiener embryologischen histologischen Instituts (Prof. Fischel) untersucht und feststellen können, daß dieser Vorgang in etwas verschiedener Weise erfolgen kann. Er bringt auch interessante Beiträge zu der Frage der sog. degenerierenden Linsenzellen. Der Beginn des Abschnürungsvorganges wird bereits durch die eigenartige Beschaffenheit der Linsengrube beeinflusst. Die Linsengrube ist zunächst dorsal flach, während sie ventral mit dem Ektoderm eine Falte bildet. Durch eine nunmehr auftretende dorsale Zellvermehrung entsteht auch hier eine Faltenbildung. Die Zellvermehrung führt aber auch zur Bildung von überflüssigen Zellen, die teils den Linsenrand überbrücken, teils sich in das Linsengrübchen und später in das Linsenbläschen verirren und dort zugrunde gehen. Durch die entlang dem Rande des Linsenbläschens fortdauernde Zellvermehrung, die auch im Bereich der seitlichen Linsenabschnitte erfolgt, wachsen sich die den Linsenporus umgebenden Falten von allen Seiten entgegen, der Linsenporus verengert sich mehr und mehr und wird schließlich geschlossen. In der Mitte der Verwachsungsnäht kommt es dann zur Durchtrennung der beiden Blätter der Falten (des Ektoderms und der distalen Linsenwand) und dadurch zur Ablösung der Linse von ihrem Mutterboden. In anderen Fällen kommt es jedoch nicht zu einer vollkommenen Vereinigung der Faltenbildung, sondern es bleibt zunächst eine Lücke bestehen, über die lediglich das Ektoderm hinwegwächst. Die Lücke der distalen Linsenwand wird hierauf durch Zellen geschlossen.

entweder von den beiden Faltenrändern als solide Zellmassen in diese Lücke vor-
gebeugt oder von dem über den Linsenporus hinwegziehenden Ektoderm in die Lücke
eingegeben werden. Die reichliche Zellvermehrung an der Abschnürungsstelle der
Linse vom Ektoderm führt zur Bildung überschüssiger Zellen, die zugrunde gehen
können, um nicht die normale Linsenentwicklung zu stören. So stammen die degenerie-
renden Zellen im Linsenbläschen teils von solchen Zellen ab, teils handelt es sich um
in der Linse selbst gebildete und ausgestoßene Elemente. Das Ektoderm ist über den
Bereich der Linsenanlage hinaus, und besonders dorsal verdickt und wird erst einige
Zeit nach der Abschnürung des Linsenbläschens so dünn wie das übrige Oberflächen-
ektoderm. Diese Veränderung steht einerseits in enger Beziehung zu der Bildung der
Falten am Rande des Linsenbläschens, andererseits ist sie wahrscheinlich auch als ein
Ausdruck dafür anzusehen, daß einem größeren Ektodermbezirk die Fähigkeit zur
Linsenbildung innewohnt, als dem eigentlichen Anlagebezirk des Organs entspricht.

Seefelder (Innsbruck).

Odgers, P. N. B.: Some observations on the development of the ventral pancreas in
man. (Einige Beobachtungen zur Entwicklung der ventralen Pankreasanlage beim Men-
schen.) (*Dep. of Human Anat., Univ., Oxford.*) *J. of Anat.* **65**, 1—7 (1930).

Bei menschlichen Embryonen von 5 mm Länge besteht die zentrale Pankreas-
anlage aus 2 getrennten Lappen mit eigener Lichtung neben der Leberausstülpung.
Bei 7,1 mm Länge sind sie äußerlich zu einer einheitlichen Masse verschmolzen. Auch
bei 11,4 mm Länge ist der ventrale Pankreasgang noch doppelt. Die beiden ventralen
Pankreasanlagen sind also am Aufbau der fertigen Drüse beteiligt. *von Lanz.*

Costa, Antonio: Ricerche sulla sostanza cromotropa delle arterie nell'embrione
nel feto umano, in riferimento alla ipoplasia elastica e al significato della sostanza
cromotropa. (Untersuchungen über die chromotrope Substanz der Arterien beim Em-
bryo und beim Fetus des Menschen, unter Bezugnahme auf elastische Hypoplasie und
die Bedeutung der chromotropen Substanz.) (*Istit. di Anat. Pat., Univ., Firenze.*)
Patologica (Genova) **22**, 534—539 (1930).

Der Autor hat systematisch sowohl Arterien des muskulösen, wie auch solche des
elastischen Typus bei menschlichen Keimlingen (etwa 50 Keimlinge des verschiedensten
alters) untersucht und folgendes feststellen können: Alle embryonalen Arterien sind
reich an mucoider Substanz; die Differenzierung der elastischen Elemente läßt die
mucoide Substanz gänzlich oder fast gänzlich verschwinden; diese Substanz verschwin-
det auch in jenen besonderen Arterien des muskulösen Typus (Ductus arteriosus,
Nabelarterien), welche in einem bestimmten Zeitpunkte eine elastische Differenzierung
erfahren. — Ausgehend von diesen Feststellungen an embryonalen Arterien hat der
Autor auch Arterien des elastischen Typus bei erwachsenen Individuen, die keine
Zeichen einer Arteriosklerose oder einer Lues, wohl aber Zeichen einer elastischen
Hypoplasie aufwiesen, untersucht und festgestellt, daß in diesen Fällen die mucoide
Substanz in reichlichem Ausmaße vorhanden war, und zwar gerade in den Bezirken,
in denen die elastischen Systeme vermindert waren. — Auf Grund dieser Beobachtungen
neigt der Autor geneigt, die mucoide Substanz wenigstens in den hypoplastischen Arterien
als das Zeichen einer schwerwiegenden mangelhaften Differenzierung des indifferenten
Gewebes (im Sinne von Hueck) zu deuten. Bei den kompensatorischen Bestrebungen
folge von pathologischen Vorgängen (Arteriosklerose, Lues) zeigt die indifferente
Substanz der Arterien (im Sinne von Hueck) auch beim Erwachsenen Ansätze zu den
genannten Differenzierungen, d. h. unter pathologischen Bedingungen erfolgt beim
Erwachsenen eine Wiederholung der Erscheinungen, welche sich in der Embryonalzeit
in den Arterien abspielen.

Max Clara (Blumau b. Bozen).

Florian, J.: Über die Ausbildung des Stieles und die Ausdehnung der Amnionhöhle
in das Stielgewebe bei jungen menschlichen Embryonen. *Spisy l k. Fak. Masaryk.*
iv. Brno **8**, H. 71, 1—25 u. dtsh. Zusammenfassung 26 (1930) [Tschechisch].
Vgl. diese Ber. **16**, 443.

Systemlehre, Floristik, Faunistik, Paleobiologie.

Janke, A., und H. Laeroix: Entwurf eines natürlichen Systems der Bakterien und einer Klassifizierung der biochemischen Mikrobenleistungen. Zbl. Bakter. II 7 161—167 (1929).

Pascher, A.: Neue oder wenig bekannte Protisten. XXI. Neue Flagellaten. XII (Protomastiginae, Chrysomonadae, Heterochloridales, Volvocales, Eugleninae.) Arch. Protistenkunde 65, 426—464 (1929).

Shibuya, Masatake: Notes on two new Hypotrichous ciliates from the soil. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 155—156 (1929).

Skidmore, L. V.: Note on a new species of coccidia from the pocket gopher (*Geomys bursarius*) (Shaw). J. of Parasitol. 15, 183—184 (1929).

Hustedt, Friedrich: Untersuchungen über den Bau der Diatomeen, VII—VIII. Ber. dtsch. bot. Ges. 47, 101—110 (1929).

Huber-Pestalozzi, G.: Algologische Mitteilungen. VI. Algen aus dem Lago Muzzano. Arch. f. Hydrobiol. 20, 413—426 (1929).

Pevalék, Ivo: Beitrag zur Kenntnis der Süßwasseralgen der Insel Kkr. Acta bot. (Zagreb) 4, 42—58 (1929) [Kroatisch].

Pascher, A.: Neue Volvocalen (Polyblepharidinen-Chlamydomonadinen). Arch. Protistenkunde 69, 103—146 (1929).

Singer, R.: Eine neue *Russula*-Art: *Russula Mairei* nov. spec. Arch. Protistenkunde 65, 306—320 (1929).

Singer, R.: Neue Mitteilungen über die Gattung *Russula*. Hedwigia (Dresden) 69, 253—261 (1929).

Seroit, M.: Flechten aus Jugoslawien. Hedwigia (Dresden) 69, 1—38 (1929).

Jenkins, A. E., and J. G. Horsfall: A comparison of two species of *Plectodiscella*. Mycologia (N. Y.) 21, 44—51 (1929).

Hiratsuka, Naohide: Thekopsora of Japan. Botanic. Mag. (Tokyo) 43, Nr 50 12—22 (1929).

Hiratsuka, Naohide: *Chrysomyxa* of Japan. (Notes on the *Melampsoraceae* of Japan. II.) Botanic. Mag. (Tokyo) 43, 466—478 (1929) [Lateinisch].

Hotson, J. W.: *Papulospora atra* n. sp. Amer. J. Bot. 16, 219—220 (1929).

Killermann, S.: Die *Bulgaria*-Fr.-Gruppe. Hedwigia (Dresden) 69, 84—93 (1929).

Hutchinson, W. G.: An undescribed species of *Macrophoma* and of *Volutella* occurring on *Pachysandra terminalis*. Mycologia (N. Y.) 21, 131—142 (1929).

Seaver, Fred J.: Studies in tropical ascomycetes. VI. *Phyllachora simabae* cedromidis. Mycologia (N. Y.) 21, 178—179 (1929).

Sideris, C. P., and G. E. Paxton: A new species of *Mortierella*. Mycologia (N. Y.) 21, 175—177 (1929).

Sibilla, C.: Contributo alla Flora micologica del territorio di Anagni. Ann. di Bot. 18, 253—300 (1929).

Hruby, J.: Vorläufige Berichtigungen und Zusätze zum 1. Teil meiner „Beiträge zur Pilzflora Mährens und Schlesiens“ Hedwigia Bd. LXVII 1927. Hedwigia (Dresden) 69, 212—213 (1929).

Singer, R.: Pilze aus dem Kaukasus. Ein Beitrag zur Flora des südwestlichen Zentralkaukasus. Beih. z. bot. Zbl. Abt. 2, 46, 71—113 (1929).

Hubbard, C. E.: Notes on African grasses. VIII. *Snowdenia*, a new genus from Uganda. Bull. miscell. Informat. Nr 1, 28—32 (1929).

- Horsfall, James G.: Species of cercospora on trifolium, medicago, and melilotus. *Phytopathologia* (N. Y.) **21**, 304—312 (1929).
- Ohki, K.: On the systematic importance of the spodograms of the leaves of the fabaceae. VI u. VII. *Bot. Gaz.* **43**, 189—193 u. 479—489 (1929) [Japanisch].
- Okamoto, Yuji: A new species of *Ilex* in Yamato province. *Botanic. Mag.* (Tokyo) **71**—72 (1929).
- Parkin, John: Dioecism in *Ranunculus acris*. *Nature* (Lond.) **1929 I**, 568.
- Howell, John Thomas: A systematic study of the genus *Lessingia germanorum* m. *Univ. California Publ. Bot.* **16**, 1—44 (1929).
- Johansson, K.: Schwedische *Hieracia tridentata* Fr. *Ark. Bot.* **22 A**, Nr 12, 1—41 (1929) [Lateinisch].
- Johansson, K.: Neue Hieracien aus Mittelschweden. *Sv. bot. Tidskr.* **23**, 329—335 (1929) [Schwedisch].
- Sherff, Earl Edward: New or otherwise noteworthy compositae. III. *Bot. Gaz.* **88**, 309—319 (1929).
- Honda, M.: Nuntia ad Floram japoniae. II.—IV. *Bot. Gaz.* **43**, 189—193 (1929); *Bot. Mag.* (Tokyo) **43**, 291—294 u. 540—544 (1929) [Lateinisch].
- Hutchinson, J., and J. M. Dalziel: Tropical African plants. VII. *Bull. miscell. nat. hist.* Nr **1**, 16—28 (1929).
- Fukushima, Eiji: Preliminary report on Brassico-Raphanus Hybrids. *Proc. imp. Acad. Sci. (Tokyo)* **5**, 48—50 (1929).
- Heusser et J. V. S. Holder: Expériences sur un nouveau système de saignée pour les arbres greffés. *Rev. Bot. appl.* **9**, 715—718 (1929).
- Über die Tätigkeit der Arbeitsstätte für Pflanzenkrankheiten im Jahre 1927. *Versl. landbouwk. Wageningen* Nr **55**, 1—93 (1929) [Holländisch].
- Hollick, Arthur: New species of fossil plants from the tertiary shales near De Beque, Colorado. *Bull. Torrey bot. Club* **56**, 93—96 (1929).
- Billard, Armand: Note sur un genre nouveau et quelques espèces nouvelles d'Haleplidae. *Bull. Soc. zool. France* **54**, 305—307 (1929).
- Fischbierek, H.: Eine neue Epizoanthus-Art aus den japanischen Gewässern (*Epizoanthus enidosus* n. sp.). *Zool. Anz.* **85**, 28—33 (1929).
- Sibirjakov, O.: Zur Fauna Turbellaria Rhabdocoelida des Angora-Flusses. *Russk. Zool. obozr.* **8**, 237—249 u. franz. Zusammenfassung 250 (1929) [Russisch].
- Fuehs, Gilbert: *Diplogaster horticola* n. sp. *Zool. Anz.* **81**, 229—237 (1929).
- Steiner, G.: On a collection of Mermithids from the basin of the Volga River. *Zool. Anz.* **81**, 237—249 (1929).
- Abt. System., *Ökol. u. Geogr.* **57**, 303—328 (1929).
- Semenow, W. D.: Eine neue Nematodenart — *Rhabdias microoris* n. sp. — aus den Eingeweiden von Amphibien. *Zbl. Bakter. I Orig.* **114**, 533—539 (1929).
- Schuurmanns Stekhoven jr., J. H.: A rapacious marine nema living in the Zuiderzee. *Nederl. Tijdschr. dierkd.* **1**, 94—95 (1929).
- Schuurmanns Stekhoven jr., J. H.: Additional notes on *Diplogaster entomorphaga* n. sp. *Zool. Anz.* **83**, 265—267 (1929).
- Oldham, J. N.: On *Hymenolepis sinensis* n. sp.; a new cestode from the grey sand-piper (*Cricetulus griseus*). *J. of Helminth.* **7**, 235—246 (1929).
- Southwell, T.: Notes on the anatomy of *Stilesia hepatica*, and on the genera of the family Thysanosominae (including Avitellinae). *Ann. trop. Med.* **23**, 47—66 (1929).
- Hilmy, I. S.: *Bothriocephalus scorpii*. (Mueller, 1776) Cooper, 1917. *Ann. trop. Med.* **23**, 385—396 (1929).

Wlassenko, P. M.: Zur Systematik und Diagnostik der Gattung *Halipegus* Loew und der Familie Halipegidae Poche. Zool. Anz. 86, 21—27 (1929).

Southwell, T., and I. S. Hilmy: On a new species of *Phyllobothrium* (*P. microsoma*) from an Indian shark. Ann. trop. Med. 23, 381—383 (1929).

Hrabě, S., und L. Černosvitov: Über die Oligochäten des Tschalkar-Sees. (Zool. Inst., Univ. Brno u. Prag.) Russk. gidrobiol. ž. 8, 211—216 u. dtsh. Zusammenfassung 216—217 (1929) [Russisch].

Hrabě, Sergěj: Zur Diagnose mährischer Tubificiden und Lumbriculiden. Biolog. Listy 14, 380—385 (1929) [Tschechisch].

Hrabě, Sergěj: Zwei neue Lumbriculiden-Arten sowie einige Bemerkungen zur Systematik einiger bereits bekannter. Zool. Anz. 84, 9—21 (1929).

Hrabě, Sergěj: *Lamprodrilus mrázeki*, eine neue Lumbriculiden-Art (*Oligochaeta*) aus Böhmen. Zool. Jb. Abt. System., Ökol. u. Geogr. 57, 197—214 (1929).

Hrabě, Sergěj: *Lamprodrilus Michaelsoni*, eine neue Lumbriculiden-Art aus Madagaskar. Arch. f. Hydrobiol. 20, 163—179 (1929).

Okada, Yô K.: *Saccinereis* of *Procerastea*. J. Mar. biol. Assoc. U. Kingd. 325—328 (1929).

Augener, H.: Über die systematische Stellung und die Viviparität von *Syllis* in der Gattung *O. Fabr.* Zool. Anz. 81, 82—88 (1929).

Oka, Asajiro: Sur une nouvelle *Placobdella*, parasite d'une crevette fluviatile de Formose. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 249—251 (1929).

Oka, Asajiro: Révision des herpobdelles d'Extrême Orient. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 277—279 (1929).

Caroli, Angelo: Nota sui tomopteridi di Messina. Atti Accad. Fisiocritici Siena 509—516 (1929).

Navosov-Lavrov, N.: Eine neue Art von *Anomura* aus dem Ochotskimeer. Russk. gidrobiol. ž. 8, 174—177 u. engl. Zusammenfassung 177—178 (1929) [Russisch].

Smirnov, S.: Notiz über *Heterocope borealis* (Fischer) in der Umgegend von Kostroma (Zentralrußland). Russk. gidrobiol. ž. 8, 124—128 u. dtsh. Zusammenfassung 128 (1929) [Russisch].

Keiser, N.: Über eine neue Art der Gattung *Eurytemora*—*Eurytemora composita* sp. nova. Zool. Anz. 80, 301—305 (1929).

Smirnov, Sergius: Notiz über *Eurytemora composita* Keiser. Zool. Anz. 85, 371 bis 320 (1929).

Labbé, Alphonse: *Favorinus albus* Alder et Hancock est-il une espèce en dissociation? Bull. Soc. zool. France 54, 594—597 (1929).

Willmann, C.: Zwei neue Malaconothridae aus Java. Zool. Anz. 83, 89—92 (1929).

Nieholls, G. E.: Some new species of *Stenetrium* from Western Australia. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 54, 361—374 (1929).

Petrunkévitch, Alexander: The spider fauna of Panama and its Central American affiliation. Amer. Naturalist 63, 455—469 (1929).

Birula, A.: Über *Galeodes sulphureopilosus* Bir. Zool. Anz. 84, 161—168 (1929).

Birula, A.: Über *Galeodes armeniacus* n. sp. Zool. Anz. 84, 273—282 (1929).

Järnefelt, H.: Ein kurzer Überblick über die Limnologie Finnlands. Verh. internat. Ver. theor. u. angew. Limnol. 4, 400—407 (1929).

Douence, A.: Principales espèces nuisibles. Rev. Zool. agricole et appl. 28, 113 bis 123 (1929).

- Froggatt, Walter W.: Notes on gall-making coccids, with descriptions of new species. c. Linnean Soc. N. S. Wales 54, 375—378 (1929).
- Schwetz, J.: Le problème des glossines et des trypanosomiasés animales dans la région du lac Kivu. Note prélim. Ann. Soc. belge Méd. trop. 9, 391—402 (1929).
- Fritsch, Karl: Beobachtungen über blütenbesuchende Insekten in Steiermark, 1909. Gesber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturwiss. Kl. I 138, 93—111 (1929).
- Horn, V.: Die Zukunft der Insektensystematik. Žaščita Rasten. ot Vredit. 6, 1—152 (1929) [Russisch].
- Horn, W.: Über die Zukunft der Insekten-Systematik. Anz. Schädlingsskde 5, 45 (1929).
- Jakhontov, V. V.: Eine neue Thrips-Art der Gattung Scolothrips Hinds. aus dem Chahara-Bezirk. Zool. Anz. 83, 273—274.
- Sjöstedt, Yngve: Acridiidea aus Zentralafrika gesammelt von R. Grauer während der Expedition 1909—1911. Ark. Zool. 20 A, Nr 15, 1—41 (1929).
- Stackelberg, A. v.: Dolichopodiden-Studien. II. Neue oder wenig bekannte Dolichopodenarten aus Ostsibirien. Zool. Anz. 84, 169—180 (1929).
- Adler, S., and O. Theodor: The distribution of sandflies and leishmaniasis in Palestine, Syria and Mesopotamia. (Microbiol. Inst., Univ., Jerusalem.) Ann. trop. Med. 10—306 (1929).
- Sinton, J. A.: Notes on some Indian species of the genus Phlebotomus. XXIV. Phlebotomus barraudi n. sp. Ind. J. med. Res. 16, 716—724 (1929).
- Hodson, W. E. H.: The bionomics of Lema melanopa, L. (Cricocerinae). in Great Britain. Bull. entomol. Res. 20, 5—14 (1929).
- Semenov-Tian-Shanskij, A., und S. Medvedev: De Aphodiinis novis del minus cognitis (Coleoptera, Scarabaeidae). II. Russk. entomol. Obozr. 23, 83—88 (1929) [Russisch].
- Aurivillius, Chr.: Cerambycidae. Zool. Jb. Suppl. 16, 1—10 (1929).
- Schwarzer, B.: Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museums (Ins. Col.). Senckenbergiana 11, 353—379 (1929).
- Pic, M.: Contribution à l'étude du genre Pseudometaxis Jac. (Col.). Bull. Soc. zool. France 54, 140—141 (1929).
- Pic, M.: Coléoptères phytophages nouveaux. Bull. Soc. zool. France 54, 138—139 (1929).
- Ohaus, F.: Neue Lucaniden (Ins. Col.) des Senckenberg-Museums. Senckenbergiana 11, 155—159 (1929).
- Pic, M.: Coléoptères exotiques nouveaux ou peu connus. Bull. Soc. zool. France 54, 43—46 (1929).
- Peyerimoff, P. de: Sur deux Coléoptères recueillis par M. G. Seurat dans les eaux saumâtres des chotts tunisiens. Bull. Soc. Histoire natur. Afrique N. Alger 20, 120—121 (1929).
- Lacroix, J.-L.: Quelques mots sur les chrysopides. Rev. Zool. agricole et appl. 29—141 (1929).
- Shibuya, Jinshichi: On the known and unrecorded species of the Japanese pyraustine (Lepid.). J. Fac. of Agricult. (Sapporo) 25, 151—242 (1929).
- Sicard, A.: Description de deux espèces nouvelles de Coccinellides paléarctiques. Soc. Histoir. natur. Afrique N. 20, 60—62 (1929).
- Ioff, I.: Zur Systematik und Ökologie der Flöhe der Springmäuse (Dipodidae). Zool. Jb. Abt. System., Ökol. u. Geogr. 58, 358—388 (1929).

Horváth, G.: Rhynchoten aus Palästina und Syrien. Sitzgsber. Akad. Wiss. W. Math.-naturwiss. Kl. I 138, 329—334 (1929).

Labbé, Alphonse: Remarques sur les genres *Aeolidiella* Bergh, *Spurilla* Bergh, *Berghia* Trinchese. Bull. Soc. zool. France 54, 619—630 (1929).

Hoffmann, H.: Über einige Nacktschnecken von den Neuen Hebriden. Zool. Anz. 84, 108—118 (1929).

Pruvot: Appendice à l'article de Mme. A. Pruvot-Fol. Sur *Boopsis mediterranea*. Bull. Soc. zool. France 54, 570—571 (1929).

Käufel, Franz: Beitrag zur Kenntnis der spanischen Clausiliiden, gesammelt von Dr. F. Haas in den Jahren 1914—1917. Senckenbergiana 11, 13—21 (1929).

Rensch, Ilse: Drei neue Papuinaarten aus dem Bismarekarchipel und Neuguinea. Zool. Anz. 85, 49—52 (1929).

Pruvot-Fol, A.: Variations spécifiques et variations individuelles dans le sous-ordre des ascoglosses. Note de systématique. Bull. Soc. zool. France 54, 526—531 (1929).

Seki, Haruo: Description of a new species of oyster from Japan. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 477—479 (1929).

Sidorov, S.: Die Mollusken des Aral-Sees und seiner nächsten Umgebung. Russk. gidrobiol. Ž. 8, 13—37 u. franz. Zusammenfassung 37 (1929) [Russisch].

Jaekel, S.: Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna in der Elbe bei Hamburg. Zool. Anz. 83, 112—114 (1929).

Jaekel, S.: Zur Kenntnis der Molluskenfauna des Oberinn- und Radurscheltals. Zool. Anz. 80, 21—26 (1929).

Jaekel, Siegfried: Zur Kenntnis der Mollusken der chinesischen Provinz Fukien. Zool. Anz. 81, 197—201 (1929).

Hoffmann, H.: Die Vitrinen der Atlantischen Inseln. Senckenbergiana 11, 238 bis 235 (1929).

Oka, Asajiro: Über eine neue gestielte Monascidie *Podocynthia turboja* n. g. n. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 94—96 (1929).

Oka, Asajiro: Über *Redikorzevia*, ein neues Genus von einfachen Ascidien. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 5, 434—437 (1929).

Zavattari, Edoardo: Malacofauna e schistosomiasi nel bacino del Mediterraneo. Arch. ital. Sci. med. colon. 10, 121—130 (1929).

Pruvot-Fol, A.: Diagnose d'une cynthiadée nouvelle draguée au voisinage de Port des pins, Nouvelle-Calédonie: *Stolonica vivipara* n. sp. Bull. Soc. zool. France 54, 528 bis 573 (1929).

Holly, Maximilian: Beitrag zur Kenntnis der Fischfauna Persiens. Zool. Anz. 83, 183—185 (1929).

Ozolin, Viktor: Ein laichreifes *Lumpenus lampretaeformis* Walbaum ♀ aus dem Rigaischen Meerbusen. Fol. zool. (Riga) 1, 1—8 (1929).

Oeser, R.: *Racophorus leucomystax*, seine Pflege und Zucht. Bl. Aquar. 4, 375—378 (1929).

Chabanaud, Paul: Sur *Platyrrhina Schoenleini* Müller et Henle. Bull. Soc. zool. France 54, 558—562 (1929).

Selater, W. L.: Notes on the early sources of our knowledge of African ornithology. J. Ornithol. Erg.-Bd 2, Festschr. Ernst Hartert 184—196 (1929).

Hubbard, Wynant Davis: Further notes on the mammals of Northern Rhodesia and Portuguese East Africa. J. Mammal. 10, 294—297 (1929).

- Phillips, W. W. A.: A check list of the mammals of Ceylon. *Spolia Zeylan.* (Colombo) 1, 119—152 (1929).
- Serebrennikov, M. K.: Ein Flatterhörnchen aus dem Kirgisengebiet. *Z. Säugetierkunde* 4, 142—143 (1929).
- Ogneff, S. J.: Zur Systematik der russischen Hasen. *Zool. Anz.* 84, 69—83 (1929).
- Ogneff, S. J.: Über einige Nagetiere Ostsibiriens. *Zool. Anz.* 83, 71—89 (1929).
- Phillips, W. W. A.: Two new rodents from the Highlands of Ceylon. *Spolia Zeylan.* (Colombo) 15, 165—168 (1929).
- Joleaud, L.: Etudes de géographie zoologique sur la berbérie. Les ruminants. Les gazelles. *Bull. Soc. zool. France* 54, 438—457 (1929).
- Josseliani, N., und Joh. Wolg. Amschler: Das Georgische Rind (*Bos taurus brachyros*). *Landw. Jb.* 69, 327—359 (1929).
- Lavauden, L.: Sur un nouveau carnivore malgache du genre *Eupleres*. *C. r. Acad. Sci. Paris* 189, 197—199 (1929).
- Sickenberg, Otto: Eine neue Antilope und andere Säugetierreste aus dem Oberöocän Niederösterreichs. *Palaeobiologica* (Wien u. Lpz.) 2, 62—86 (1929).

Vergleichende Physiologie. Stoffwechsel.

Ernährung. (*Stoffaufnahme, Assimilation.*)

- Schuurmans Stekhoven jr., J. H., and Th. P. J. Botman: On the biology of feeding and digestion in *Proleptus obtusus* (Spiruroidea, Nematoda). (Biologie der Nahrungsaufnahme und Verdauung von *Proleptus obtusus* [Spiruroidea, Nematoda].) (*Zool. Meded., Univ., Utrecht.*) *Tijdschr. nederl. dierkd. Verigg* III s. 2, 60—61 (1930).
- Kurze Mitteilung über biologische Beobachtungen des Darminhaltes dieses Parasiten an Haifischen und einige hauptsächlich auf den Verdauungstrakt bezügliche, morphologische Angaben. Die Verdauung findet durch extraintestinale Sekretion statt, die Resorption im eigentlichen Darmtrakt, wozu das Tier durch die Differenzierung seiner Eingeweide einen Halsabschnitt und den Oesophagus besonders befähigt erscheint. v. Querner (Wien).
- Sipizina, N.: Die Rolle der organischen Kolloide des Wassers bei der Ernährung der Larve von *Anopheles maculipennis*. *Izv. biol. Inst. perm. Univ.* 7, 171—194 u. gl. Zusammenfassung 190—193 (1930) [Russisch].
- Die Verf. machte sich zur Aufgabe, die Größe der Partikel festzustellen, die von den *Anopheles*-Larven aufgenommen werden können, ferner, ob die Larven in filtriertem Wasser leben und gedeihen können, welches kleinste organische Partikel, namentlich Kolloide enthält, und die Wassermenge zu bestimmen, die die Larve in einer Zeiteinheit aufnehmen kann. Die Wasserlösungen enthielten hochdisperse Stoffe: chinesische Tusche, Eisen und kolloidales Silber (Kollargol). Es ergab sich, daß die Larven kolloidale Partikel aus dem Wasser aufnehmen und auf Kosten der im Wasser vorhandenen organischen Kolloide leben und wachsen können. Für die normale Entwicklung der Larven genügt nicht die Ernährung mit nur einer kolloiden Fraktion. In natürlichen Verhältnissen stehen aber den Larven in dem Wasser von Teichen verschiedene Kolloide zur Verfügung, die zu ihrer Ernährung dienen. F. Dörbeck (Berlin).
- Krijgsman, B. J., und G. L. Windred: Reizphysiologische Untersuchungen an blutsaugenden Arthropoden im Zusammenhang mit ihrer Nahrungswahl. II. Teil: *Lyperosia exigua*. (*Zool. Abt., Tierärztl. Staatsinst., Buitenzorg, Java.*) *Z. vergl. Physiol.* 61—73 (1930).

Die Frage, auf welche Reize und in welcher Weise die Fliegen reagieren müssen, um ihre Nahrung zu finden, wurde an *Lyperosia exigua* weiter untersucht (vgl. die Versuche mit *Stomoxys calcitrans*, diese Ber. 15, 340). L. zeigt deutliche Chemotaxis und orientiert sich thigmotaktisch. Auf Wärmereize und Hautgerüche

verschiedener Säugetiere reagiert L. mit taktischen Bewegungen, Rüsselstrecken und Stechbewegungen. L. hat ein Fernperzeptionsvermögen für Wasser. Sie reagiert auf Wasserreize sowie auf Blut und Serum mit positiv taktischen Bewegungen, Rüsselstrecken und Saugreaktionen. Zwischen Wirtsindividuen derselben Art wird, wenn die Haut der Wirtstiere denselben Reinheitsgrad hat, nicht unterschieden. Zwischen Hautgerüchen verschiedener Wirtstierarten werden von L. Unterschiede gemacht. In den angestellten Versuchen zeigen Stomoxys und Lyperosia große Ähnlichkeit, obgleich einige Unterschiede festgestellt werden konnten. (I. vgl. diese Ber. 15, 340.. Voelkel (Berlin-Dahlem).

Boettger, Caesar R.: Studien zur Physiologie der Nahrungsaufnahme festgewachsener Schnecken. Die Ernährung der Wurmschnecke *Vermetus*. Biol. Zbl. 50: 581—598 (1930).

Ausgehend von einer alten Angabe P. de Rougemonts, nach der *Vermetus* seine Nahrung mit Hilfe des Schleims der großen Fußdrüse sich verschafft, untersuchte der Verf. die Nahrungsaufnahme der Vermetidae teils an frischem Material in Neapels und teils an Insassen des Berliner Aquariums. Es zeigte sich, daß *Vermetus* Schleimfäden bis zu einer Länge von 30 cm (bei großen Tieren) ausstößt und diese dann mit dem hängengebliebenen Plankton frißt. Da Krebstiere des Planktons, die an den Schleimfäden hängen bleiben, sehr schnell absterben, wurde der Schleim auf Anwesenheit eines Giftes untersucht. Ein solches wurde jedoch nicht festgestellt. Da die Schnecken im Versuch ihre Schleimfäden nur bei Anwesenheit von Plankton ausstießen, wurde vom Verf. auf die Auslösung der Reaktion geachtet. Es zeigte sich, daß optische Reize wie die Schattenwirkung der Planktonten nicht in Betracht kamen. Chemische Reize spielen insofern eine Rolle, als durch einen Extrakt von Planktonkrebseisen sehr wohl erreicht werden kann, daß die Wurmschnecken weit aus ihren Schalen herauskommen und die Fußtentakel spielen ließen. Nie stießen sie aber Schleimfäden aus. Diese Ausstoßung wird nur durch die Bewegung der Planktontiere im Wasser ausgelöst.

Otto Gaschott (München).

Groebbel, Franz: Die Verdauung bei der Hausgans, untersucht mit der Methode der Dauerkanüle. (Physiol. Inst., Allg. Krankenh. Hamburg-Eppendorf, Univ. Hamburg.) Pflügers Arch. 224, 687—701 (1930).

Untersuchungen an 14 Gänsen, denen nach einer kurz beschriebenen Methode Dauerkanülen aus Aluminium in das Duodenum, den Muskelmagenausgang, den Muskel- und Drüsenmagen eingesetzt werden. Fütterung mit an Tr. S. äquivalenten Mengen von Hafer, Gerste, Mais, Kartoffeln, Weiß- und Schwarzbrot, Kleie, gelben Rüben. Bei der Gans ist der Rücklauf in das Duodenum eingeführter Flüssigkeiten normalphysiologisch, es fehlt der Pylorusreflex. Gesetzmäßige Beziehungen zwischen Muskelmagenkontraktion und Austritt von Nahrung aus dem Muskelmagen bestehen nicht. Die Verweildauer im Magen beträgt für Körnerfutter 4, für Kartoffeln $2\frac{1}{2}$ —3, für Brot 2— $2\frac{1}{2}$ Stunden und ist wesentlich von der mechanischen Konsistenz des Futters abhängig. Gerösteter oder zermahlener Hafer zeigt keine Änderung der Verweildauer. Werden die Tiere zwangsgefüttert, so ist die Verweildauer deutlich verlängert. Das Reibegeräusch des Muskelmagens, das schon auftreten kann, wenn die Nahrung nur in den Drüsenmagen gelangt, ist bei Fütterung mit Körnern stets, bei Kartoffelfütterung nicht vorhanden. Seine Frequenz ist bei Körnerfütterung größer als bei Brotfütterung. Sand und Steinchen verlassen den Muskelmagen bei Körnerfütterung in den ersten Stunden in reichlicher Menge, bei Kartoffelfütterung nur in geringer. Es können Steinchen aus dem Muskelmagen in den Drüsenmagen treten. Wasser oder Milch, die getrunken, laufen ohne Verweilen durch die beiden Mägen durch. Die auf äquivalente Mengen Nahrungsmittel abgesonderten Sekretmengen folgen sich, die größte Sekretmenge vorangestellt, in der Reihe: Kartoffeln, Hafer, Gerste, Mais, Brot. Auf Zwangsütterung und Hungern ist die Sekretmenge deutlich herabgesetzt. Während auf Kartoffeln und Brot mit Zunahme der Nahrungsmenge die Sekretmenge

hchst, ist dies bei Körnerfutter nicht der Fall. Die Galle gelangt bei der Gans bis in den Drüsenmagen, Amylase bis in den Muskelmagen. Die Verdauung der Kohlehydrate setzt stets schon im Muskelmagen ein, die des Eiweißes im Drüsenmagen. Es stehen keine Gesetzmäßigkeiten zwischen Übertritt der Nahrung in den Dünndarm und Absonderung von Galle und Pankreassaft. Nahrung kann wahrscheinlich bei der Verdauung zwischen Muskel- und Drüsenmagen hin und her geschoben werden.

Groebbel (Hamburg).^o

Wöhlbier, Werner: Die Bestimmung der Verdaulichkeit des Rohproteins mittels Versuchsversuch und auf künstlichem Wege. (II. Mitt.) (*Landwirtschaftl. Versuchsstat., Stockholm i. M.*) Tierernährg 1, 467—501 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 578.

o o

Winiwarter, H. de: Influence du régime albumineux sur le nombre des leucocytes de la muqueuse intestinale de la souris. (Der Einfluß einer Eiweißkost auf die Zahl der Leukocyten in der Darmschleimhaut der Maus.) (*Laborat. d'Histol., Univ., Liège.*) C. r. Soc. Biol. Paris 104, 121—123 (1930).

Es standen eine größere Anzahl von Mäusen zur Verfügung, bei denen es gelungen war, die streng einseitige Ernährung durchzuführen. Monatelang, bisweilen über ein Jahr, war ein Teil der Tiere ausschließlich mit Kohlehydraten ernährt worden, ein anderer Teil entprechend mit Fett und eine dritte Gruppe nur mit Eiweiß. Zu erwähnen ist, daß die Tiere in diesen Ernährungsformen sich nicht fortpflanzen. Es wurde die Schleimhaut aus verschiedenen Abschnitten des Dünndarms zwischen Pylorus und Coecum untersucht. Ein Teil der Tiere wurde nüchtern, andere 1—2½ Stunden nach der letzten Nahrungsaufnahme untersucht. Die mit Fett oder Kohlehydrat ernährten Mäuse zeigten den gleichen Befund wie solche Tiere, die das gewöhnliche gemischte Futter erhalten: etwa 2 Stunden nach der Nahrungsaufnahme findet man eine kleine Anzahl von weißen Blutzellen in den Zotten und in der Wand des Dünndarms. Es handelt sich überwiegend um Lymphocyten, einige Eosinophile und Plasmazellen und vereinzelte Monocyten (Makrophagen). Die ausschließlich mit Eiweiß ernährten Tiere bieten ein wesentlich anderes Bild. Schon die Gestalt der Zotten ist vielfach verändert. Jede dritte Zotte ist nicht fadenförmig, sondern zeigt eine aufgetriebene Spitze wie ein Köpfchen. Diese Formveränderung entsteht durch eine Anhäufung von Monocyten in der Spitze der Zotte, woselbst sie einen dichten rundlichen Haufen bilden. Sie sind durch gegenseitigen Druck polygonal, enthalten ein oder mehrere Kerne, aber keine sichtbaren Einschlüsse. Mehr isoliert in Reihen oder lockeren Haufen, findet man die gleichen Zellen an der Basis der Zotten, zwischen den Lieberkühnschen Krypten, ja bis in die Muscularis hinein. Neben den Monocyten, aber nicht mit ihnen vermischt, erscheinen zahlreiche Eosinophile, meist in Häufchen. Die Lymphocyten scheinen nicht vermehrt zu sein. Die Eiweißverdauung verläuft aber offenbar zu einem lebhaften Zerfall von Leukocyten. Man findet zahlreiche Zellkörper überraschenderweise gerade in der Muscularis. Der Mitochondrienapparat in den Monocyten zeigt nichts Besonderes; Fett ist durch Sudanfärbung in ihnen nicht nachzuweisen. In der Zottenachse und in der Tiefe der Darmwand sind allerdings Spuren von Fett nachweisbar, aber erheblich weniger als bei Kohlehydraternährung und selbstverständlich als bei Fettfütterung.

H. Simmel (Gera).^{oo}

Dawes, Ben: The absorption of fats and lipoids in the plaice (*P. platessa* L.). (Die Absorption von Fetten und Lipoiden bei der Scholle.) J. Mar. biol. Assoc. U. Kingd., London, 17, 75—102 (1930).

Der Verf. hat die Fettabsorption bei der Scholle mit den üblichen Darstellungsmethoden untersucht und macht genaue Angaben über den Verdauungsvorgang bei Fütterung mit Muskeln und Würmern. Im Magen weisen alle 3 Zelltypen nach 6- bis 12stündigem Fasten Fett auf, während es in der Schleimhaut aller postpylorischen Abschnitte ganz fehlt. Nach 30 und 50 Stunden der Magenverdauung zeigt der Fettgehalt im Magenoberflächenepithel eine deutliche Zunahme, was beweist, daß der Magen ein Organ der Fettabsorption ist. Nach der Verdauung fetthaltiger Nahrung finden sich im Epithel des Duodenums und des übrigen Dünndarmes beträchtliche Fettmengen. Auch das Rectum ist einer Fettabsorption fähig, aber in viel geringerem Maße als Duodenum und Dünndarm. Wenn die Häufigkeit der Mahlzeiten gesteigert wird, ist ein Übergang der Fettabsorption vom Magen auf den postpylorischen Teil des Dünndarmes anzunehmen. In der reticulären Gewebsschichte des Verdauungstraktes werden wirkliche Fetttröpfchen nicht typischerweise beobachtet, obwohl

Lipoidkörnchen in großer Zahl angetroffen werden können. Ein Wiederaufbau von Spaltprodukten der Fette ist in dieser Schichte nicht anzunehmen. V. Patzelt (Wien).

Basch, Felix, und Hans Mautner: Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Resorption. (*Pharmakol. Inst., Univ. Wien.*) Naunyn-Schmiedebergs Arch. 151, bis 90 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 351.

Stoffwanderung. (*Wasserhaushalt der Pflanzen, Lymph- und Blutkreislauf der Tiere*)

● **Ergebnisse der Biologie.** Hrsg. v. K. v. Frisch, R. Goldschmidt, W. Ruhland H. Winterstein. Redig. v. H. Winterstein. Bd. 6. Berlin: Julius Springer 1930. V. 764 S. u. 142 Abb. RM. 76.—.

Seybold, A.: Die pflanzliche Transpiration. Tl. 2. S. 559—731 u. 40 Abb.

Nachdem in dem 1. Teile dieser monographischen Darstellung (vgl. diese Ber. 13, 61) die physikalische Komponente der Transpiration behandelt war, wird in diesem Teile die pflanzliche Transpiration vom Standpunkt der Wasserbilanz der lebenden Zelle aus betrachtet. Darnach gliedert sich die Arbeit in 2 Hauptteile, die Physiologie und die Ökologie der Transpiration. Bevor auf die physiologischen Ergebnisse eingegangen wird, ist die osmotische Zustandsgleichung als Grundlage des Wasser- und Stoffaustausches einer lebenden Zelle besprochen. Es folgen dann Kapitel über die Abhängigkeit der Transpirationssysteme von den verschiedenen Faktoren, Wassergehalt, Temperatur, Licht, Wind, chemische Agenzien, als auch Korrelationen der Transpiration mit sonstigen physiologischen Prozessen. In dem 2. Hauptteile, der Ökologie der Transpiration, werden solche Arbeiten zusammengefaßt, die „unter natürlichen Bedingungen“ eine Analyse eines Prozesses versuchen. Die große Menge solcher Untersuchungen und die vielen Gesichtspunkte und Methoden, mit denen sie angestellt wurden, macht sowohl eine einheitliche Darstellung als auch Herausarbeitung der tatsächlichen Ergebnisse zu einem schwierigen Unternehmen. So gut es auch möglich ist, für die „Physik der Transpiration“, d. i. der Verdunstung, gültige Gesetze aufzustellen, so unmöglich ist heute noch, den Transpirationsprozeß von verschiedenen Pflanzengesellschaften, mit verschiedenen anatomisch-morphologischen Strukturen, verschiedenen Außenbedingungen ausgesetzt, in allgemeingültige Regeln zu bringen. So gibt Verf. auch in dieser Monographie eine Zusammenstellung der Einzeluntersuchungen getrennt nach Pflanzengesellschaften, Hygromorphe, Xeromorphe, Subkulente, Halophyten, Mangroven, Solfataren, Mesophyten, Epiphyten und Parasiten. Es wird aber versucht, auch diese Literatur kritisch zu sichten und vor allem alles Spekulative und Unsichere, das leider einen großen Teil der ökologischen Literatur anhaftet, auszuschließen. — Auf Einzelheiten dieses Sammelreferates kann nicht eingegangen werden. Es ist jedoch nicht nur eine Nebeneinanderstellung und Wiedergabe bisheriger Versuchsergebnisse, sondern vollständig subjektiv vom Standpunkte des Verf.s aus behandelt, in dem Bemühen, das ganze Problem von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus zu betrachten. Dies — bei der ungeheuren Masse der Transpirationsliteratur keine leichte Aufgabe — hat nicht nur die Möglichkeit einer schnellen Orientierung des bisher Geleisteten zur Folge, sondern läßt auch die Lücken und die Widersprüche in unserer Kenntnis und Anschauung dieses wichtigen pflanzlichen Prozesses erkennen. Damit soll nicht gesagt sein, daß der Standpunkt des Verf.s in allen Punkten ohne Widerspruch hingenommen werden muß.

E. Schratz (Berlin-Dahlem).

Haselhoff, E., Fr. Haun und W. Elbert: Versuche über die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. (*Landwirtschaftl. Versuchsanst., Harleshausen.*) Landw. Versuchsstat. 111, 11—62 (1930).

Um die Beziehungen zwischen Nährstoffbedarf der Pflanzen bzw. die Nährstoffaufnahme mit dem Wachstumsverlauf und der Erzeugung von organischer Substanz festzustellen, haben Verf. in den Jahren 1919—1929 Düngungsversuche an Roggen, Hafer, Winterweizen, Erbsen und Kartoffeln durchgeführt. Von den Getreidearten

len Ernten genommen vor dem Schossen, am Ende der Blüte und in der Vollreife, den Erbsen grün und in der Vollreife und von den Kartoffeln nach Beginn des Massenansatzes und in der Vollreife. Außer dem Ertrag wurden in der Erntemasse Stickstoff, Kalk, Magnesia, Kali und Phosphorsäure. Die Versuche ergeben, für die Getreidearten die Gesamtmenge der in den geernteten Pflanzen vorhandenen Nährstoffe mit der Zufuhr der betreffenden Nährstoffe in der Düngung parallel; da wo ein Nährstoff in der Düngung zurücktritt, ist auch eine mehr oder weniger Abnahme dieses Nährstoffes in den geernteten Pflanzen fast allgemein festzustellen. Man erkennt daraus die Notwendigkeit der frühzeitigen Versorgung mit Stickstoff, Kali und Kalk bis zur Zeit der Blüte, während sich für Phosphorsäure eine gleichmäßige Versorgung bis über die Zeit der Blüte hinaus ergibt. Bei den Erbsen sind die Unterschiede in der Gesamtmenge der Nährstoffe der Pflanzen von derselben Art in den beiden Erntestadien größer, als sie bei den untersuchten Gramineen bemerkt worden sind. Trotzdem nur 2 Probenahmen stattgefunden haben, kann man den festgestellten Zahlen bei allen Bestandteilen das starke Überwiegen in der Erbsenpflanze erkannt werden, woraus man auf die Notwendigkeit der zeitigen Versorgung der Erbsen mit den angegebenen Nährstoffen schließen darf. Bei den Kartoffeln gegen Ende der Vegetation in der Gesamtmenge der Bestandteile eine starke Zunahme festzustellen, worin ein bemerkenswerter Unterschied gegenüber den Gramineen zu sehen ist. Daraus kann man folgern, daß die Kartoffel auch in der späteren Vegetationszeit Nährstoffe benötigt und mehr als die Gramineen die langsamer wirkenden Nährstoffe aufnehmen wird.

Günther (Landsberg, Warthe).

Scheitler, Hertha, und Friedl Weber: Osmotischer Wert bei Harnstoff-Endlösung. (*Pflanzenphysiol. Inst., Univ. Graz.*) *Protoplasma* (Berl.) **11**, 158—167 (1930). Da festgestellt wurde, daß sich schwach geöffnete Stomata an Blättern von *Ranunculus ficaria* nach Infiltration mit stark hypertonischer Harnstofflösung nicht schließen, so schickte sich weiter in den Schließzellen auch keine Plasmolyse ein, wurde angenommen, die Schließzellen für Harnstoff außerordentlich leicht permeabel sind. Wenn dies nicht der Fall ist, so mußte in diesem Falle der osmotische Wert der Schließzellen zunehmen. Tatsächlich wurde nun bei frischen Blättern gefunden, daß der osmotische Wert der Schließzellen bei Grenzplasmolyse einer höchstens 12proz. Traubenzuckerlösung entspricht, während bei mit 18proz. Harnstofflösung infiltrierten Blättern eine 20proz. Traubenzuckerlösung noch hypotonisch war. Bei langandauerndem Aufenthalt in 18proz. Zuckerlösung tritt jedoch eine teilweise Plasmolyse ein, was so zu erklären ist, daß allmählich eine Exosmose des Harnstoffes stattgefunden hat. Analog waren die Verhältnisse bei Blättern von *Vicia Faba*, wo nach Infiltration mit 18proz. Harnstofflösung selbst eine 40proz. Traubenzuckerlösung keine Plasmolyse herbeiführte. Ein gleiches Verhalten zeigen die Schließzellen der genannten Pflanzen auch Glycerin gegenüber.

J. Kissler (Wien).

Merkenschlager, F.: Die Wasserbilanzkrisen der Kulturpflanzen und ihre phyto-pathologische Bedeutung. *Angew. Bot.* **12**, 442—446 (1930).

Die Weißährigkeit des Hafers und die Blattrollkrankheit der Kartoffel sind Ausdrucksformen einer gestörten Wasserbilanz. Der Abbau der Kartoffel ist eine durch die Schwankungen des Wasserspiegels erschütterte Zellorganisation, in der die Erhöhung des Salzspiegels zu schweren Kolloidschädigungen führt. Der salzempfindliche Hafer wird durch einen Konzentrationsanstieg, bevor die tiefe Wurzel den Fehlbetrag an Wasser heraufpumpt, in seinen äußersten Verzweigungen (Rispen) überfordert (Weißährigkeit), oder aber, wenn ungünstige Bodenreaktionen die Wurzelabsorption ineffizient von vornherein niedrig halten, entstehen Chlorophylldefekte (Dörrfleckkrankheit). Viele, natürlich nicht alle der bisher parasitologisch behandelten Pflanzenkrankheiten sind offenkundig Ausdrucksformen von Wasserbilanzkrisen mit sekundären Infektionen.

Sartorius (Musbach).

Baustoffwechsel.

Tschesnokov, V., und K. Bazyrina: Die begrenzenden Faktoren bei der Photosynthese. (*Laborat. f. Pflanzenphysiol., Naturwiss. Inst., Peterhof.*) *Planta* (Berl.) 457—462 (1930).

Die äußeren Faktoren der photosynthetischen Assimilation des Kohlenstoffs (Temperatur der Umgebung, Qualität und Quantität des Lichtes, CO_2 -Konzentration) werden nicht direkte, sondern als indirekte Faktoren angesprochen, die als Reizerreger wirken. Als wirklich begrenzenden Faktor in den entsprechenden Versuchen von Lundegårdh und Warburg wird die Permeabilität des Plasmas für CO_2 angesprochen. So bekennen sich Verf. zum Gedankengang von Blackman (Gesetz der begrenzenden Faktoren) und erhoffen eine experimentelle Begründung. *Schubert* (Berlin-Südende).

Colla, Silvia: Formazione della clorofilla nelle piante esposte alla luce di Wood (Chlorophyllbildung in Pflanzen bei Woodschem Licht.) (*Istit. di Fisiol., Univ. di Torino.*) *Ann. di Bot.* 18, 329—349 (1930).

Die Verf. untersucht die Chlorophyllbildung unter dem Einflusse der durch Woodsches Filter gehenden Strahlen des ultravioletten Lichtes ($\lambda = 3300$ bis $3900 \text{ m}\mu$) bei im Dunkeln aus Samen gezogenen Keimpflanzen von *Triticum aestivum*, *Phaseolus vulgaris*, *Vicia Faba*, *Vicia Lens*, *Ricinus communis*, *Cardamine hirsuta* und mehreren Verwandten dieser Pflanzen, bei Dunkeltrieben der Kartoffel, bei durch einige Zeit im Dunkeln vorkultivierten Algen vom Chlorellatypus und *Helodeasplassen* und beobachtet die Ergrünung der Zuwächse einiger Graskeimlinge und von Kartoffeltrieben nach Übertragung aus dem Tageslicht in das filtrierte Ultraviolett. Die bei den einzelnen Objekten verschieden ausfallenden Reaktionen werden zunächst nach der Art der Augenscheine beschrieben, ungleichmäßige Ergrünung (Streifen bei den Gräsern, Flecken bei breitblättrigen Pflanzen) mikroskopisch auf die Chloroplastenverteilung geprüft und beim Weizen die Chlorophyllbildung in aufeinander folgenden Tagen in Beziehung auf gleichalte Kontrollen in Tageslicht und schließlich beim gleichen Versuchobjekte die Abhängigkeit der Chlorophyllbildung von der Entfernung der Lichtquelle genauer festgestellt. Daß es sich beim Ergrünen im untersuchten Strahlenbereich tatsächlich um Chlorophyll handelt, wird durch spektroskopische Untersuchung mit Willstätter hergestellter Extrakte aus den Versuchspflanzen und aus Normalpflanzen bewiesen, wobei sich Koinzidenz der Linien A, B und C ergibt. Auch die mikroskopische Untersuchung wird in einigen Fällen durch Benutzung eines Leitzschen Mikrospektroskops nach dieser Richtung ergänzt. Die quantitativen Vergleiche erfolgen colorimetrisch nach Du Roi. Verglichen werden auf das gleiche Volumen gebrachte wässrige Lösungen des Chlorophyllinkalisalzes, hergestellt aus dem Totextrakt ganz reifer Pflanzen. Hierbei ergaben sich deutliche Beziehungen zur Bestrahlungszeit und zur Entfernung von der Lichtquelle und immer eine mit dem Alter zunehmende Verringerung des Chlorophyllgehaltes der Versuchspflanzen gegenüber gleichaltrigen Kontrollen. Bei einigen Pflanzenarten — nicht bei allen — veranlaßt die ultraviolette Bestrahlung Fluoreszenzerscheinungen, deren mögliche Beziehung zur Chlorophyllbildung erörtert wird. Die von der Verf. auf Grund von Wachstum nach Erschöpfung der Samenreserven angenommene Photosynthese im geprüften Strahlenbezirk darf wohl noch weiterer Begründung bedürfen. Beiläufig wird auch über phototropische Erscheinungen im ultravioletten Lichte berichtet. *Sperlich* (Innsbruck).

Tschesnokov, V., und K. Bazyrina: Die Ableitung der Assimilate aus dem Blatt. (*Laborat. f. Pflanzenphysiol., Naturwiss. Inst., Peterhof.*) *Planta* (Berl.) 11, 473—483 (1930).

Bei *Petasites officinalis* findet die Ableitung der Assimilate in der zweiten Hälfte des Tages, bei *Tussilago Farfara* vornehmlich in der ersten Hälfte der Nacht statt. Werden mehrere Blätter einer Tabakpflanze, deren Hälften abgeschnitten waren, einige Tage verdunkelt und in Zeitintervallen von 1—4 Stunden zur Bestimmung des Trockengewichtes geerntet, so erkennt man einen allmählichen Abfall der Intensität der Ableitung der Assimilate. Aus diesen Nacht- und Verdunkelungsversuchen eine „dauer-

mittliche Größe der Ableitung“ als Korrektur der „Blatthälftenmethode“ von Sachs ermitteln zu wollen, ist nicht angängig. Verff. bestimmten die Tageskurven der absoluten Zunahme an Trockensubstanz nach Sachs und der gleichzeitigen Photothese im Luftstrom während 12 bzw. 24 Stunden. Bei den Versuchen mit Kartoffeln verläuft die Bildung von Assimilaten (nach dem Maße der CO_2 -Verarbeitung) ungefähr linear, aber in den frühen Nachmittagsstunden beginnt das durch Ableitung bedingte Defizit. — Bei der Erbse findet sich nur in den Morgenstunden eine Anhäufung von Trockensubstanz. Dem Maximum der Photosynthese entspricht aber auch ein Maximum der Ableitung.

Schubert (Berlin-Südende).^{oo}

Preisig, Friedrich-August: Untersuchungen über den Kohlehydratstoffwechsel des immergrünen Laubblattes im Laufe eines Jahres. *Bot. Archiv* 30, 241—306 (1930).

Diese Untersuchungen bringen ausführlich bereits referierte Ergebnisse (vgl. diese *Arb.* 11, 313). In Ergänzung hierzu sei der Wechsel des osmotischen Druckes im Assimilationsgewebe bei Ilex und Hedera hervorgehoben: mit KNO_3 ergibt sich bei Grenzsmolyse, daß in Wintermonaten die höchsten und während des Wachstums die niedrigsten Werte gefunden werden (Hedera 2,0 und 0,75 Mol, Ilex 2,0 und 1,5 Mol), welche ungefähr der Normalsaugkraft entsprechen. Über das Verhalten der Blätter bezüglich Spaltöffnungsweite, Gewicht, Zucker und Stärke wird für einen Tag jedes Monats der Verlauf gekennzeichnet. Weitere Kurvenbilder veranschaulichen den Jahresverlauf der Ausbeute und Ableitung an Zuckern und Stärke. — Von Pflanzen werden noch Pinus Cembra und einige andere Nadelhölzer untersucht. Bei diesen finden sich viel gleichmäßigere und niedrigere Mengen dieser Stoffe als bei Hedera und Ilex. Beachtenswert erscheint das Auftreten von Stärke bei Pinus während des Winters.

Heinrich Hårdt (Tetschen-Liebwert).

Stoklasa, Julius, J. Cakir und J. Pěnkawa: Die Assimilation des Kohlendioxydes unter dem Einfluß der Radioaktivität im Laufe der vegetativen Entwicklung der chlorophyllhaltigen Zelle. (*Biochem. Abt., Staatl. Radiol. Inst., Prag.*) *Biochem. Z.* 224, 12—134 (1930).

In einer sehr komplizierten Apparatur werden nach der Methode der Durchströmung Assimilations- und Assimilationsintensität des Laubblattes von *Inglans regia* L. (Walnus) bei konstanten Milieubedingungen (Temperatur, Beleuchtung, CO_2 -Gehalt der Luft) unter dem Einfluß der radioaktiven Strahlung des feingemahlten Joachimsthaler Nasturan untersucht. Während die Wirkung der Emanation (α -Strahlen) durch frei unter dem Laubblatt in ca. 1,5 cm Abstand befindliche Nasturanmengen (40—200 g) ausgelöst wurde, wurde beim Studium der Wirkung von γ -Strahlen das Präparat in Glas und der γ -Strahlen allein in Glas und Blei angewandt. Für alle drei Strahlenarten wurde eine Abhängigkeit der Wirkung vom Alter des Blattes beobachtet. Die Emanation wirkt hemmend auf die Assimilation, und zwar in der Jugend des Blattes stärker als im Alter. Umgekehrt wird die Atmungsintensität besonders im Frühsommer gesteigert, um im Verlauf der Vegetationsperiode wieder abzusinken. Bei gleichzeitiger Einwirkung von β - und γ -Strahlen oder alleiniger Einwirkung von γ -Strahlen wird die C-Assimilation gehemmt. Die Höhe der Steigerung verändert sich aber im Laufe des Sommers. Eine Einwirkung der α -Strahlen auf die Atmung war nur bei jungen Blättern in Form einer Herabsetzung zu beobachten.

Schubert (Berlin-Südende).^o

Beljakoff, Eugen: Über den Einfluß der Temperatur auf die Kohlensäureassimilation bei zwei klimatischen Pflanzenrassen. (*Botan. Abt., Zentralanst. f. Landwirtschaftl. Versuchsweisen, Stockholm.*) *Planta* (Berl.) 11, 727—764 (1930).

Als Objekte dienen zwei bezüglich des Anbaugesbietes gut getrennte Gerstensorten. „Gullakorn“, mit einem Anbaugesbiet in subpolaren Gegenden, zeigt eine weitgehende Entwicklung der meisten Pflanzchen unter der Erde, während die andere in Südschweden verteilte Rasse „Gullkorn“ gleich über den Boden herauswächst. Diese Geophilie ist bei der Verteilung hinsichtlich der Keimfähigkeit zu beachten. Auch die morphologischen Merkmale werden hervorgehoben. — Mittels des Glockenapparates von Lundegårdh (1922) wird die Assimilationsfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur bei normalem CO_2 -Gehalt der Luft untersucht. Als Temperaturintervall wurde ein Bereich von +3,5° bis +46° benützt, wobei eine Beleuchtung von 32000 MK und Blätter 1½—2 Wochen alter, bei 16—20° gezüchteter Keimlinge. In den ausführlich wiedergegebenen Tabellen werden neben den CO_2 -Assimilationswerten verschiedene integrierende Momente mit berücksichtigt. Beim Übergehen in niedrige Temperaturen beobachtet man einen Shock, der besonders beim Gullkorn

hervortritt; auch erholt sich dieses oft schwerer oder gar nicht im Gegensatz zum Vegakorn. In der Assimilationsintensität weisen die Blätter öfters individuelle Unterschiede auf, die nicht durch den Hinweis auf äußere Faktoren erklärt werden können. Der Verlauf der Assimilationskurve ist bei beiden Rassen ähnlich und mehrgipfelig, wellenförmig; so treten die Maxima bei 10, 20 und 30° auf. Auch die Minima sind gleichlaufend. Das Temperaturoptimum in bezug auf die Assimilation beider Sorten liegt um 10° auseinander, und zwar bei Gullkorn liegt auffallend hoch bei 30°, bei Vegakorn jedoch wie bei vielen Objekten bei 20°. Bei Gullkorn verläuft die Kurve weit ruhiger als bei Vegakorn, das auf Unterschiede im Assimilationsmechanismus hindeutet. Der Verlauf der Assimilationskurve ist der Lage des Optimums entsprechend, und das von Lundegårdh formulierte Relativitätsgesetz der Assimilation wird auch für den Temperatureinfluß gültig sein: Die Assimilation steigt mit der Temperatur und zwar um so energischer, je mehr die Temperatur im Minimum ist. Die beiden Rassen verhalten sich der Temperatur gegenüber ähnlich wie Schatten- und Sonnenpflanzen zu Licht. Das Vegakorn erscheint in den frühen Wachstumsstadien als eine an das nördliche Verbreitungsgebiet (62. bis 66. Breitengrad) gut angepasste Sorte. Wenn auch die Assimilation bei Gullkorn stärker ist, so liefert jedoch Vegakorn im Ertrag an Stroh und Korn mehr als Gullkorn. Letzteres zeigt sich insofern als klimatisch andere Sorte, als es neben den erwähnten Eigenschaften nicht die volle Ausnützung der Leistungsfähigkeit des Assimilationsapparats aufweist, so daß eine Ausbreitung in Gegenden mit höheren Tagestemperaturen wahrscheinlich wird.

H. Härdtl (Tetschen-Liebwerd).

Reed, Lucille L., Fumiko Yamaguchi, William E. Anderson and Lafayette B. Mendel: Factors influencing the distribution and character of adipose tissue in the rat. (Faktoren, die die Verteilung und den Charakter des Fettgewebes der Ratte beeinflussen. (Laborat. of Physiol. Chem., Yale Univ., New Haven.) J. of biol. Chem. 87, 147—164 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 56, 701.

Betriebsstoffwechsel, Gaswechsel.

Michaelis, L., and K. Salomon: Respiration of mammalian erythrocytes. (Atmung von Säugetiererythrocyten.) (Rockefeller Inst. f. Med. Research, New York.) J. gen. Physiol. 13, 683—693 (1930).

Wie Harrop und Barron vor kurzem gefunden hatten (vgl. diese Ber. 1930, 583) wird die Atmung roter Blutkörperchen von Säugetieren durch Spuren von Methylenblau stark gesteigert. Die Verff. finden, daß ebenso wie Methylenblau wäßrige Extrakte aus tierischen Organen wirken. Rattenorgane waren in folgender Reihenfolge abnehmend stark wirksam: Leber, Niere, Milz, Hoden, Lymphknoten, Hirn, Muskel und Serum waren nicht oder fast nicht wirksam. Während die Methylenblauwirkung bei 23 und 37° praktisch gleich war, war die Wirkung der Organextrakte bei 37° 2—3mal so groß wie bei 23°. Die Methylenblauwirkung steigt bei Belichtung, die Organextraktwirkung ist im Dunkeln und bei Belichtung mit einer 150-Wattlampe aus kurzer Entfernung dieselbe. Hämolytierte Blutkörperchen wurden durch Methylenblau oder Organextrakte nicht beeinflußt. Versuchsobjekt waren Ratten- oder Menschenblutkörperchen. Medium für die Versuche war glykosehaltige Ringerlösung. Glykose war für den Eintritt der Atmungssteigerung notwendig. In Kochsalzlösung oder calciumfreier Ringerlösung oder bei höherer Phosphatkonzentration der Versuchslösung war die Atmungssteigerung geringer als in Ringerlösung. H. A. Krebs (Altona).

Adler, Karl: Der Gewebsstoffwechsel der Uterusschleimhaut in den verschiedenen Stadien ihrer biologischen Funktion. (Univ.-Frauenklin., Münster i. W.) Arch. Gynäk. 141, 306—318 (1930).

Die Untersuchungen von Warburg haben ergeben, daß jedem Gewebe ein ganz besonderer Typus des Stoffwechsels zu eigen ist, d. h. das Verhältnis zwischen Oxydationsstoffwechsel einerseits und Spaltungsstoffwechsel andererseits ist für jede Gewebsart ein ganz bestimmtes und feststehendes. Normales ausgereiftes Gewebe deckt den weitaus größten Teil seines Energiebedarfs durch die Sauerstoffatmung. Unter anaeroben Bedingungen zeigt das ausgereifte Gewebe zwar auch Milchsäuregärung, aber nur in geringem Umfang. Bei der Tumorzelle ist gerade das Umgekehrte der Fall. Die Carcinomzelle bedient sich zur Deckung ihres Energiebedarfs der Gärung.

behält diese auch bei Anwesenheit von Sauerstoff bei. Das embryonale oder wachse Gewebe zeigt in der Anaerobiose eine ebenso starke Gärung wie das Tumorge- webe, unterscheidet sich aber von diesem insofern, als es bei Anwesenheit von Sauer- den größten Teil seines Energiebedarfs durch die Atmung deckt, und von der Gär- nur in geringstem Maße Gebrauch macht. Nach Besprechung der Untersuchungser- gebnisse von Raab, der den Eigenstoffwechsel in der Uterusschleimhaut mit der bür- gerschen Methode untersuchte, werden Technik und Ergebnisse eigener Versuche den Gewebstoffwechsel des Endometriums in den verschiedenen Stadien seiner funk- tionen bekannten gegeben. Adler glaubt, daß er auf Grund seiner Ver- sergebnisse die Uterusschleimhaut nach ihrem Stoffwechseltypus zum embryo- oder wachsenden Gewebe rechnen dürfe. Das ginge vor allem aus der hohen Glykolyse während der Anaerobiose hervor. Die funktionierende Uterusschleimhaut zeigt keinen Unterschied zwischen Proliferations- und Sekretionsphase. Bei Frauen Menstruationsbesonderheiten soll der herabgesetzte Stoffwechsel der Schleimhaut der Menge des produzierten Ovarialhormons abhängig sein. Im Klimakterium tritt zuweilen eine Steigerung der Stoffwechselvorgänge statt, später sinkt der Stoffwechsel allmählich ab, die Atmung früher als die anaerobe Glykolyse. Bei einem Versuch von Frühschwangerschaft war der Stoffwechsel der Decidua ebenfalls herabgesetzt. (Raab, vgl. diese Ber. 14, 643.)

K. Heim (Leipzig).

Richardson, Henry B., Ephraim Shorr and Robert O. Loebel: Tissue metabolism. The respiratory quotient of normal and diabetic tissue. (Gewebsstoffwechsel. II. Der respiratorische Quotient von normalem und diabetischem Gewebe.) (Russell Sage Inst. Contrib. a. II. Med. [Cornell] Div. a. Dep. of Path., Bellevue Hosp., New York.) J. of Biol. Chem. 86, 551—569 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 86.

Harrison, Sylva Thurlow, and Edward Mellanby: The inhibition of lactic acid formation in cancer and muscle. (Die Hemmung der Milchsäurebildung im Carcinom und im Muskel.) (Dep. of Pharmacol., Univ. Sheffield.) Biochemic. J. 24, 141—157 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 55, 738.

Holtermann, C.: Experimentelle Untersuchungen über Gewebstoffwechselprozesse (Mbl.-Reduktion) bei nichtgraviden, graviden und fetalen Tieren. (Zugleich ein Beitrag zur Beeinflussung der tierischen Gewebstoffwechselprozesse durch Ovarial- und Hypophysenvorderlappenhormonpräparate.) (Univ.-Frauenklinik., Köln u. Pharmakol. Inst., Münster i. W.) Arch. Gynäk. 141, 319—361 (1930).

Zur Untersuchung der Fragen, wie sich die Gewebstoffwechselprozesse von Organen gravider, gravider und fetaler Tiere unter normalen und besonderen Bedingungen zu- verhalten, ob sie gleichen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, ob sie mit einer bestimmten Methode charakteristische Abweichungen voneinander zeigen, und welchen Einfluß Ovarialhormon- und Hypophysenvorderlappenhormonpräparate auf die Stoffwechselprozesse gravider, gravider und fetaler Tiere ausüben, arbeitete Verf. mit der Thunbergschen Methyleneblau- (Mbl.-) Methode in der von Ahlgren angegebenen Modifikation an den ver- schiedenen Laboratoriumsnagern. Es ergab sich, daß die Mbl.-Reduktion derselben Organe (Lunge, Leber, Niere, Herz) verschiedener, nichtgravider Tiere gleicher Art (Kaninchen, Schweinechen) selbst unter gleichen Versuchsbedingungen größte Unterschiede aufwiesen. Nichtgravide Tiere vom gleichen Wurf weisen im allgemeinen unter gleichen Versuchs- bedingungen gleiche Mbl.-Reduktionskraft ihrer Organe auf. Die Organe gravider und fetaler Tiere brauchen zur Entfärbung derselben Menge Mbl. mehr Zeit als die Organe nichtgravider Tiere; das gilt in besonders hohem Grade für die Muskeln. Das Mbl.-Entfärbungsvermögen der fetalen Organe ist kleiner als das der entsprechenden mütterlichen Organe. Placentares Gewebe besitzt eine sehr geringe Mbl.-Reduktionskraft. Sarkomratten zeigten gegenüber Normaltieren keine Veränderung. An den Geweben nichtgravider Tiere zeigt sich bei einer hohen Konzentration von Glycerinphosphorsäure und Bernsteinsäure im allgemeinen eine von der Zusat- zenskonzentration abhängige Beschleunigung des Mbl.-Entfärbungsvorgangs. Bei sehr niedriger Konzentration findet sich aber eine Hemmung der Mbl.-Entfärbung, die bei Organen nichtgravider Tiere nicht gefunden wird. Verf. schließt daraus, daß in den Geweben gravider Tiere

eine Fermentverschiebung oder eine Änderung der Donatorkonzentration eintritt; er die letzte Möglichkeit für die wahrscheinlichere. Die Ovarialhormonpräparate Progynon Hogival verlängern in hohen Konzentrationen die Mbl.-Entfärbungszeit, während das P (Hypophysenvorderlappenhormon) sie abkürzt. Voss (Mannheim)

Gesamtstoffwechsel, Wachstum.

Heath, Harry C.: Potash shale as a source of potassium for growing plants. (J haltiges Schiefergestein als Kaliumquelle für das Pflanzenwachstum.) (*Hull Bot. Laborat., Univ. of Chicago, Chicago.*) Bot. Gaz. **90**, 121—150 (1930).

Das Bestreben Nordamerikas, sich bezüglich der Kalidünger vom europäischen Markte möglichst unabhängig zu machen, ist bekannt. Ihm dient die Prüfung marfaltiger kalihaltiger Gesteine im Rohzustande und nach verschiedenen Aufschmethoden auf Eignung als Kaliquelle für die Kulturpflanzen. Verf. befaßt sich einem bestimmten Schiefer (Cartersville shale), den er in Pulverform roh, nach Röst bei Rotglut durch 30 und 45 Minuten, nach Röstung mit CaCO_3 und CaSO_4 , Röstung unter Druck und nach $\frac{1}{2}$ stündiger Behandlung mit konzentrierter erwär H_2SO_4 in seiner Wirkung auf 4 verschiedenen Böden (2 Torf-, 2 Sandböden) d Kulturversuche mit verschiedenen Gewächsen (Getreide, Tomaten, Hülsenfrüch Klee) untersucht. Die Kontrollen wachsen teils in reinem Quarzsand, teils bei Zu löslicher Kalisalze. Geprüft wird nach wechselnden Zeiten Frisch- und Trockengewi Analysen geben die Menge des jeweilig aufgenommenen Kaliums an. Der Kalkein wird durch Überkalkung von Kulturen zu fassen gesucht. Auf Grund der man faltigen Ergebnisse, die im einzelnen hier nicht wiedergegeben werden können, kon Verf. zum Schlusse, daß der in Frage kommende Schiefer im rohen Zustande Pflanzen, die in kaliarmen Böden, besonders Torfböden wachsen, einen beacht werten Gewinn schafft und daß das Röstprodukt bei Kalk- oder Gipszusatz als w voller Dünger (etwa 2 tons für 1 acre), für Torfböden und Rotklee insbesondere, ge kann. Dies werden Freifeldversuche noch besser zu beweisen haben. Sperlich

Darrow, George M.: Experimental studies on the growth and development of strawberry plants. (Experimentelle Untersuchungen über Wachstum und Entwickl von Erdbeerpflanzen.) (*Office of Horticult. Crops a. Dis., Bureau of Plant Indust U. S. Dep. of Agricult., Washington.*) J. agricult. Res. **41**, 307—325 (1930).

In zahlreichen Kurven ist die Abhängigkeit der Erdbeerpflanzen von den Umw faktoren nachgewiesen. Wachstum und Entwicklung sind von den klimatischen edaphischen Faktoren beeinflusst. Als Index des Wachstums ist die Blattprodukt genommen. Werden an der Mutterpflanze die Ausläufer entfernt, so wächst sie üp weiter; bleiben aber die Ausläufer erhalten, so geht das Wachstum der Mutterpfla zurück. W. Riede (Bonn)

Fischer, Hugo: Beiträge zur Frage der Kohlenstoff-Ernährung der Kulturpflanzen. Angew. Bot. **12**, 418—423 (1930).

Die obige Abhandlung, die auf der Tagung der Vereinigung für angewandte Botan in Erfurt im Juni 1930 vorgetragen wurde, befaßt sich mit dem vielumstrittenen Probl der CO_2 -Düngung der grünen Pflanzen. Durch die Zersetzung von frischem Stroh Boden soll die CO_2 -Produktion desselben in einer Weise gefördert werden könn daß eine besondere, ertragsteigernde CO_2 -Wirkung die Folge sei. Irgendwelche F schritte auf diesem Gebiet sind durch die Untersuchungen Verf.s jedoch nicht erre worden. Es kann die schon seit längerer Zeit bekannte Tatsache bestätigt werd daß man die „schädlichen“ Eigenschaften frischen Strohs, die auf einer „Festlegu des Bodenstickstoffes durch die Bodenmikroben zurückzuführen sind, durch eine Beidüngung von bestimmter Höhe beseitigen kann. Verf. setzt sich trotzdem na drücklichst für den Gedanken der CO_2 -Düngung ein, indem er der Auffassung ist, d die Strohdüngung und Zersetzung in erster Linie dazu berufen sei, die grünen Pflanz mit den zum Wachstum erforderlichen CO_2 -Mengen zu versorgen. Engel (Berlin-Dahle)

Barrenscheen, H. K., und Johannes Pany: Über die Rolle der Phosphorylierung intermediären Kohlehydratstoffwechsel der Pflanze. II. (*Inst. f. Angew. Med.*, Univ. Wien.) *Biochem. Z.* **219**, 364—380 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 570.

Thornton, Norwood C.: Carbon dioxide storage of fruits, vegetables, and flowers. Lagerung der Früchte, des Gemüses und der Blumen in Räumen, denen Kohlendioxyd zugefügt ist.) (*Boyce Thompson Inst. f. Plant Research, Yonkers, N. Y.*) *Ind. Chem.* **186—1189** (1930).

Über die günstigste Lagerung von Früchten, Gemüse und Blumen ist aus praktischen Rücksichten schon vieles geschrieben worden. Fügt man in den Räumen, die zitierten Produkte enthalten, CO_2 hinzu, so bleiben dieselben bedeutend länger. Eine Temperatur von $8,1^\circ$ ist günstig. Geprüft wurden Äpfel, Birnen, Bananen, Zitronen. Von Gemüsen wurden Sellerieknollen studiert. Blumen wurden Violett und Rosen untersucht.

Niethammer (Prag).

MacDowell, E. C., W. H. Gates and C. G. MacDowell: The influence of the quantity of nutrition upon the growth of the suckling mouse. (Der Einfluß der Nahrungsmenge auf die Größe der noch saugenden Maus.) (*Dep. of Genetics, Carnegie Inst. of Washington, Cold Spring Harbor.*) *J. gen. Physiol.* **13**, 529—545 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 578.

Mendel, Lafayette B., and Hubert Bradford Vickery: Effect of continued administration of iodide on the growth of the albino rat. (Wirkung fortgesetzter Jodanwendung auf das Wachstum der Albinoratte.) (*Biochem. Laborat., Connecticut Agric. Exp. Stat. Depart. of Physiol. Chem., Yale Univ., New Haven.*) *Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.* **27**, 809 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 411.

Terroine, Emile F., et Thérèse Reichert: De l'action des sels sur le métabolisme. Influence des substances minérales sur la grandeur de la rétention azotée pendant la croissance. (Die Wirkung von Salzen auf den Stickstoffwechsel. Der Einfluß von Mineralsalzen auf die Größe der Stickstoffbilanz während des Wachstums.) (*Inst. de Physiol. Gén., Univ., Strasbourg.*) *Arch. internat. Physiol.* **32**, 374—390 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 419.

Terroine, Emile F., et Thérèse Reichert: De l'action des sels sur le métabolisme. Influence des substances minérales sur la grandeur du métabolisme azoté endogène. (Die Wirkung von Salzen auf den Stickstoffwechsel. Einfluß von Mineralstoffen auf die Größe des endogenen Stickstoffwechsels.) (*Inst. de Physiol. Gén., Univ., Strasbourg.*) *Arch. internat. Physiol.* **32**, 337—373 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 419.

Condotti, Pietro: Gli effetti di una dieta iperproteinica ed iperpurinica (dieta proteica) nel ratto. Reperti morfologici e reattività infiammatoria. (Die Wirkungen einer reich an Eiweiß und Purinkörpern überreichen Ernährung [Thymusfutter] bei Ratten.) (*Atti di Pat. Gen., Univ., Milano.*) *Arch. Ist. biochim. ital.* **2**, 243—268 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 411.

Schabderhalden, Emil, und Severian Buadze: Weiterer Beitrag zum Problem der Entstehung des Kreatins bzw. Kreatinins im tierischen Organismus. (*Physiol. Inst., Halle a. S.*) *Hoppe-Seylers Z.* **189**, 65—79 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **56**, 701.

Hormonlehre.

Handbuch der normalen und pathologischen Physiologie mit Berücksichtigung der experimentellen Pharmakologie. Hrsg. v. A. Bethe, G. v. Bergmann, G. Embden, E. Ellinger. Bd. 16, 1. Hälfte. Korrelationen II/1. (J. VIII—XII und J. XIV. Physiologie und Pathologie der Hormonorgane. Regulation von Wachstum und Entwicklung. Verdauung als Ganzes. Die Ernährung des Menschen als Ganzes. Die korrelativen

Funktionen des autonomen Nervensystems. Regulierung der Wasserstoffionenkonzentration.) Berlin: Julius Springer 1930. XIII, 1159 S. u. 245 Abb. RM. 121.—.

Wiesel, Josef: Thymus. S. 366—400 u. 2 Abb.

Die Bearbeitung wurde nach dem Tode Wiesels von Joh. Kretz vollendet. Sie umfaßt folgende Abschnitte: Entwicklung und Bau. — Die Altersinvolution des Thymus. — Die akzidentelle Involution. — Regeneration des Thymus. — Physiologie des Thymus. — Die Folgen der Thymusexstirpation. — Störungen der Motilität des Thymus. — Nervöse und psychische Störungen nach Thymusausschaltung. — Veränderungen einzelner Organe nach Thymusausschaltung. Stoffwechsel thymusloser Tiere. Beeinflussung des Thymus durch Ausschaltung anderer Organe. — Experimentelle Hyperthymisation. — Die Beziehungen des Thymus zur Hämatopoese und zum Stoffwechsel. — Der Thymus als lymphoexzitatorisches Organ. — Die Thymushyperplasie. — Mors thymica und Status thymicus (Status thymicolymphaticus). — Wie schon die Überschriften zeigen, gibt die Bearbeitung einen guten Überblick über das Wesen des Thymus, was von der normalen und pathologischen Physiologie der Thymus bekannt ist, während die grundlegenden Untersuchungen Hammars gebührende Berücksichtigung finden. Wenn es auch selbstverständlich ist, daß in einem Handbuche der Physiologie die Funktion eines Organes der breiteste Raum gewidmet sein muß, so scheint nach der Ansicht des Ref. die Morphologie doch etwas zu stiefmütterlich behandelt. Aus der nur 2 Seiten umfassenden Beschreibung des normalen Baues der Thymus wird ein mit dem Gegenstand nicht näher vertrauter Leser kaum ein richtiges Bild machen können; um so weniger, als nicht eine Abbildung von der Thymus gegeben wird. Mangel an Abbildungen macht sich auch in anderen Abschnitten fühlbar. In der ganzen Bearbeitung werden nur 2 Bilder und zwar von thymektomierten Hunden gebraucht. Bei der Besprechung der Altersinvolution ist von Rindenfollikeln und Randfollikeln der Thymus die Rede, Ausdrücke, die zu Mißverständnissen führen können, da bekanntlich in den Läppchen der Thymus nur eine Rinden- und Marksubstanz, keine Follikel vorkommen. — Bei dieser Gelegenheit möchte Ref. darauf hinweisen, daß die richtige Schreibweise Hassall ist und nicht, wie man häufig zu lesen bekommt, Hassal oder Hasall. Auch in der vorliegenden Abhandlung steht neben Hassall wiederholt Hasall.

v. Schumacher (Innsbruck)

Steppuhn, O., und A. Smirnowa: Über die Beeinflussung des Eiweißumsatzes einzelner Organgewebe durch Schilddrüsenstoffe. (Abt. f. Exp. Path. u. Pharmacol. Staatl. Chemo-Pharmazeut. Forsch.-Inst., Moskau.) Biochem. Z. 224, 83—90 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 784.

Asher, Leon: Beiträge zur Physiologie der Drüsen. CXIX. Landolt, Hermann: Die Einwirkung von Thyroxin auf das Zentralnervensystem bzw. Atemzentrum bei Kaninchen. (Physiol. Inst. [Hallerianum], Univ. Bern.) Z. Biol. 90, 327—333 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 786.

Asher, Leon: Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Mitt. CXX. Ratti, Piero: Die wachstumsregulierende Funktion der Thymusdrüse. (Physiol. Inst. [Hallerianum], Univ. Bern.) Biochem. Z. 223, 100—119 (1930).

In dieser Arbeit wird das Problem der Beziehung zwischen Thymus und Entwicklung des jugendlichen Tieres mit Hilfe eines neuen methodischen Weges bearbeitet, da zahlreiche frühere Arbeiten, namentlich diejenigen, die sich entweder der Exstirpation der Thymus oder der bloßen Verfütterung bedient hatten, zu widersprechenden Ergebnissen oder Deutungen führten. In Vorversuchen wurden nochmals Fütterungsversuche angewandt, die zu einer großen Steigerung des Wachstums jugendlicher Ratten innerhalb der normalen Grenzen führten. Die Wachstumsförderung blieb auch noch erhalten, wenn die Tiere dauernd in einem dunklen Raume lebten. Der Aufenthalt im Dunkeln wurde benutzt, um ungünstige Verhältnisse für das Wachstum zu schaffen. Die Herstellung weiterer ungünstiger Wachstumsbedingungen war der wesentliche Punkt des neuen Verfahrens und dazu die Implantation von Thymusgeweben oder die Injektion

on Thymusextrakten. Die in dieser Arbeit gewählte ungünstige Wachstumsbedingung stand in der Ernährung mit MacCallums rachitiserzeugender Nahrung. Im Gegensatz zu den Kontrolltieren schützte die Implantation von Thymusextrakt und Thymus-
 terung Ratten vollständig gegen die Rachitiserzeugung, trotzdem die Tiere außer-
 m sich im Dunkeln befanden. Allerdings ist diese Wirkung der Thymus keine
 pezifische, indem der gleiche vollständige Schutz gegen Rachitiserzeugung sich durch
 erdings reichliche Fleischernährung erzielen ließ. Die Überlegenheit aber der Thymus-
 fuhr zeigte sich darin, daß das Wachstum der geschützten Tiere ein viel stärkeres
 ur. Auch gegenüber anderen Bedingungen der Unterernährung und der schlechten
 igenischen Verhältnisse bewährte sich die Hyperthymisierung. Die Erfolge der
 yperthymisierung sprechen zugunsten der Auffassung, daß die Thymus einen wach-
 mregulierenden Einfluß besitzt und in diesem Sinne könnte die Thymus zu den
 ersekretorischen Organen vom Standpunkt der allgemeinen Physiologie der inneren
 kretion gerechnet werden. (CXVIII. vgl. diese Ber. **13**, 649.) Leon Asher (Bern).^{oo}

Mason, James B., J. Markowitz and Frank C. Mann: A plethysmographic study
 the thyroid gland of the dog. (Plethysmographische Untersuchungen an der Schild-
 üse des Hundes.) (*Div. of Exp. Surg. a. Path., Mayo Found., Rochester.*) Amer. J.
 ysiol. **94**, 125—134 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 454. oo

Irsigler, Franz Hannes: Die Wirkung intraperitonealer und peroraler Jodkali-
 ben auf die Rattenschilddrüse. Beitr. path. Anat. **85**, 221—240 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 456. oo

Harington, Charles Robert, and William Thomas Salter: The isolation of l-thyroxine
 m the thyroid gland by the action of proteolytic enzymes. (Die Isolierung von
 thyroxin aus der Schilddrüse durch die Wirkung proteolytischer Enzyme.) (*Dep. of*
th. Chem., Univ. Coll. Hosp. Med. School, London.) Biochemic. J. **24**, 456—471
 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 459. oo

Abderhalden, Emil, und Ernst Wertheimer: Weitere Studien über die Wirkung des
 yroxins. (*Physiol. Inst., Univ. Halle a. S.*) Z. exper. Med. **72**, 472—489 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 459. oo

Inaba, Michiaki: Studien über das Epithelkörperchenhormon und den Kalkstoff-
 chsel. (*Biochem. Laborat., Kenritsu-Hosp., Kobe.*) J. of Biochem. **12**, 35—58 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 454. oo

Santenoise, D.: Sécrétion par le paneréas d'une hormone vagotonisante (vagotonine)
 éférente de l'insuline. (Die Sekretion eines vom Insulin verschiedenen Pankreashor-
 ns [Vagotonin], das den Vagustonius erhöht.) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 765 bis
 77 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 464. o

Corkill, Basil: The influence of insulin on the distribution of glycogen in normal
 mals. (Einfluß des Insulin auf die Verteilung des Glykogens bei normalen
 ren.) (*Nat. Inst. f. Med. Research, Hampstead, London.*) Biochemic. J. **24**, 779
 794 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 580. o

Hartman, Frank A., and Katherine A. Brownell: The hormone of the adrenal
 tex. (Das Hormon der Nebennierenrinde.) (*Dep. of Physiol., Univ., Buffalo.*)
 oc. Soc. exper. Biol. a. Med. **27**, 938—939 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 787. oo

Harada, T.: Die histologischen Veränderungen der Nebennierenrinde nach wieder-
 ter Injektion von Insulin an Kaninchen. (*Bakteriol. Inst., Univ. Fukuoka.*) Fukuoka-
 vadaigaku-Zasshi **23**, dtsch. Zusammenfassung 3 (1930) [Japanisch].

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 462. o

Blanchetière, A., Léon Binet et A. Arnaudet: Le glutathion du tissu surrénal au cours de la gravidité. (Das Glutathion des Nebennierengewebes im Verlauf d. Schwangerschaft.) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 163—164 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 461.

Houssay, B.-A., et A. Biasotti: Hypophysectomie et diabète pancréatique chez crapaud. (Hypophysektomie und Pankreasdiabetes bei der Kröte.) (*Inst. de Physiol. Fac. de Méd., Buenos Aires.*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 407—410 (1930).

Die Exstirpation des Pankreas führt auch bei der Kröte (*Bufo arenarum*) zu einem echten Diabetes. Vorherige Entfernung der ganzen Hypophyse oder des dem Vorderlappen der höheren Tiere entsprechenden glandulären Anteils oder eine Kauterisation des Infundibulums verhindert oder hemmt die Entwicklung des Diabetes. Durch Implantation des glandulären Anteils, in geringerem Maße auch der ganzen Drüse, läßt er sich wieder zum Vorschein bringen. Ähnliche Ergebnisse ließen sich auch bei Hunden erzielen. Demnach spielt die Hypophyse eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Pankreasdiabetes. *F. Laquer.*

Lipschütz, Alexandre: Loi de la constance folliculaire, loi de la puberté et loi antérieure de l'hypophyse. (Das Gesetz der Konstanz der Follikelzahl, das Gesetz d. Pubertät und der Vorderlappen der Hypophyse.) (*Inst. de Physiol., Univ., Concepción [Chile].*) Rev. franç. Endocrin. **8**, 97—114 (1930).

Die verschiedenen Tatschengruppen, die für das Gesetz der Konstanz der Follikelzahl und für das Gesetz der Pubertät sprechen, werden zusammengestellt, und es wird gezeigt, daß diese Erscheinungen nichts anderes sind als der quantitative Ausdruck der Tatsache, daß die Follikelentwicklung und die Spermatogenese unter dem Einfluß der im Körper kreisenden „X-Substanzen“ stehen, die für beide Geschlechter gleich sein müssen. Die endokrine und die generative Funktion des Ovars und des Hodens wird durch diese extragonadalen Substanzen geregelt, die aber erst im Augenblick der Pubertät für die Geschlechtsdrüsen verfügbar werden. Durch Gegenüberstellung der neuen Forschungsergebnisse über die Hormone des Hypophysenvorderlappens wird es bis zu einem hohen Grade wahrscheinlich gemacht, daß die „X-Substanzen“ und die aus dem Vorderlappen stammenden, gonadenwirksamen Stoffe identisch sind. Es gibt aber noch einige Tatsachen, die sich nicht mit dieser Annahme decken (Unwirksamkeit der infantilen und der senilen Hypophyse in situ und ihre Wirksamkeit in ihrer Einverleibung in einen anderen Organismus). *Voss (Mannheim).*

Botchkareff, P. V., and A. P. Preobrajensky: Does the Zondek pituitary hormone influence the growth of the body? (Beeinflußt das Zondeksche Hypophysenvorderlappenhormon das Größenwachstum?) (*State Inst. of Exp. Endocrinol., Moscow.*) Endocrinology **14**, 164—168 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 485.

Teel, Harold M., and Harvey Cushing: Studies in the physiological properties of the growth-promoting extracts of the anterior hypophysis. (Untersuchungen über die physiologischen Eigenschaften von wachstumsfördernden Extrakten des Hypophysenvorderlappens.) (*Laborat. of Surg. Research, Harvard Med. School, Boston.*) Endocrinology **14**, 157—163 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 485.

Montpellier, J., et L. Chiapponi: Action de la folliculine sur le lobe antérieur de l'hypophyse. (Die Wirkung des Follikulins auf den Hypophysenvorderlappen.) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 373—375 (1930).

Erwachsene normale und seit 5 Monaten kastrierte Rattenmännchen und -weibchen wurden mit weiblichem Sexualhormon behandelt (insgesamt 180 Ratten-Einheiten, 5 R. täglich) und ihre Hypophysen mit denen unbehandelter normaler und kastrierter Tiere verglichen. In Bestätigung früherer Untersucher konnte festgestellt werden, daß durch diese Injektionen der Kastratentypus der Hypophyse sowohl bei Weibchen wie auch bei Männchen in den Normaltypus rückverwandelt werden kann. Auf die Hypophyse des nichtkastrierten Weibchens hatten die Injektionen keinerlei Einfluß. *Voss (Mannheim).*

Martins, Thales: Echanges hormoniques chez les animaux en parabiose: Hormones du lobe antérieur de l'hypophyse et du testicule. (Hormonaler Austausch zwischen Parabionten. Die Hormone des Hypophysenvorderlappens und des Hodens.) (*Laborat. de Physiol., Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1341—1343 (1930).

Parabioseversuche zwischen erwachsenen normalen und kastrierten Männchen (an Ratten und an Mäusen). In Bestätigung früherer Erfahrungen konnte nur eine Beeinflussung der

normalen Partners durch die Hypophysenvorderlappenhormone des Kastraten, nie aber ein Übergang der Hodenhormone des Normaltieres in den kastrierten Partner festgestellt werden. Vielleicht muß man annehmen, daß die Hodenhormone zwar übergehen, aber daß im Kastraten die minimale wirksame Konzentration erreicht wird. Voss (Mannheim).^{oo}

Butenandt, Adolf, und Erika von Ziegner: Über die physiologische Wirksamkeit des krystallisierten weiblichen Sexualhormons im Allen-Doisy-Test. Untersuchungen über das weibliche Sexualhormon. (III. Mitt.) (*Organ.-Chem. u. Biochem. Abt., Allg. chem. Univ.-Laborat., Göttingen.*) Hoppe-Seylers Z. 188, 1—10 (1930).

Die Verf. haben im Gegensatz zu der Verteilung des zu untersuchenden Materials mehrere Einzeldosen die Prüfung des ihnen vorliegenden reinen krystallisierten Präparates in einmaliger subcutaner Einspritzung in Lösung in Sesamöl angestellt. Als Testtiere wurden ca. 20 g schwere weiße Mäuse verwendet, bei denen 3—4 Wochen nach der Kastration 2 Probeeinspritzungen mit standardisiertem Material mit 14 Tagen Zwischenraum gemacht wurden. Gut reagierende Tiere wurden dann etwa 6 Wochen nach der Kastration zu den Auswertungen benutzt. Um den Einfluß der Kastrationsdauer auszuschließen, erhalten die Tiere alle 14 Tage eine wirksame Injektion. Die prüfende Substanz wird in alkoholischer Lösung dem Sesamöl einverleibt, von dem dann 0,1—0,2 ccm eingespritzt werden. Zu jeder Auswertung werden mindestens meist 12 Tiere verwendet. Zur physiologischen Untersuchung wurden nur reinste Präparate benutzt, teilweise nach unmittelbar vorausgegangener nochmaliger Sublimierung der Krystalle nach häufigem Umkrystallisieren aus Essigester; es waren dann farblose Blättchen von konstantem Schmelzpunkt bei 243—245°. Bei Auswertung in einmaliger Injektion ergab sich aus dem Eintritt der Vollbrunst bei mindestens der Hälfte der Testtiere ein Wert von 8—9 Millionen M.E. pro Gramm! in dieser, von 10 Millionen in einer anderen Versuchsreihe. Zur Kontrolle wurden aber auch Versuche mit verteilten Dosen angestellt; dabei ergaben sich noch weit höhere Werte: so genügten bei Verteilung von 2—3 Injektionen auf 12—14 Stunden 0,000067 mg, oder bei 75% der Versuchstiere Vollbrunst zu erregen, d. h. Wirkungswert 15 Millionen; bei 6 Injektionen, auf 48 Stunden verteilt, genügte schon das Gesamtquantum von 0,000025 g, um bei 63% der Tiere Vollbrunst, also 40 Millionen M.E. pro Gramm, zu erzielen. Die Verf. glauben aus dieser enormen physiologischen Aktivität den Schluß ziehen zu dürfen, daß tatsächlich das reine weibliche Sexualhormon erreicht ist. (Vgl. diese Ber. 15, 462.) Flesch (Hochwaldhausen).^{oo}

Veler, Clement D., Sidney Thayer and Edward A. Doisy: The preparation of the crystalline follicular ovarian hormone: Theelin. (Die Darstellung des krystallinischen Ovarialfollikelhormons Theelin.) (*Laborat. of Biol. Chem., St. Louis Univ. School of Med., St. Louis.*) J. of biol. Chem. 87, 357—371 (1930).
Vgl. Ber. Physiol. 57, 482.

Thayer, Sidney A., Clement D. Veler and Edward A. Doisy: Some chemical and physical properties of the crystalline follicular ovarian hormone: Theelin. (Einige chemische und physikalische Eigenschaften des krystallinischen Ovarial-Follikelhormons: Theelin.) (*Laborat. of Biol. Chem., St. Louis Univ. School of Med., Washington.*) Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 27, 735—736 (1930).
Vgl. Ber. Physiol. 57, 482.

Kochmann, M.: Zur Methodik der Auswertung des weiblichen Sexualhormons. Mitt.: Allgemeine Methodik und Berechnung der Ergebnisse. (*Pharmakol. Inst., Univ. Halle a. S.*) Naunyn-Schmiedebergs Arch. 152, 47—51 (1930).
Vgl. Ber. Physiol. 57, 484.

Kochmann, M.: Zur Methodik der Auswertung des weiblichen Sexualhormons. Mitt.: Unterschied der Ratten- und Mäuseeinheit bei wasser- und ölgelöstem Hormon und über seine Wirkungsweise. (*Pharmakol. Inst., Univ. Halle a. S.*) Naunyn-Schmiedebergs Arch. 152, 52—56 (1930).
Vgl. Ber. Physiol. 57, 484.

Del Castillo, Enrique B., und Carlos J. Calatroni: Periodischer Sexualeyclus und Follikulin. (*Inst. de Fisiol., Fac. de Cienc. Méd., Buenos Aires.*) *Rev. Soc. argent. Biol.* **6**, 108—133 (1930) [Spanisch].

Verff. haben das aus dem Urin schwangerer Frauen gewonnene Sexualhormon („Follikulin“) bei 16 normalen und 9 kastrierten Ratten in täglichen Dosen von 0,1 bis 2,0 E. über längere Zeit injiziert und kommen zu folgenden Ergebnissen: Dem Eintritt der Brunst nach den Follikulininjektionen geht eine Latenzperiode voraus, die bei höheren Dosen kürzer ist als bei niedrigen, desgleichen bei normalen Tieren kürzer als bei kastrierten. Auch bei täglichen kleinen Dosen (von 0,1 E.) summiert oder kumuliert sich die Wirkung, so daß nach einiger Zeit eine langdauernde Brunst eintritt. Hohe Dosen verursachen eine verlängerte Brunst, bei niederen Dosen sind Ruhepausen dazwischen geschaltet. Auch bei verlängerter Brunst zeigt der Cyclus die 4 Stadien (Proestrus, Oestrus, Metoestrus, Dioestrus). Nach Absetzung des Follikulins hat die Brunst einige Tage an (Nachwirkung). Nach einigen Monaten werden die Ruhepausen regelmäßiger, vollständiger und länger; anscheinend tritt eine Ermüdung oder Gewöhnung ein. Auch bei kastrierten Ratten treten nach täglicher Injektion von kleinen Follikulinmengen (0,1—0,2 E.) regelmäßige Cyclen von Aktivität und Ruhe auf. In den Ovarien langbehandelter Tiere sind reife Follikel und frische Corpora lutea nicht nachweisbar. Für den Eintritt der Brunst sind Corpus luteum oder Follikel also nicht erforderlich. Die Vagina hat einen eigenen Cyclus, der vom Ovarialgewebe unabhängig ist. Die Follikulinwirkung ist aber notwendig, damit die vaginale Aktivität ihr Maximum erreicht.

Brünner (Frankfurt a. M.-Höchst).

Winter, Egon Werner: Beitrag zur inneren Sekretion des Corpus luteum. (*Pharmakol. Inst., Univ. Berlin.*) *Arch. Gynäk.* **141**, 548—556 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 646.

Nelson, W. O., and J. J. Pfiffner: Experimental production of deciduomata in the rat by an extract of the corpus luteum. (Die experimentelle Erzeugung von Deciduen bei der Ratte durch einen Corpus luteum-Extrakt.) (*Biol. Laborat., Cornell Spring Harbor.*) *Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.* **27**, 863—866 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 646.

Siecke, Harald: Ergebnisse von Mengenbestimmungen des Sexualhormons II. Mitt.: Sexualhormon im Harn bei regelmäßigem mensuellen Zyklus. (*Univ.-Frauenklinik., Kiel.*) *Zbl. Gynäk.* **1930**, 1601—1618.

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 483.

Lanz, T. von: Ein neuer Weg zum Nachweis des Hodenhormones. *Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Münch.* **39**, 62—78 (1930).

Bei der Untersuchung normaler Rattenmännchen, kastrierter Rattenmännchen und schließlich kastrierter Rattenmännchen, die aber unter dem hormonalen Einfluß von Hoden transplantierten oder eines mit dem Kastraten parabiotisch vereinigten normalen Rattenmännchens stehen, kommt Verf. zum Schluß, daß die Größe und der Gewebeaufbau der Ausführungsgänge des männlichen Genitaltrakts nicht in erster Linie vom Hodenhormon, sondern von der Spermatogenese abhängig sind: „Sind Samenfäden vorhanden, die bedient werden müssen, so sind die Organe groß und speichern; arbeiten sie nur unter Hormoneinfluß, so schrumpfen sie zusammen.“ Es wurden ferner Untersuchungen über die reelle Acidität in Samenblase und Nebenhodenschweif bei den gleichen drei Tiergruppen angestellt (über die Meßtechnik des p_H vgl. diese *Ber.* **13**, 485). In beiden Organen ist der p_H spezifisch verschieden vom Blutwert des p_H , nach der Kastration kommt es zu einer Entdifferenzierung und die Werte werden identisch mit dem Blutwert. Durch intraperitoneale Hodenimplantationen und durch Parabiose mit einem normalen Männchen konnten auch hier die spezifischen Zelleistungen wieder hergestellt werden. Verf. hat auch Untersuchungen über die intracellulären Sekretionsvorgänge in den Zellen der Samenblase, der Prostata und des Nebenhodenganges angestellt und ihre Abhängigkeit von der Gegenwart des Hodens festgestellt. Bei einem Vergleich der Eignung von Samenblase, Prostata und Nebenhoden als Objekt der p_H -Messungen zum Zweck des Nachweises von Hodenhormon erscheint die Samenblase altkastrierter Tiere als Testorgan der Wahl; aber auch für sie muß die Technik der p_H -Bestimmung noch weiter vervollkommen werden.

Voss (Mannheim).

Loewe, S., H. E. Voss, F. Rothschild und E. Borchardt: Über den Nachweis männlichen Sexualhormons (Androkinins) im Harne. VI. Mitteilung über Androkinine. Mitteilungen zu der Arbeit von Glimm und F. Wade in dieser Zeitschrift 219, 155, 190. (Haupt-Laborat., Städt. Krankenanst., Mannheim.) Biochem. Z. 221, 461 bis 466 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 648.

oo

Bewegungs- und Reizerscheinungen der Pflanzen.

Dolk, H. E.: Geotropismus und Wuchsstoff. Utrecht: Diss. 1930. 29 S. [Holländisch].

Verf. untersucht in dieser Arbeit, inwieweit sich die von Went jr. 1928 (vgl. Ber. 7, 361) entwickelten Ansichten über das Zustandekommen einer tropistischen Krümmung für die Erklärung der geotropischen Reaktionen von Haferkoleoptilen anwenden lassen; er bedient sich der gleichen Methodik. Im Anfang seiner Arbeit teilt er noch seine schon 1928 von Went jr. vorläufig mitgeteilten Versuche an, nach denen es ohne Wuchsstoff kein Wachstum gibt. Bezüglich der Wirkung eines einseitigen Schwerkraftreizes findet er, daß ein solcher die totale Wuchsstoffproduktion der Koleoptilespitzen von Avena nicht ändert. (In Übereinstimmung hiermit zeigt auch keine Geowachstumsreaktion bei allseitiger Geoiduktion [Rotation parallel einer horizontalen Achse].) Der Wuchsstoffstrom wird aber in den Spitzen auf die Reizquelle zugewendete Seite abgelenkt; innerhalb 1 Stunde nach der Reizung ist die Wuchsstoffverteilung in den Spitzen schon wieder normal geworden. Eine Polarisation des Wuchsstofftransportes in der Richtung des Schwerkraftreizes und also eine Geoperzeption zeigten sich außerdem noch in den unter der Spitze gelegenen Optilzonen; also kann auch eine dekapitierte Koleoptile noch geotropisch reagieren. Von unten nimmt die Empfindlichkeit langsam ab (d. h. die Präsentationszeit nimmt ab), bis zu 10 mm unter der Spitze ist die Koleoptile deutlich empfindlich. Dolk untersucht auch den Verlauf der Krümmung und entwickelt aus den dabei gefundenen Tatsachen eine Anschauung über das Zustandekommen des Autotropismus. Eine durch geotropische Reizung intakter Koleoptilen erzeugte Krümmung schreitet bald basalwärts fort, während die apikalen Zonen sich wieder gerade strecken. Werden dagegen Koleoptilen gleich nach der Reizung dekapitiert, dann unterbleibt die Geradestreckung der apikalen Teile während der ersten 2½ Stunden. Die Geradestreckung ist also eine Spitzenwirkung. Den Mechanismus dieser Wirkung versucht D. auf Grund von Went jr. gegebenen Synthese des Wachstums einer Koleoptile zu erklären, indem er die von Went angenommene Limitierung des Wachstums in den verschiedenen Zonen durch 2 Faktoren (Wuchsstoff und „Zellstreckungsmaterial“, Z.S.M.) nicht als Ursache, sondern als relativ betrachtet. S.E. wird also eine Änderung in der Wuchsstoffmenge basal, eine Änderung in der Menge Z.S.M. apikal am deutlichsten bemerkbar. Infolge der Reizung wird nun eine ungleiche Wuchsstoffverteilung in der Koleoptile erzeugt und basal weitergeführt. Wir wollen hier zur Abkürzung von der + -Seite —Seite reden. An der + -Seite wird der Faktor Z.S.M. zeitweise stärker verbraucht (weil die größere Wuchsstoffmenge kräftigeres Wachstum ermöglicht), an der —Seite wird er einen relativen Überschuß bilden. Nach kurzer Zeit wird der Wuchsstoffstrom wieder normal, beide Seiten bekommen dann also die gleichen Wuchsstoffmengen. Es findet sich aber an der alten —Seite ein Überschuß an Z.S.M. Hier wird also nach D. stärkeres Wachstum einstellen, wodurch eine Geradestreckung folgt. Dagegen wird an der + -Seite wegen Mangels an Z.S.M. weniger Wuchsstoff verbraucht als an der —Seite, und also mehr Wuchsstoff den basalen Teilen zugeführt, wodurch die Krümmung dort noch verstärkt wird. Autotropismus und basale Weiterkrümmung setzen also ineinander. — Ein gleiches Bild wie die Krümmungen von nach geotropischer Reizung dekapitierten Koleoptilen geben dekapitierte Koleoptilen, worauf einseitig Agar-Wuchsstoff gesetzt worden ist. Die Geradestreckung beginnt erst nach 2½ Stunden,

wenn eine physiologische Spitze regeneriert worden ist. — Die phototropische Krümmung fängt später an, was sich auf die ausschließliche Spitzenperzeption zurückführen läßt, während der apikale Autotropismus sich zunächst nicht äußert, mit der länger andauernden Polarisierung der Spitze zusammenhängt. — Wie gezeigt wurde, lassen sich die Einzelheiten der geotropischen Krümmung nach gut mit dem Went-Cholodnyschen Schema in Einklang bringen. Angesichts des standekommens der Polarisierung basiert D. sich auf die hierfür versuchten Erklärungen auf elektrischem Wege. Die Ablenkung des Wuchsstoffes könne nun eintreten: a) der Wuchsstoff selber in einem elektrischen Felde beweglich sei (was D. experimentell nicht findet; auch hält er eine solche Erklärung aus theoretischen Gründen für wenig wahrscheinlich) oder b) weil die Transportbahn, etwa die Protoplasmaströmung in irgendeiner Weise polarisiert werde. Experimentelle Stützen für diese Ansicht bringt D. nicht. — Schließlich findet D. einen starken Einfluß der Richtung der Lichtkraft auf eine vorangegangene Geoiduktion. Nur bei kurzen Induktionszeiten dieser Einfluß gering. Daraus erklärt sich, daß die Abweichung vom Sinusgesetz, Präsentationszeitbestimmungen, unter verschiedenen Neigungswinkeln, gering ist.

E. C. Wassink (Utrecht)

Bünning, E., und K. Stern: Über die tagesperiodischen Bewegungen der Primblätter von *Phaseolus multiflorus*. II. Die Bewegungen bei Thermokonstanz. *Bot. Ges.* 48, 227—252 (1930).

Durch ihre zweite Arbeit über die tagesperiodischen Bewegungen der Primblätter von *Phaseolus* wollen die Verff. den Einfluß einer einmaligen Temperatursteigerung auf den Gang der Bewegungen prüfen. Es wurde daher die Methode angewendet, daß die Pflanzen entweder im Laufe des Tages oder spät abends (zwischen 19 und 23 Uhr) an den Apparat gesetzt wurden und hierbei entweder rotes oder gelbes Licht benutzt wurde. Es sollte festgestellt werden, ob durch diese einmalige Erregung der Pflanzen zu verschiedenen Tageszeiten eine entsprechende Verschiebung der Kurvenextreme herbeigeführt werden würde. — Zunächst ergaben die Versuche, daß kein wesentlicher Unterschied bestand zwischen dem Verhalten der Gelblicht- und der Rotlicht-Pflanzen. Das erste Senkungsmaximum lag in allen Fällen 10,5—16,6 Stunden nach dem Ansetzen der Pflanzen. Hieraus folgern die Verff. mit Recht, daß ein Faktor diese Bewegung auslöst, der die Pflanzen beim Ansetzen trifft. Sie sehen diesen Faktor hauptsächlich in der Temperaturerhöhung. Der Ref. sieht ihn in einer Veränderung des elektrischen Zustandes der Pflanze und ihrer Umgebung. Diese Annahme wird durch die vorliegende Arbeit nicht widerlegt. — Weiter prüfen die Verff., ob sich die späteren Senkungsmaxima so verschieben, daß sie wieder auf die Normalzeit in die frühen Morgenstunden fallen. Tab. 1 soll hierüber Auskunft geben. Leider scheitert bei der Umrechnung in Prozenten sich hier Fehler eingeschlichen zu haben. So weichen aus den Angaben ersichtlich ist, scheinen von den 143 beobachteten Schwingungen 66 in die Zeit zwischen 1 und 6 Uhr, 35 zwischen 7 und 12, 14 zwischen 13 und 20 zwischen 19 und 24 Uhr gefallen zu sein. Obwohl die Zahlen dieser Tabelle entgegenstehen zugunsten der Auffassung des Ref. sprechen, will er, da sie nicht einwandfrei sind, nicht allzu großes Gewicht auf dieselben legen. Die Auffassung der Verff., daß Temperaturschwankungen für die zeitliche Orientierung der Blattbewegungen ausschlaggebend sind, muß der Ref. noch aus anderen Gründen ablehnen. 1. Ist die Zahl der von den Verff. gemachten Versuche viel zu klein, als daß aus denselben einigermaßen fest begründete Schlüsse gezogen werden könnten. 2. Ist die zeitliche Auswertung der Kurven, die häufig sehr flach sind, zu leicht einer subjektiven Beurteilung unterworfen. Diese beiden Einwände erkennen die Verff. selber an. 3. Überschätzen sie bei ihrer Arbeitsweise den Deutungswert des Zeitpunktes des ersten Ausschlages viel zu sehr. Die Pflanzen werden durch das Anbinden und Aufstellen in der verschiedensten Weise gereizt. Man findet sie daher danach fast immer in Tagstellung. Welcher Art diese Reizung ist, ist nicht definiert. Sie kann auch elektrischer Natur sein. Gegen diese Auffassung bringen

liegenden Versuche keinen Beweis. Im Gegenteil, sie können noch als eine Stütze aufgefaßt werden. Denn obwohl die Verff. die ersten zeitlich anomalen Ausläge mitrechneten, lagen noch fast 50% aller Kurvenmaxima in den Stunden zwischen 1 und 6 Uhr. Der Ref. hat daher bei den eigenen Versuchen nach Erkenntnis der Fehlerquelle, wenn irgendmöglich, die Pflanzen schon 1 Tag vor dem eigentlichen Versuchsbeginn angebunden und so weit fertig aufgestellt, daß nur noch das Anbinden des Kokkonfadens nötig war. Dazu war dann keine direkte Berührung mit der Erde mehr nötig. Die Folge dieser Vorsicht war, daß auch die ersten Ausschläge regelmäßiger in die ersten Morgenstunden fielen. 4. Muß sich der Ref. gegen den Vorwurf wenden, als sei er zu seiner Überzeugung gekommen, ohne ausreichendes Versuchsmaterial. Er hat Versuche gemacht, bei denen die Pflanzen in völliger Dunkelheit aufgezogen wurden, und nachher während des Anbindens und Aufstellens nur für Augenblicke gerade die Arbeitsstelle mit einer kleinen roten Taschenlampe beleuchtet wurde. Ferner sind unter seinen Versuchen solche bei völliger Temperaturkonstanz, einige der von ihm benutzten Kellerräume so konstant waren, daß bei vereinzelt Versuchen überhaupt keine Schwankungen auftraten. Die Verff. weisen außerdem darauf hin, daß die „Bedeutung von Schwere und mechanischen Reizen beim Anbinden“ nicht hinreichend geklärt erscheint“. Hierbei muß der Ref. auf seine Untersuchungen über den Einfluß der Angriffsrichtung der Schwerkraft und auf die Pfefferschen mechanischen Hemmungen hinweisen. Gerade weil dem Ref. die ausschlaggebende Wirkung der Schwerkraftrichtung so bekannt ist, ging er bei seinen Versuchen beim Anbinden so vorsichtig vor. Die großen Verdienste Pfeffers um die Lösung des vorliegenden Problems werden auch nicht geschmälert, wenn hier noch einmal darauf hingewiesen wird, daß die zeitliche Lage der Extreme der Pfefferschen Kurven meist nicht richtig sein dürfte, da er einen Registrierapparat mit nur einer Walze von keinem großen Durchmesser verwendete. Man darf daher aus der Lage der Extreme seiner Kurven keine Schlüsse ziehen. Nach alledem möchte der Ref. sich über die vorliegende Arbeit äußern, daß sie einen brauchbaren Beitrag zur Weiterarbeit darstellt, daß aber die Anschauungen der Verff. über die einschneidende Wirkung von Temperaturankankungen nicht bewiesen wurde. (I. vgl. diese Ber. 13, 810.) R. Stoppel.

Bewegung, Reiz- und Sinnesphysiologie der Tiere.

Gemeine Muskel- und Nervenphysiologie.

Hill, A. V., and P. S. Kupalov: The vapour pressure of muscle. (Der Dampfdruck des Muskels.) (*Dep. of Physiol. a. Biochem., Univ. Coll., London.*) *Proc. roy. Soc. Lond. B* 106, 445—477 (1930).

[Vgl. Ber. Physiol. 57, 403.

oo

Rothschild, Paul: Gilt das Alles-oder-nichts-Gesetz für den Tätigkeitsstoffwechsel der Einzelzuckungen des Muskels? (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem u. f. Physiol., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Med. Forsch., Heidelberg.*) *Biochem. Z.* 222, 130 (1930).

Hartree und Hill hatten gefunden, daß bei tetanischer Reizung von Sartorien die initiale Energieproduktion am größten bei effektiver Arbeitsleistung und am kleinsten bei isometrischer Kontraktion ist, während bei Einzelzuckungen kein Unterschied zwischen isotonischer und isometrischer Kontraktion mehr bestand und die Anspannungswärme beide Male gleich war. Danach würde das Alles-oder-nichts-Gesetz für die Einzelzuckungen des Sartorius gelten, nicht dagegen für Tetani. Der Autor versucht in der vorliegenden Mitteilung, wie weit die Milchsäurebildung mit diesem Zustand in Einklang steht. Dies erschien ihm so wichtiger, als von Nagaya bei isotonischen Einzelzuckungen bei mittlerer Belastung die Milchsäurebildung am größten gefunden wurde. Der Autor konnte nun in der Tat nachweisen, daß die Milchsäurebildung bei Sartorien von der Zuckungsform und der Belastungsgröße unabhängig ist,

wie es nach den Versuchen von Hartree und Hill zu erwarten war. Bei Gastrocnem und Semimembranosi wird dagegen bei isotonischer Kontraktionsform 20—30% weniger Milchsäure gebildet (bei Einzelzuckungen). Dieser Unterschied findet sich direkter wie indirekter Reizung, wie auch im curaresierten Muskel. Bei der Überprüfung dieser Resultate mit Wärmemessungen hat A. V. Hill das unterschiedliche Verhalten von Sartorien und Semimembranosi vollständig bestätigen können. Bei noch kleineren Belastungen als den früher benutzten war auch am Sartorius die isometrische Zuckung mit einer kleineren Energieproduktion verbunden als die isometrische. Danach ist also das Alles-oder-nichts-Gesetz für den Stoffwechsel von Einzelzuckungen des Muskels nicht gültig. (Hartree, vgl. diese Ber. 11, 215.) Nachmansohn.

Lipmann, F., und K. Lohmann: Über die Umwandlung der Harden-Youngse Hexosediphosphorsäure und die Bildung von Kohlehydratphosphorsäureestern Froschmuskelextrakt. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.*) Biochem. Z. 222, 389—403 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 407.

Lohmann, K.: Über die Bildung und Aufspaltung von Phosphorsäureestern der Muskulatur in Gegenwart von Fluorid, Oxalat, Citrat und Arseniat. I. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.*) Biochem. Z. 222, 324—388 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 405.

Kapeller-Adler, Regine, und Julie Krael: Untersuchungen über die Stickstoffverteilung in den Muskeln verschiedener Tierklassen. I. (*Inst. f. Med. Chem., Univ. Wien.*) Biochem. Z. 221, 437—460 (1930).

An Stelle der bisher geübten wässrigen Extraktion des Muskels wurden die alkoholischen Methoden angewandt. Der Rückstand wurde durch wiederholte Behandlung im Eiskask und Vakuum solange eingeeignet, bis die schließlich resultierende, bei vermindertem Druck eingeeignete Lösung mit absol. Alkohol nicht mehr ausfiel. Die Gesamtmenge der Phosphat wurde durch mehrmaliges Ausschütteln mit Äther eliminiert. Dieser Muskelextrakt wurde dann mit 30% Natronlauge verseift. Die Verseifung ergab ein Gemenge von Ammoniummethylamin und Trimethylamin. Wegen der quantitativen Bestimmung der einzelnen Bestandteile muß auf die Originalarbeit verwiesen werden.

Ähnliche Mengenverhältnisse in bezug auf die durch Verseifung entstandenen Basen fanden sich beim Rind, Kaninchen, Hund und Karpfen. Abweichende Ergebnisse konnten bei Kabeljau und Regenwurm festgestellt werden. Aus den Versuchsergebnissen leiten die Autoren einen weiteren Beweis für das präformierte Vorkommen des Methylguanidins im Muskel her und das durch Verseifung gebildete Trimethylamin läßt Rückschlüsse auf den Carnitingehalt der untersuchten Säugetiermuskeln und den Betaingehalt der Fischmuskeln zu. Der Rindsmuskel enthält mehr Carnitin als die übrigen Säugetiermuskeln. Das bisher nur im Seefischmuskel aufgefunden Trimethylaminooxyd konnte indirekt auch im Säugetiermuskel nachgewiesen werden. Eine biologische Ausnahmestellung nimmt der Seefischmuskel durch große Mengen darin enthaltener vorgebildeter freier Basen ein.

Schwarz (Berlin).

Kapeller-Adler, Regine, und Julie Krael: Untersuchungen über die Stickstoffverteilung in den Muskeln verschiedener Tierklassen. II. Mitt.: Über die Stickstoffverteilung im Rothen- und Haifischmuskel. (*Inst. f. Med. Chem., Univ. Wien.*) Biochem. Z. 224, 364—377 (1930).

Im Gegensatz zu den früheren Feststellungen Hoppe Seylers und Schmidts fanden Verff. mit der von ihnen ausgebauten Methode (vgl. I. Mitt. vorstehendes Referat) wesentlich weniger Trimethylaminooxyd und viel mehr Trimethylamin in der Muskulatur von Rothen und Haifisch. Diesen Unterschied führen sie auf bakterielle Zersetzungsprozesse zurück, die den erst längere Zeit nach dem Tode untersuchten Tieren. Im Gegensatz zu früheren Feststellungen sind größere Mengen Methylamin gefunden worden. Der Betaingehalt des Seefischmuskels ist erheblich höher als derjenige des Fußfischmuskels. Das Trimethylaminooxyd wird im Stoffwechsel des Seefisches kaum angegriffen und erscheint erheblich als Hauptausscheidungsprodukt im Harn. Nur eine geringe Menge wird entmethyliert.

Schwarz (Berlin).

Cordier, D., et H. Magne: Sur le métabolisme des hydrates de carbone au cours du travail musculaire. (Über den Kohlehydratstoffwechsel bei Muskelarbeit.) (*Labor.*

t. d'Histoire Naturelle des Corps Organ., Coll. de France, Paris.) C. r. Soc. Biol. Paris 102, 899—902 (1929).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 83.

Wassermeyer, H.: Über chemische und kolloidchemische Prozesse, welche Hypertrophie und Atrophie des Skelet- und Herzmuskels begleiten. (Med. Poliklin., Univ. Heidelberg.) Klin. Wschr. 1930 I, 251—255.

Vgl. Ber. Physiol. 55, 474.

Heidermanns, Curt: Vergleichend physiologisch-ökologische Untersuchungen an Ermüdungsercheinungen der Skelettmuskeln der Anuren. (Zool. u. Vergleich. Anat. Inst., Univ. Bonn.) Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. 47, 723—758 (1930).

Mit dem Ziele, Ökologie und Biologie mit der Physiologie zu verbinden, wird in Fortsetzung früherer Arbeiten über die Leistungsfähigkeit (vgl. diese Ber. 13, 289) und über die chemische Zusammensetzung (vgl. diese Ber. 6, 677) nunmehr die Ermüdbarkeit des Gastrocnemius verschiedener Anurenarten vergleichend untersucht. Dabei wurde der ausgeschnittene Muskel direkt mit Einzelinduktionsschlägen und tetanisch gereizt. Miteinander verglichen werden dann die Kurven mit zum Eigengewicht des Muskels gleicher relativer Belastung, die zwischen dem 10- und 400fachen des Eigengewichtes variiert wird. Bei 2 Einzelreizen pro Sekunde ermüden die Ranaarten wesentlich schneller als die Bufoarten und als Pelobates fuscus und Bombinator pachypus. Hyla arborea ermüdet bei geringerer Belastung wesentlich langsamer, bei größerer ebenso schnell wie die Ranaarten. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei dieser Reizfrequenz und bei der stets verwendeten Reizstärke, daß die Schließungsschläge ununterschiedlich sind, bei den Ranaarten fast stets eine Kontraktur hinzutritt, bei den Bufoarten, zumal bei Bufo calamita, dagegen nicht. Es wird näher darauf eingegangen, wie die Kurve der Zuckungsgipfel von dem Auftreten der Kontraktur beeinflusst wird. In einer 2. Versuchssreihe wird der Verlauf der Verkürzung pro 1 mm Muskellänge bei ununterbrochener tetanischer Reizung verglichen. Bei den Ranaarten sinkt auch bei dieser Reizart die Verkürzung sehr viel schneller ab als bei den anderen Arten. Ferner ist bei letzteren der Verlauf der Ermüdung in weit größerem Maße unabhängig von der Höhe der Belastung. Bei wiederholter kurzdauernder tetanischer Reizung tritt die Ermüdung in zwei verschiedenen Typen auf. Beim 1., besonders bei Bufo, ausgeprägten Typ wird die Höhe der aufeinanderfolgenden Tetani allmählich kleiner. Beim 2. Typ, den besonders Pelobates fuscus zeigt, wird bei größerer Belastung die ersten Tetani fast gleich hoch, und dann verschwindet fast plötzlich jede Reaktion. Außer den durch die Art bedingten Unterschieden sind noch ökologische Faktoren von großer Bedeutung für den Reaktionsverlauf. Bemerkenswert ist der Befund, daß die großen jahreszeitlichen Verschiedenheiten durch Angleichung der Außengedingungen nicht beseitigt werden können.

Wachholder (Berlin).

Mononobe, Kaoru: Untersuchungen über den Stoffwechsel des Herzens. II. Mitt. Die jahreszeitlichen Schwankungen der verschiedenen Phosphatmengen im Herz- und Skelettmuskel der Kröten. (Pharmakol. Inst., Med. Akad., Kyoto.) Fol. pharmacol. Japon. 10, 29—38 (1930).

Nach früheren Arbeiten aus dem Embdenschens Institut ist der Lactacidogengehalt von Herzmuskeln jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen. Der Verf. hat im Anschluß an diese Versuche an Kröten (jeweils 6 Tieren) von Monat zu Monat Bestimmungen des anorganischen, Phosphokreatin-, Lactacidogen- (in Wahrheit Lactacidogen + Pyrophosphorsäure) und des gesamten löslichen Phosphats am Skelettmuskel und am Herzmuskel vorgenommen. Für alle Reaktionen wurden jahreszeitliche Schwankungen — und zwar für beide Muskelarten gleichmäßig — beobachtet. Das anorganische Phosphat weist im Winter (Dezember—Februar) ein Minimum, im Sommer (Juli—August) ein Maximum auf, ebenso verhält sich das Lactacidogenphosphat, während Phosphokreatinphosphat und gesamtes lösliches Phosphat ein Maximum in den Wintermonaten, im Sommer dagegen ein Minimum zeigen. (I. vgl. diese Ber. 16, 184.)

Lehnartz (Frankfurt a. M.).

Kuré, Ken, E-ichi Araki und Takeo Maéda: Die autonome Innervation des willkürlichen Muskels und ihre Beziehung zur chemischen Wärmeregulation. (Med. Klin., Univ. Tokyo.) Pflügers Arch. 225, 372—383 u. Proc. imp. Acad. (Tokyo) 6, 171—172 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. 57, 794.

Winterstein, Hans: The metabolism of the local excitatory process and of the propagated disturbance in nervous tissues. (Der Stoffwechsel des lokalen Erregungs-

prozesses und der fortgeleiteten Erregungswelle in nervösen Geweben.) *Science* (N. Y.) 1930 I, 641—643.

Verf. gibt eine Übersicht über seine in dieser Richtung ausgeführten Versuche, die alle dafür sprechen, daß nur an der Reizstelle selbst der O_2 -Verbrauch gesteigert ist, daß aber die Erregungsleitung nicht oder nur zu einer eben merklichen Zunahme des O_2 -Verbrauches führt. Dies gilt für den peripheren Nerven, aber auch für das Froschrückenmark: ein Rückenmark, das in der Respirationskammer direkt elektrisch gereizt wird, zeigt einen stark erhöhten O_2 -Verbrauch und eine ebenso gesteigerte CO_2 -Produktion; wird aber das Rückenmark reflektorisch von einem N. ischiadicus aus in Erregung versetzt, so ändert sich der Gaswechsel gegenüber der Ruhe nur sehr wenig. Auch während der Strychninvergiftung ist die Steigerung des Gaswechsels eines reflektorisch erregten Rückenmarkes minimal (v. Ledeboer). Zu dem gleichen Ergebnis führten Versuche, die am isolierten Rückenmark von Haien ausgeführt wurden, wobei Bewegungen des Schwanzes als Index für die Erhaltung des Leistungsvermögens dienten. Im Gegensatz zum Gaswechsel zeigte der Glykoseverbrauch des Froschrückenmarkes auch bei reflektorischer Erregung eine starke Steigerung. Verf. hält die Steigerung des O_2 -Verbrauches eines direkt elektrisch gereizten Organes für ein Kunstprodukt der elektrischen Reizung und nicht für eine Folge der ausgelösten Erregung. *Brücke*.

Scheminzky, Ferdinand, und Friedrike Scheminzky: Permeabilität und Ermüdung. II. Mitt. Ist der Wendungseffekt durch die Reizung neuer Fasern oder durch Grenzflächenänderungen schon erregter Fasern bedingt? (*Physiol. Inst., Univ. Wien.*) *Pflügers Arch.* 225, 145—193 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 558.

Heller, Robert: Permeabilität und Ermüdung. III. Mitt. Die Bedeutung der Stromflußzeit für den Verlauf der Ermüdungskurve und den Wendungseffekt. (*Physiol. Inst. Univ. Wien.*) *Pflügers Arch.* 225, 194—229 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 560.

Stiasny, Gottfried: Permeabilität und Ermüdung. IV. Mitt.: Der Wendungseffekt bei tetanischer Reizung. (*Physiol. Inst., Univ. Wien.*) *Pflügers Arch.* 225, 230—264 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 561.

Kann, Susanne: Permeabilität und Ermüdung. V. Mitt.: Ermüdbarkeit und Wendungseffekt bei Reizung mit Induktionsströmen. (*Physiol. Inst., Univ. Wien.*) *Pflügers Arch.* 225, 265—297 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 562.

Jacobson, Edmund: Electrical measurements of neuromuscular states during mental activities. II. Imagination and recollection of various muscular acts. (Die elektrische Messung neuromuskulärer Zustände während geistiger Tätigkeit. II. Vorstellung und Erinnerung an verschiedene muskuläre Tätigkeit.) (*Physiol. Laboratory, Univ. of Chicago, Chicago.*) *Amer. J. Physiol.* 94, 22—34 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* 57, 641.

Zentren.

Dobrzaniecki, W., et M. Aron: Influence de l'excitation du sympathique cervical sur le fonctionnement thyroïdien. (Einfluß der Reizung des Halssympathicus auf die Funktion der Thyreoidea.) (*Inst. d'Histol., Fac. de Méd., Strasbourg.*) *C. r. Soc. Biol. Paris* 104, 1321—1323 (1930).

16 Versuche wurden am Kaninchen ausgeführt. Vor Versuchsbeginn wurde die Thyreoidea der ungereizten Seite als Kontrolle fixiert. In einer Gruppe von Experimenten wurde der Sympathicus in der Gegend des Ggl. cerv. sup., in einer anderen Gruppe in der Gegend des Ganglion stellatum mit faradischen Strömen gereizt. In einem Fall wurde die Thyreoidea nach 60 Minuten, in anderen Fällen nach 5—24 Stunden fixiert. Der Vergleich mit der Kontrolle ergab keinerlei histologische Unterschiede. Demgegenüber reagiert die Thyreoidea auf kleinste Dosen des Vorderlappenextraktes

Hypophyse mit histologischen Veränderungen. Es wird geschlossen, daß der Halssympathicus zwischen Ggl. cerv. sup. und Ggl. stell. keine Fasern enthält, deren elektrische Reizung auf die Thyreoidea wirkt. *F. E. Lehmann* (Bern).

Aron, M., et W. Dobrzaniecki: Influence de l'ablation du sympathique cervical sur le fonctionnement thyroïdien. (Einfluß der Abtragung des Halssympathicus auf die Funktion der Thyreoidea.) (*Inst. d'Histol., Fac. de Méd., Strasbourg.*) C. r. Soc. Sci. Paris **104**, 1323—1325 (1930).

Bei Kaninchen verschiedenen Alters wurde der Halssympathicus abgetragen, wobei zwar das Ganglion cervicale superius mit einbegriffen bis zum Ganglion stellatum, geschont wurde. Nach einer Frist von 3 Tagen bis 2 Monaten wurden den Tieren intravenöse Injektionen des Extrakts des Hypophysenvorderlappens verabreicht, entprechend 1 g frischer Hypophyse pro Gabe. Die Kontrollen reagierten im Sinne der Aktivität mit tiefgreifenden histologischen Veränderungen der Thyreoidea. In operierten Fällen zeigte die Thyreoidea keine Veränderungen. Bei diesen operierten Tieren ergab sich die Wirksamkeit des Extrakts aus der intensiven Reaktion des Organs. Daraus wird geschlossen, daß die experimentelle humorale Erregbarkeit der Thyreoidea nicht mehr nachweisbar ist, wenn der Halssympathicus beidseitig exstirpiert ist. *F. E. Lehmann* (Bern).

Hunter, Walter S.: A consideration of Lashley's theory of the equipotentiality of cerebral action. (Eine Erwägung zu Lashleys Theorie über das Ausgleichvermögen des Hirntätigkeit.) (*Psychol. Laborat., Univ., Worcester, Mass.*) J. gen. Psychol. **3**, 38—468 (1930).

Entgegen der Ansicht, daß das Verhalten des Individuums von Nervenimpulsen kontrolliert werde, die über Reflexbögen zu Leistungen der Muskeln und Drüsen führen, glaubt eine allgemeine nervöse Plastizität die Grenzen der Vervollkommenung des Individuums bestimme, wie Hunter sagt, glaubt Lashley, daß Hirnrinde und wahrscheinlich auch Rückenmark als qualitativ homogenes Ganze funktionieren. Zur Begründung seiner Anschauung machte Lashley folgende Versuche: Das Vermögen, Helixen zu unterscheiden, wird beim normalen Tiere vom occipitalen Hirnpol aus bestimmt. Lashley zerstörte diese Region bei Ratten und stellte Wiederkehr der optisch-motorischen Orientierung fest. Die Anpassung der Haltung an eine schiefe Ebene wird vom Stirnhirn aus gesteuert; Lashley fand bei teilweiser Zerstörung des Stirnhirns keine Funktionsverminderung, sondern erst bei völliger Zerstörung der Frontallappen Funktionsverlust. Die räumliche Orientierung unter erschwerten Bedingungen („Labyrinth“) läßt sich durch Zerstörung von Hirngewebe weiter erschweren. Verproben und Erhaltung erworbener Fähigkeiten sollen nicht von feinen, lokalisierten Strukturveränderungen in der Hirnrinde abhängig sein. H. kritisiert nun diese Experimente — mit gutem Recht — als unbeweisend für die Anschauung Lashleys. Lashley sei fehlerhaft vorgegangen in Kontrolle und Analyse hochkomplizierter Phänomene, vor allem des Orientierungsvermögens. Darüber hinaus möchte Referent merken, daß auch die Versuche Lashleys seit langem durch klassische Experimente bestätigt sind; darüber belehrt jedes Lehrbuch der Physiologie. Die Kriegserfahrungen haben uns überdies weitgehende Aufschlüsse über Funktion von Hirn und „Hirnrinde“ geliefert. Über das „Ausgleichsvermögen“ berichten aber die klassischen Untersuchungen von Kurt Goldstein und seiner Schule sowie die geistreichen Versuche von Bethe in umfassendem Umfange. (Vom Verf. wird nichts davon zitiert!)

A. Friedemann (Berlin-Buch).

Rizzolo, Attilio: Motor points located in the posterior central convolution of the cerebral cortex have each a characteristic excitability. (Die einzelnen motorischen Punkte auf der hinteren Zentralwindung des Hundehirns haben verschiedene, charakteristische Erregbarkeit.) (*Laborat. of Gen. Physiol., Sorbonne, Paris.*) Arch. Pharmacol. sper. **49**, 315—323 (1930).

Vgl. Ber. Physiol. **57**, 466.

Sinnesorgane.

Merker, E.: Sehen die Daphnien ultraviolettes Licht? (*Biol. Stat., Lenz u. Z. Inst., Univ. Gießen.*) Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. 48, 277—348 (1930).

Werden Daphnien von unten mit ultraviolettem Licht bestrahlt, so wenden von Zeit zu Zeit der Lichtquelle den Rücken (Lichtrückenreflex), ebenso wie bei Wendung für den Menschen sichtbaren Lichtes. Dabei wird das Ultraviolett als Licht gesehen, seine orientierende Wirkung beruht also nicht nur darauf, daß es im Tierkörper teilweise in sichtbares Fluoreszenzlicht verwandelt wird. Dies wird dadurch gezeigt, daß die Tiere gleichzeitig von unten mit Ultraviolett und von oben mit Fluoreszenzlicht einer mit Chininsulfat getränkten Gelatineplatte bestrahlt werden, welches dem des Daphnienkörpers sehr ähnlich ist. Obgleich das Fluoreszenzlicht des Chininsulfat erheblich stärker war als das im Daphnienkörper selbst gebildete, schwammen die Tiere auch bei dieser Versuchsanordnung zeitweise auf dem Rücken bei Einstrahlung des Ultraviolett von oben und des Fluoreszenzlichtes von unten dagegen niemals. Das von unten einstrahlende Ultraviolett orientiert die auf dem Rücken schwimmenden Tiere also direkt durch unmittelbare Lichtwirkung, nicht indirekt auf dem Wege über das im Tierkörper entstehende Fluoreszenzlicht, da dessen Wirkung ja durch das stärkere, von oben einfallende Chininsulfat-Fluoreszenzlicht überkompensiert werden müßte. Auf Erhellung oder Verdunkelung mit ultraviolettem Licht reagieren die Tiere ebenso wie bei Anwendung sichtbaren Lichtes mit einem vorübergehenden Absinken. Bei ultraviolettem Licht sind diese Reaktionen schneller und anhaltender als bei dem starken Fluoreszenzlicht des Chininsulfat. Hieraus lassen sich ebenfalls auf eine direkte Lichtwirkung des Ultraviolett zu schließen, da die Stärke der Reaktionen sich umgekehrt verhalten müßten, wenn das Ultraviolett nur durch seine teilweise Umsetzung in Fluoreszenzlicht im Tierkörper wirkte. Die Fluoreszenz des Daphnienkörpers geht nicht nur von der Schale aus, der Körper ohne Schale fluoresziert stärker als diese allein. Auch die isolierten Krystallkegel fluoreszieren. Am ganzen Tier ist ihre Fluoreszenz aber nicht sichtbar, da sie durch die stärkere Fluoreszenz des übrigen Körpers überstrahlt wird. Der Körper der Tiere ist für Ultraviolett von mehr als $224\text{--}240\text{ }\mu\mu$ durchlässig, die isolierten Krystallkegel jedenfalls für $313\text{ }\mu\mu$. Weiterhin finden sich Angaben über die Zusammensetzung des Fluoreszenzlichtes und über die zur Abtötung der Daphnien erforderlichen Lichtmengen im Sonnenlicht und im Licht einer Quarzquecksilberlampe.

K. Henke (Göttingen)

Brighenti, Dino: Ricerche sulla attrazione esercitata dai colori sugli anopheli (*Untersuchungen über die Anziehungskraft der Farben auf Anophelen.*) (*Sez. per lo Studio d. Malaria nelle Bonifiche, Staz. Sperim. per la Lotta Antimalarica, Bologna.*) Riv. Malariol. 9, 224—231 (1930).

Der Autor, der anscheinend die modernen Untersuchungen (v. Frisch u. d. h.) nicht kennt, hat im Laboratorium gefunden, daß die Anophelen, um sich zur Ruhe zu setzen, gelb, rot und weiß bevorzugen. Jetzt hat er die Decken zweier Ställe in Feldern mit verschiedenen Farben streichen lassen, in einem Fall kobaltblau, grün und carminrot, und zwar an der Süd- und Nordhälfte in verschiedener Folge. In dem anderen Stalle gilt für einen zweiten Stall mit weiß, gelb, violett und grün gemalter Decke. In beiden Ställen werden über das monatliche Mittel der Verteilung gegeben, d. h. für Juni das Mittel aus 5, für Juli aus 19, für August aus 12 und für September aus 7 Beobachtungen. Das Grau sieht der Autor als indifferent an. Für die Farben schließt sich die Anophelen werden besonders durch Carminrot, Violett und helles Chromgelb angezogen. Sie zeigen aber wenig Vorliebe für Kobaltblau und Dunkelgrün. (Immerhin zeigen nach den Tabellen die gleichen Farben sehr große Abweichungen. Zwei weiße Fächer sind im Verhältnis von 1:6 verschieden, wobei eines der weißen Fächer im weitem das stärkste beflogene ist. Dabei liegt es genau symmetrisch zu dem schwächsten beflogenen Fach von allen (ebenfalls weiß). Entweder ist also in diesen Resultaten

ungeheuer große Zufälligkeit enthalten oder neben den Farbwirkungen sind noch eine Reihe anderer fundamentaler Einflüsse vorhanden gewesen. Ref.) Der Autor hat es nicht für unmöglich durch geeignetes Malen der Eingänge und Fenster eine gewisse Schutzwirkung zu erreichen.

Martini (Hamburg).

Tagawa, S.: Über die Dispersion der brechenden Medien des Auges. (*Univ.-Augen-u., Leipzig.*) *Acta Soc. ophthalm. jap.* 34, 583—598 u. dtsch. Zusammenfassung 73 (30) [Japanisch].

Beim Kaninchen- und Menschenauge bestimmte Verf. die Brechungsquotienten Augenmedien für die Fraunhoferschen Linien *C, D, F* und *G*. Für Tränen, Kammerwasser, Linse und Glaskörper wurde das Pulfrische Refraktometer benutzt, für Hornhaut und Hornepithel eine Kombination der Einbettungsmethode mit dem Töpler'schen Verfahren. Ergebnisse: 1. Die Augenmedien haben normale Dispersion. Brechwerte nehmen mit Abnahme der Wellenlänge allmählich zu. 2. Die Dispersionsquotienten aller brechenden Medien mit Ausnahme des Hornhautepithels entsprechen der des Wassers. 3. Beim Hornhautepithel ist die Zunahme der Brechwerte mit Abnahme der Wellenlänge viel größer als bei den übrigen Medien. 4. Brechungsindex des Hornhautepithels viel höher als der der Hornhaut. Reflexionsfähigkeit der Hornhautoberfläche wächst mit Abnahme der Wellenlänge sehr stark. 5. Die einzelnen Bezirke der Linse haben verschiedene Brechwerte, aber fast gleiche Dispersion. 6. Beim Kaninchenauge sind die Brechungsquotienten: Tränen 1,3386; Hornhautepithel 1,4129; Hornhaut 1,3786; Kammerwasser 1,3351; vorderer Pol 1,391; hinterer Pol 1,3860; Äquator 1,3740; Kernzentrum 1,4450; Glaskörper 1,3353. 7. Beim Menschenauge: Tränen 1,3365; Glaskörper 1,3356; vorderer Pol 1,3994; Äquator 1,3802; Kernzentrum 1,4021.

Wirth (Bochum).

Ploman, K. G.: Continued investigations on the lacrymal passages. (Fortgesetzte Untersuchungen über die Tränenabflußwege.) (*Eye Clin., Seraphimer Hosp., Stockholm.*) *Acta ophthalm. (Köbenh.)* 8, 155—171 (1930).

Verf. untersuchte, ausgehend von den Forschungsergebnissen Krehbiels und Liebergs, die Bewegungen, die am Tränensack während der Abbeförderung der Tränenflüssigkeit von der Bindehaut zur Nase beobachtet werden und nahm unter ständiger Kontrolle volumetrische Experimente am Sack vor. Er benutzte dazu ganz normale Tränenwege. Jüngere Kollegen stellten sich ihm zu den Versuchen zur Verfügung. Die Experimente wurden an 7 Personen vorgenommen. Auf einzelne nicht ausschaltende, aber das Ergebnis vielleicht beeinflussende Schwierigkeiten bei den Versuchen weist Verf. selbst hin. Er fand im übrigen, daß beim Lidschluß und -öffnung ein regelmäßiges Zusammendrücken und Erweitern des Tränensackes stattfindet und dementsprechend der Meniscus in einer Glasröhre steigt oder fällt, beim Zusammenrücken der Lider ist die Kompression des Sackes dementsprechend ausgesprochen (steigen des Meniscus und typische Änderung des Sackes im Röntgenbild). Nach dem Ausfall des Fallens des Flüssigkeitsmeniscus glaubt Verf. ungefähr die Größe der Volumenschwankungen des Tränensackes in Kubikmillimeter schätzen zu dürfen. Natürlich können die physiologischen Verhältnisse mit den hier gefundenen experimentellen Ergebnissen nicht gleichgesetzt werden. Individuell finden sich große Verschiedenheiten. Verf. glaubt auch nach seinen Erfahrungen annehmen zu können, daß sich normalerweise eine Art Klappe zwischen dem Tränensack und den Tränenkanälchen befindet, die bei Erhöhung des Luftdruckes in der Nasenhöhle das Austreten von Luft aus den Tränenkanälchen verhindert. Durch die Dilatation des oberen Teils des Sackes wird diese Klappe wahrscheinlich geöffnet. Bei kräftigem Schluß der Lider stieg der Meniscus rasch nach Verlauf einer kleinen Spanne Zeit, da sich wahrscheinlich diese Klappe erst öffnen mußte. Für den weiteren Abfluß der Tränen in die Nase scheint es dem Verf. mechanische Notwendigkeit zu sein, daß während des Lidschlusses die Tränenkanalwand von außen unter verstärkten intraorbitalen Druck gesetzt wird. Denn nur so kann sie dem Druck der durch die Kanälchen einströmenden Tränenflüssigkeit

standhalten und den Reibungswiderstand im Tränenkanal überwinden. Im selben Moment des Lidschlusses wird die gleiche Menge Tränenflüssigkeit von den Tränenkanälchen in den Tränensack befördert und aus dem Tränenkanal in die Nase ausgepreßt. Kurz zusammengefaßt ist Verf. der Ansicht, daß beim Lidschluß der verstärkte intraorbitale Druck die Kanälchen veranlaßt, ihren Inhalt in den Tränensack zu entleeren. Wenn dieser Druck auch den Sack komprimiert, beteiligt sich dieser auch dem Pumpmechanismus. In anderen Fällen nimmt er wahrscheinlich an dem Abtransport der Tränen nicht teil. Welche Art der Punktion des Tränenapparats von beiden die bessere ist, ist schwer zu sagen. Jedenfalls stellen die Tränenkanälchen den wichtigsten Teil des Pumpsystems dar, obgleich der Tränensack auch gewissen mechanischen Bedingungen genügen muß.

Ziemssen (Fürstenwalde).⁹⁹

Das Verhalten der Tiere. Vgl. Psychologie.

Lane, Clayton: Behaviour of infective hookworm larvae. (Das Verhalten infektiöser Hakenwurmlarven.) Ann. trop. Med. **24**, 411—421 (1930).

Die Hakenwurmlarven haben Aktivitäts- und Ruheperioden. In der Ruhe reagieren sie nicht auf Reize. Durch mechanische Reize, Wärme und gewisse Nahrungsstoffe (Serum) können sie aktiviert werden. Der Verf. konnte weder Rheotaxis noch Thermotaxis bei ihnen nachweisen (gegen Khalil und Fülleborn). Die Bewegung gegen Wasserströme soll durch Körperbau und Schwerpunktslage der Larven bedingt sein. Ansammlung in der Nähe von Wärmequellen soll dadurch zustande kommen, daß durch die Wärme die Bewegungen der Larven beschleunigt werden. Bewegungen sie sind im Temperaturgefälle zufällig aufwärts, so nimmt diese Beschleunigung zu, bewegen sie sich abwärts, ab. Dadurch wird der Eindruck positiver Thermotaxis erweckt. Dagegen zeigen die Larven positive Thigmotaxis und bewegen sich in Berührung mit festen Substraten schneller, allerdings wohl nicht so schnell, wie Fülleborn angibt. Verf. kommt zu dem Schluß, daß die Larven außer positiver Thigmotaxis keine Taxien haben. Daß dies aber im Verein mit einer stärkeren Aktivierung durch vom Wirt ausgehende Reize für die Wirtsfindung genügt.

K. Herter (Berlin).

Allard, H. A.: Changing the chirp-rate of the snowy tree cricket *Oecanthus niveus* with air currents. (Änderung der Zirpfrequenz von *Oecanthus niveus* [weiße Baumgrille] durch Luftströmungen.) (U. S. Dep. of Agricult., Jeanerette, Louisiana.) Science (N. Y.) **1930 II**, 347—349.

Die Zahl der Zirptöne, die *Oecanthus niveus* pro Minute hervorbringt, ist deutlich von der Temperatur abhängig; sie kann aber auch durch Luftbewegungen gesteigert werden (Ventilator in etwa 2 m Abstand vom Versuchstier). Beispiel: Steigerung von 172 Zirptönen in der Minute auf 185 nach Einschalten des Ventilators. — Die Luftfeuchtigkeit scheint den Vorgang wesentlich zu beeinflussen.

G. Koller.

Champy, Ch.: Corrélation entre organes sensoriels et caractères sensibles liés aux phénomènes sexuels. (Beziehungen zwischen Sinnesorganen und an sexuelle Erscheinungen gebundenen Reizarten.) Arch. internat. Pharmacodynamie **38**, 577—590 (1930).

Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Korrelation hin, die bei einer gegebenen Spezies zwischen der guten Ausbildung bestimmter Sinnesorgane einerseits und solchen Reizorganen andererseits besteht, welche spezifische Reize aussenden, die bestimmt sind, von diesen selben Sinnesorganen aufgenommen zu werden. Es ist Tatsache, daß man innerhalb einer bestimmten Tiergruppe, bei der einem Sinne das Übergewicht zufällt, gleichzeitig auch eine häufige Entwicklung von Organen bemerken kann, die dieser Sinnessphäre adäquate Reize aussenden. Wenn man z. B. die Vögel mit den Säugtieren vergleicht, ist es unbestreitbar, daß die ersteren eine hervorragende Ausbildung des Gesichtssinnes und der Sehzentren aufweisen, die letzteren eine beträchtliche Entwicklung des Geruchsorgans und des Rhinencephalon. Korrespondierend damit

bei Vögeln das Auftreten auffälliger Färbungen, bei Säugern das Vorhandensein von Duftdrüsen sehr häufig gegeben. Und Ausnahmen bestätigen die Regel: Bei Nachtvögeln fehlen die auffälligen Farben, die hier nicht perzipiert werden können. Bei den Primaten läßt sich eine Rückbildung des Rhinencephalon und der Nase gleichzeitig mit stärkerer Entwicklung des Sehapparates feststellen, und gleichzeitig kommt häufiger zur Ausbildung lebhafter Färbungen usw. Noch auffälliger sind diese Erscheinungen, wenn sie temporären Charakter besitzen: Die Tritonen sind gewöhnlich nachtgefärbt und führen ein nächtliches Leben. Zur Brunstzeit werden sie Tagtiere und zeigen dann außerordentlich lebhaftere Färbungen. Nichts dergleichen ist bei den tags ein nächtliches Leben führenden Salamandern der Fall. Besonders im sexuellen Leben spielen diese Erscheinungen eine hervorragende Rolle. Was der Verf. nun im Besonderen zeigen will, ist, daß die Entwicklung der reizaussendenden Organe und der entsprechenden Sinnesorgane häufig unter der Kontrolle der Geschlechtsorgane stehen. — Zuerst bespricht der Verf. eine Anzahl Duftdrüsen einiger Säuger (Meerschweinchen, Kaninchen, Schaf), auf deren Ausbildung ein Einfluß der Geschlechtsdrüse nachgewiesen werden konnte. Überdies konnte gezeigt werden, daß gleichzeitig mit der durch die Kastration hervorgerufenen Rückbildung dieser Duftorgane auch eine solche der Drüsen Schleimhaut der Nase und der Nasenschnecken Hand in Hand ging. Wenn in diesen Fällen auch keine Rückbildung des Riechepithels selbst konstatiert werden konnte, so doch die Tatsache, daß die in der Jugend kastrierten Meerschweinchen und Kaninchen später gegen Gerüche der normalen Tiere des anderen Geschlechtes indifferent waren und an ihnen nicht schnüffelten. Es ist aber bei den Kastraten nicht Anosmie vorhanden. Verf. meint, daß die Nasenschnecken die Bedingungen regeln, unter denen die mit Riechstoff beladene Luft das eigentliche Riechepithel erreicht, und daß die Änderungen der Drüsen Schleimhaut begleitet sind von feinen und wenig merklichen Veränderungen des Riechepithels selbst. Das Annexorgan (Drüsen Schleimhaut) ist hier nur ein augenfälliges Zeugnis dafür, daß auch das Sinnesorgan sich verändert hat. — Ein weiteres Beispiel betrifft die Sehphäre der Vögel. Die Hühnervögel zeigen auffällige Färbungen von fleischigen Membranen (Kamm und periokuläre Region) und des Gefieders. Bei diesen Tieren sind interessante Tatsachen hervorzuheben: Einerseits, wenn die sexuellen Färbungen die höchste Entwicklung erreichen, treten auch sexuelle Änderungen des Auges auf (Gold- und Weißfärbung der Iris beim Männchen eines Fasans [Thaumalea]). Andererseits zeigt das Auge bei kastrierten Hähnen eine schwer zu charakterisierende, aber erkennbare Änderung. Diese Färbungen und Farbänderungen werden durch verschiedene Vascularisierung der Iris hervorgerufen. Diese Änderung betrifft natürlich vor allem das Aussehen des Auges und scheinbar kaum die Art und Weise, wie gesehen wird. Aber auch hier denkt der Verf. an eine gleichzeitige, wenig auffällige Veränderung der Retina. Zur Stütze dieser Ansicht führt er an, daß von den 2 Arten von in den Netzen vorhandenen gefärbten Lipoidkugeln (grünlich-gelb und granatfarben) das relative Zahlenverhältnis bei den Hähnen anders (1:5) als bei den Kapaunen (1:3) ist. — Als 3. Beispiel werden die Tritonen (Tr. alpestris) besprochen. Während die Tiere mit Ausnahme der Brunstperiode, wo sie Tagtiere sind, ein nächtliches Leben führen, sind seit 5—6 Jahren kastrierte Tiere niemals bei Tag aus ihren Verstecken herausgekommen. Regeneriert jedoch, wie das bei einigen Exemplaren der Fall war, die Hoden, so bilden sie die Hochzeitsfarben aus und gehen ins Licht und ins Wasser. Auch hier finden sich Unterschiede zwischen dem Auge des Männchens im Hochzeitsalter und dem des Kastraten. Das Kastratenauge ist kleiner und auch hier sind Farbungsunterschiede der Iris gegeben. Auch hier geht also Hand in Hand mit einer morphologischen Änderung des Sinnesorganes eine Änderung in der Reaktionsweise und wahrscheinlich auch eine physiologische Änderung des Sinnes. Ob all diese gleichförmigen Änderungen auf hormonale Beeinflussung durch die Geschlechtsdrüse zurückzuführen sind, konnte bisher nicht mit Sicherheit festgestellt werden. *Otto Storch.*

Maurer, Siegfried, and Loh Seng Tsai: Vitamin B deficiency and learning ability (Mangel an Vitamin B und Lernfähigkeit.) (*Otho S. A. Sprague Mem. Inst. a. Dep. of Path. a. Psychol., Univ. of Chicago, Chicago.*) *J. comp. Psychol.* **11**, 51— (1930).

Aus klinischen und experimentellen medizinischen Untersuchungen ist bekannt, daß Mangel an Vitamin B pathologische Veränderungen des Nervensystems herbeiführt. Es wurde die Wirkung der Entbehrung dieses Vitamins während der Saugperiode an der späteren Lernfähigkeit untersucht. 36 Ratten waren von Müttern gesäugt, die mit Nahrung ohne Vitamin B gefüttert wurden, so daß auch die Jungen davon wenig oder gar nichts erhielten. 36 normale Ratten desselben Stammes bildeten die Kontrollgruppe. Nach Beendigung des Milchsaugens erhielten beide Gruppen vitaminhaltiges Futter, vom 49. Tage ab aber beide Sures vitaminfreies Futter. Im Alter von 70 Tagen begann die Dressur in einem Labyrinth nach Carr. Die normalen Ratten erwiesen sich als doppelt so leistungsfähig als die vitaminarmen. Auch zeigten sich bei den letzteren die Lerndaten viel variabler. *Hempelmann (Leipzig).*

Tsai, Loh Seng, and Siegfried Maurer: „Right-handedness“ in white rats. (Rechtshändigkeit bei weißen Ratten.) (*Otho S. A. Sprague Mem. Inst. a. Dep. of Path. a. Psychol., Univ. of Chicago, Chicago.*) *Science (N. Y.)* **1930 II**, 436—438.

Nach statistischen Untersuchungen sind etwa 95% der Menschen rechtshändig, 5% linkshändig. Als Grund für die Bevorzugung der rechten Hand hat man angeführt die Gewohnheit, die soziale Überlieferung, die Kampfweise der primitiven Vorfahren der heutigen Menschen, die mit dem Schild in der Linken die links gedachte Herzgegend schützten, während die Rechte die Angriffswaffe bediente, und endlich die höhere Entwicklung der linken Hirnhälfte. Nur wenige Angaben liegen vor über Beobachtung von Tieren, vor allem Affen, hinsichtlich einer etwaigen Bevorzugung einer Extremität. Es wurden deshalb entsprechende Versuche mit weißen Ratten angestellt. Im Zentrum eines kreisrunden Drahtkäfigs wurde ihnen eine kleine Glasflasche mit Weizenkeimlingen dargeboten, deren Öffnung so eng war, daß das Tier gleichzeitig nur mit einer Pfote danach langen konnte. Da der Käfig und die Flaschenöffnung rund waren, gab die Situation keine Veranlassung, eine bestimmte Pfote zu gebrauchen. Mit jeder der 159 Ratten wurden 250, auf 5 Tage mit je 5 Serien verteilte Versuche angestellt. Jede Serie bestand in der Beobachtung von 10 aufeinanderfolgenden Pfotenbewegungen. Eine Ratte, die in 75—100% der Fälle die linke bzw. die rechte Pfote benutzte, wurde als linkshändig bzw. rechtshändig angesehen; Tiere, die in 50—74% der Fälle unregelmäßig bald die rechte, bald die linke Pfote gebrauchten, galten als beidhändig. 105 Individuen waren normale; 54 dagegen war während der Aufzucht durch die Mutter das Vitamin B entzogen worden. Von den normalen Ratten erwiesen sich als rechtshändig in Prozenten: Männchen 59, Weibchen 43, als linkshändig Männchen 26, Weibchen 37, als beidhändig Männchen 15, Weibchen 20. Bei Ausschluß der Beidhändigen sind das rechtshändig: Männchen 69%, Weibchen 54%, linkshändig: Männchen 31%, Weibchen 46%. Also ist die Mehrzahl der Ratten in beiden Geschlechtern rechtshändig. Nach Beobachtungen am Menschen nimmt in pathologischen Fällen die Linkshändigkeit zu. Damit stimmen die Resultate mit den des Vitamins B entbehrenden Ratten überein, bei welchen Tieren übrigens auch die Lernfähigkeit in Labyrinth herabgesetzt war. Es waren da bei Ausschluß der Beidhändigen rechtshändig: Männchen 50%, Weibchen 43%, linkshändig: Männchen 50%, Weibchen 57%. Es ergibt sich aus dem Vorhandensein der Bevorzugung einer Extremität bei diesen relativ niedrig stehenden Tieren, daß die Rechtshändigkeit des Menschen nicht ein Produkt der Intelligenz ist. Verf. stellte noch die Zeit fest, die nötig war, das Tier von der Methode des direkten Fressens mit dem Mund zu der Methode des Fressens von der Pfote in den Mund zu bringen; ferner die Zeit, die eine Ratte braucht, um in 1 Tag 50 aufeinanderfolgende Bewegungen mit der gleichen Pfote zu machen. Die Bevorzugung einer bestimmten Pfote war auch nach 1 Monat noch vorhanden. *Hempelmann (Leipzig).*

Kuo, Zing Yang: The genesis of the cat's responses to the rat. (Die Entwicklung Reaktionen der Katze auf Muriden.) (*Psychol. Laborat., Univ. of Chekiang, Hang-shu.*) J. comp. Psychol. **11**, 1—35 (1930).

Von jungen Katzen wurden 20 so aufgezogen, daß sie in keinerlei Berührung mit Ratten kamen, während andere 21 teils mit solchen zusammengehalten wurden, teils mit toten Ratten bekamen, wie andere Katzen mit der lebenden Beute verfahren, teils auf verschiedene andere Weise Bekanntschaft mit Ratten oder Mäusen machten. In zahlreichen sehr verschiedenartigen Versuchen wurden interessante Feststellungen gemacht. Töteten die mit Ratten zusammen im gleichen Käfig gehaltenen Katzen diese Geleichen nicht; von 18 töteten nur 3 Individuen fremde Ratten. Nach dem Anblick der Erbeutung von Muriden durch andere Katzen wurden 9 der Katzen selbst Ratten-Beute. Nach dem Verhalten der Katzen gegen Muriden ließen sich 6 Typen unterscheiden. Ebenso wurden die Reaktionen der Katzen gegen diese Tiere, soweit sie Käfiggenossen waren, in 5 Typen eingeteilt. Am Schlusse der Arbeit finden sich interessante Betrachtungen über die Art, wie der Behaviorismus derartige Probleme anzugreifen pflegt. Die vorliegenden Versuche haben gezeigt, daß man junge Katzen nach Belieben dazu erziehen kann, Muriden zu töten, zu lieben, zu hassen, zu fürchten oder mit ihnen zu spielen, je nach den Erfahrungen, die die betreffende Katze gemacht hat. Von diesem Standpunkte aus hat es keinen Sinn, zu sagen: die Katze hat den Instinkt, ihre Beute zu töten. Man könnte ebensogut sagen, es ist nichts natürlicher für die Katze, die Maus zu lieben. Alle diese Fähigkeiten sind in dem Tier vorhanden. Je nach den persönlichen Erfahrungen wird die eine oder die andere mehr zur Entwicklung gebracht.

Hempelmann (Leipzig).

Formwechsel.

Biologie der Fortpflanzung und Befruchtung. (*Erscheinungsformen der Sexualität, Paarung, Zeugung, Befruchtung, Brutpflege.*)

Cernosvitov, L.: Studien über die Spermaresorption. II. Tl. Die Samenresorption im männlichen Körper im allgemeinen. (*Zool. Inst., Univ. Prag.*) Zool. Jb. Abt. Anat. Ontog. **52**, 597—623 (1930).

In diesem 2. Teil seiner Arbeit stellt Verf. zusammen, was heute aus der Literatur über das Schicksal der nicht zur Befruchtung gelangenden männlichen Geschlechtszellen zu entnehmen ist. Die eigenen, an Oligochäten gewonnenen Ergebnisse werden gleichfalls herangezogen. Die Resorption von Spermatozoen im männlichen Organismus und nach der Kopulation im weiblichen Körper — bzw. in männlichen und weiblichen Organen bei Hermaphroditen — ist ein, in fast allen Tierklassen beobachteter, biologischer Prozeß. Es ergibt sich die Frage, ob nur eine Beseitigung der überlebenden Geschlechtszellen vorliegt, oder ob deren Abbauprodukte noch eine spezifische Rolle im Stoffwechsel spielen. Aus dem bis jetzt bekannten Tatsachenmaterial allowen Schlußfolgerungen zu ziehen, hält Verf. für verfrüht; da vor allem noch keine systematischen Untersuchungen vorliegen. Im Sinne einer Problemstellung werden drei Gesichtspunkte hervorgehoben: 1. die trophische Bedeutung der resorbierten Spermatozoen (Resorption im Darmkanal bei manchen Oligochäten und Turbellarien, auch bei Schlingentieren durch Sertolizellen usw., sowie durch Zellen des Embryos); 2. die Möglichkeit eines fermentativen Einflusses auf den Organismus, insbesondere bei den Vertebraten. (I. vgl. diese Ber. **16**, 206.)

Ilse Fischer (Leipzig).

Schwarz, T. von: Zur Biologie der Samenfäden im männlichen Geschlechtsapparat. *Monatsschr. Naturh. Ver. Leipzig* **1899**, 189—201.

Verf. untersuchte den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf reife Spermatozoen bei der Ratte. Im Hoden liegen die Samenzellen in einer physikalisch-chemischen Flüssigkeit (pH = 7,19—7,37). Ihre schwach alkalische Umgebung löst die Schlangelbewegung der Spermatozoen aus, welche aktiv durch den Nebenhoden und den Nebenhodenschweif wandern, wo sie

gespeichert werden. Die Epithelien des Ductus epididymis sondern ein Sekret verhältnismäßig hoher H-Ionenkonzentration ($p_H = 6,48-6,61$) ab. Seine Reaktion ist unabhängig von der Anwesenheit von Spermien, auch der nichtgefüllte Samen-speicher zeigt die gleiche Acidität. Dieses Nebenhodenschweifsekret wirkt lähmend auf die Spermienbewegung. Es ist stark gepuffert, und Verf. nimmt an, daß die Pufferung sich auch auf die Protoplasmakolloide der Spermien überträgt, wodurch sie widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse werden. Bei der Ejaculation wird die Bewegung der Spermatozoen wahrscheinlich durch das Prostatasekret ($p_H = 7,14$) wieder normalisiert. Bei anderen Tierarten, auch beim Menschen, muß nach Ansicht des Verf. auch der Einfluß des Samenblasensekretes berücksichtigt werden. — Die Acidität des akzessorischen Geschlechtsapparates ist unabhängig vom Funktionszustand des Keimepithels, sie ist nämlich bei jungen und geschlechtsreifen Ratten die gleiche; sie ist aber bedingt durch die Anwesenheit von Geschlechtszellen im Körper. Bei doppelseitig kastrierten Ratten fand Verf. bezüglich der H-Ionenkonzentration keinen Unterschied zwischen Nebenhodenschweif-, Prostata- und Samenblasensekret. Die Sekrete waren mit einem p_H -Wert von 7,27—7,45 auf den Wasserstoffionenspiegel des Blutes eingestellt. Bei einseitiger Kastration blieb wirkungslos. — Abgelehnt wird die Ansicht von Brauer und Redenz, nach der die H-Ionenkonzentration im Nebenhodengang durch die Atmung der Spermien selbst gesteigert werden soll, sowie die Vorstellung, daß eine der Ejaculation vorausgehende Zirkulationssteigerung in den Blutgefäßen durch Herabsetzung der CO_2 -Spannung eine Verminderung der H-Ionenkonzentration im akzessorischen Geschlechtsapparat bewirke. *Ilse Fischer (Leipzig)*

Schmidt, Herbert: Geschlechtsumwandlung bei tropischen Zierfischen. Züchter-Zeitung 297—305 (1930).

Die Geschlechtsumwandlung von tropischen Zierfischen wird nicht wie bisher in Gesellschaftsaquarien, sondern an einzelnen Tieren in Einzelzuchten systematisch verfolgt, die einzelnen Phasen der Umwandlung werden studiert und im Aquarium festgehalten. Die Geschlechtsumwandlung ist an kein bestimmtes Alter gebunden, ♀♀ jeglichen Alters und Größe können sie zeigen. In normalen Bruten von *Xiphophorus helleri* ist im Pubertätsalter das Verhältnis ♂♂:♀♀ ungefähr 50:50; später werden in den verschiedenen Zuchten verschiedene zahlenreiche ♀♀ zu ♂♂, wodurch das Geschlechtsverhältnis stark nach der männlichen Seite verschoben wird. Die Umwandlung erfolgt allmählich und beginnt häufig schon zu einer Zeit, wo das ♀ noch geschlechtstätig ist. Die umbildenden Tiere sind während dieser Zeit freßunlustig und gegen jede Schädigung sehr empfindlich. Später erholen sie sich und sind, wenn umgebildet, nur an ihrer Größe von den ursprünglichen ♂♂ leicht zu unterscheiden. Die umgewandelten Fische kopulieren, und ihre Nachkommenschaft mit normalen Tieren enthält sowohl ♂♂ wie ♀♀, letztere in etwas höherer Anzahl, woraus geschlossen werden darf, daß das ♀ das heterocygote Geschlecht ist. Völlig bewiesen wird diese Annahme noch nicht. Bei Bastarden von *Xiphophorus* mit *Platypoecilus* kommen ebenfalls Geschlechtsumwandlungen vor, außerdem treten hier sog. „Intersexe“ auf, die Väter aber wegen ihrer verkümmerten Hoden als „steckengebliebene Männchen“ angesehen werden. Geschlechtsumstimmungen zeigen auch die ♀♀ von *Mollienisia velifera* und *Terandria formosa*, die ganz ähnlich wie bei *Xiphophorus* verläuft. Neu sind die Beobachtungen über Geschlechtsumwandlungen bei den Labyrinthfischen *Betta splendens*, *Macropodus viridi-auratus* und *Trichogaster labiosus*. Interessant ist hier, daß die umgewandelten ♀♀ als ♂♂ meist erst bei der 2. Brut, bei der der Vater sind, den dem ♂ eigenen Trieb zeigen, ein Schaumnest zu bauen und dieses bewachen.

Scheuring (München)

Deraniyagala, P. E. P.: Notes on the breeding habit of the eel *Leiuranus semicinctus*. (Beobachtungen über das Laichen des Aales *Leiuranus semicinctus*.) Spang Zeylan. (Colombo) 16, 107 (1930).

Eben gefangene *Leiuranus* wurden am 25. Februar 1929 in ein Becken gesetzt.

Männchen faßte ein Weibchen mit dem Maul am Hinterkopf und hielt trotz Versuche stören 10 Stunden lang fest (vom Abend bis zum Morgen). Am Morgen waren Tiere wohl infolge Sauerstoffmangels des Wassers etwas matt. Das vorübergehend genommene Männchen faßte sofort wieder den Bauch des Weibchens und blieb Bauch nach oben gekehrt, wiederum 1 Stunde in dieser Stellung. Als es mit der weggenommen wurde, ließ es eine dicke Spermatheca und hatte weiter keine Eizelle mehr für das Weibchen. Letzterem konnten weißliche, mit Ölkugeln versehene Eier abgedrückt werden. Ein spontanes Laichen des Pärchens wurde nicht beobachtet.

Scheuring (München).

Fontaine: Modifications du milieu intérieur des poissons potamotiques au cours de la reproduction. (Innere Veränderungen bei Flußfischen im Verlaufe der Fortpflanzung.) C. r. Acad. Sci. Paris **191**, 736—737 (1930).

Untersucht werden der Maifisch (*Clupea alosa*) und das Meerneunauge (*Petromyzon marinus*). Die Untersuchung erfolgte beim Aufstieg in die Flüsse, d. h. also am Beginn der Fortpflanzungszeit, und nach Beendigung der Laichzeit. Die Feststellungen beziehen sich auf die Veränderungen des osmotischen Druckes des Blutes während der Fortpflanzung und auf die Veränderungen im Cl-Gehalt. Die Ergebnisse sind in einer kurzen Zusammenfassung gegeben und daneben sind einige zahlenmäßige Übersichten über die beobachteten Veränderungen angeführt.

Schnakenbeck (Hamburg).

Houssay, B. A., und L. Giusti: Sexualfunktion, Hypophyse und Hypothalamus bei der Kröte. (*Inst. de Fisiol., Fac. de Cienc. Méd., Buenos Aires.*) Rev. Soc. argent. **6**, 146—163 (1930) [Spanisch].

Wie schon früher nachgewiesen wurde, hat Einpflanzung des drüsigen Teils der Hypophyse anregende Wirkung auf den Hoden und erotisiert die männliche Kröte, d. h. nach Kauterisation der Infundibulargegend. Während Follikelextrakt keine anregende Wirkung auf die männliche Kröte ausübt, tritt diese durch Injektion großer Mengen von Hodenextrakt ein. Verletzung der Infundibulargegend ruft Umklammerreflex bei der männlichen Kröte hervor, unabhängig von Hypophyse und Hoden. Einpflanzung des drüsigen Teils der Hypophyse bewirkt Ausstoßen des Ovulum; am stärksten ist das bei *Bufo arenarum*, geringer bei *Bufo d'Orbigny*, am geringsten bei *Leptodactylus ocellatus*. Der alkalische Extrakt des Vorderlappens vom Rind hat in mehreren Fällen unvollständige Ovulation bei der Kröte zur Folge. Exstirpation der Hypophyse oder ihres drüsigen Teils, mit oder ohne gleichzeitige Kauterisation der Infundibulargegend, bewirken weder Ovulation noch Austreibung des Ovulum. Diese Ergebnisse werden aber erzielt 1. durch Kauterisation des Infundibulum bei intakter Hypophyse oder Entfernung des mittleren Drüsenlappens; 2. durch Exstirpation des vorderen Drüsenlappens ohne Läsion des Tuber; 3. Exstirpation des Zwischenlappens oder Zurücklassung des verlagerten Drüsenlappens. Verletzung der Infundibulargegend bewirkt Sekretion oder Wiederaufnahme des Sekrets des Drüsenlappens der Hypophyse und ist Ursache der Ausstoßung des Ovulum; dabei spielt die Hirnfunktion eine Rolle.

Maas (Berlin).^{oo}

Đostimirović, Demetrius: Weitere Mitteilungen über das Ergebnis der experimentellen Hyperfeminierung. (II. vorl. Mitt.) (*Morphol.-Biol. Inst., Univ. Zagreb u. Path. Biol. Inst. München.*) Biol. Zbl. **50**, 599—608 (1930).

Es wird kurz über ihre Wirkung vor, während und nach der Begattung berichtet. Bei lechtsreifen weiblichen Mäusen wird „Follikulin-Menhormon“ (0,1—2,0 Mäuseeinheiten) täglich unter die Haut gespritzt. Ein Teil der Mäuse erhält es schon 5 bis 10 Tage vor der Begattung, ein anderer Teil von der Begattung an, ein weiterer Teil erst am 11. oder 12. Tage der Schwangerschaft an. Diese erhalten bis zu 20 Mäuseeinheiten täglich. Nur diese werfen Junge. Die anderen Weibchen, mit Ausnahme eines, werfen trotz obgleich der Scheidenpfropf, ein Beweis der stattgehabten Begattung, ausgebildete Früh- und Spätaborte kamen nicht in Frage. Von den 9 Jungen, die eine Maus aus einer Versuchsserie zur Welt gebracht hatte, waren 7 Männchen und 2 Weibchen.

Ihr Gewicht, ihre Geschlechtsdrüsen und -organe zeigten nichts Abweichendes, irgendwie im Sinne einer Verschiebung des Geschlechtes gedeutet werden können (Vgl. diese Ber. 10, 839.) Wagner (Kowno)

Knaus, Hermann: Zur Physiologie des Corpus luteum. III. Mitt. (Univ.-Frauenk., Graz.) Arch. Gynäk. 141, 374—394 (1930).

Mit Hilfe der Pituitrinprobe (I. vgl. diese Ber. 14, 77; II. vgl. diese Ber. 15, wurde festgestellt, daß in der Scheinschwangerschaft des Kaninchens die Funktion Corpus luteum (C. l.), beurteilt nach dem Einfluß auf die Uterusmuskulatur, mit 16. Tag post copulationem ein plötzliches Ende findet. Dagegen hält diese Funktion der echten Gravidität zumindest über den 17. Tag oder noch länger an, um frühestens 18. Tag in ein Stadium gerade angedeuteter sekretorischer Insuffizienz zu treten, welches ziemlich unverändert bis zum 29. Tag der Gravidität andauert. Erst von diesem Tage ab die Sekretion des C. l. immer mehr nach, um mit dem Eintritt der Geburt (32. Tag) zu verlöschen. Auch im Einfluß auf die Uterusschleimhaut offenbart sich deutlich funktionelle Unterschied zwischen dem C. l. der Scheinschwangerschaft (C. l. spurium) dem C. l. der wirklichen Schwangerschaft (C. l. graviditatis): während im 1. Fall die Mutationen 10. Tag an Degenerationerscheinungen erkennen läßt, die am 17. Tag zur vollen Lösung aller deciduellen Bildungen führen, beginnen im 2. Fall Degenerationerscheinungen größeren Umfanges erst am 22. Tag; sie werden in den folgenden Tagen immer deutlicher und erreichen bereits in den letzten Tagen vor der Geburt ein Gepräge, welches nunmehr schnelles Verwelken des C. l. anzeigt. Auch an den Milchdrüsen ist der Unterschied zwischen dem C. l. der Schein- und der wirklichen Schwangerschaft deutlich zu erkennen: in der ersten finden die Proliferationsvorgänge am 16. Tag ihr Ende und die Drüsenschläuche füllen am 18. Tag mit Milch, während in der echten Gravidität das ungehemmte Wachstum der Milchdrüsen erst in den letzten Tagen vor der Geburt seinen Stillstand findet, worauf am 32. Tag die Drüsengänge sich prall mit Milch füllen. Der Unterschied in der Entwicklung der Milchdrüsen ist vom 10. Tag ab festzustellen; er weist auch hier wieder auf einen verstärkten Einfluß, d. h. eine verstärkte Sekretion des C. l. graviditatis gegenüber dem C. l. spurium der Scheinschwangerschaft hin. Voss (Mannheim)

Knaus, Hermann: Zur Physiologie des Corpus luteum. IV. Mitt. (Univ.-Frauenk., Graz.) Arch. Gynäk. 141, 395—403 (1930).

An einem ausgewachsenen Kaninchen wird durch einseitige Tubensterilisation die Möglichkeit zu einseitiger Schwangerschaft geschaffen; man kann dann unter Schonung der Ovarien und des sterilisierten Hornes das tragende Horn exstirpieren und so mit zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft den Einfluß der Eier auf die Corpus luteum (C. l.) ausschalten. Wie sich diese Wegnahme der Eier auf die C. l. auswirken kann nachfolgend an der Pituitrinempfindlichkeit des zurückgebliebenen sterilen Uterus hornes ermittelt werden (s. Mitt. I, II, III). Aus diesen Exstirpationsversuchen, die zu verschiedenen Zeitpunkten vom Anfang des 15. Tages und bis zu 14 Stunden vor Beginn des 17. Tages der Schwangerschaft ausgeführt wurden, kann mit großer Sicherheit geschlossen werden, daß der hormonale Impuls, der vom Ei auf das C. l. und von dort auf den Uterus geht, erst nach mehr als 30 Stunden an seinem Erfolgsorgan anlangt. Innerhalb dieser Zeit bedingt demnach der Wegfall des C. l.-erhaltenden Faktors, der vom Ei ausgeht, Degenerationen in den Luteinzellen, welche nach Ablauf von rund 24 Stunden zur vollen Erschöpfung der Funktion des C. l. in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft führen. Da die Hormone des Eies, und zwar wahrscheinlich jene der Placenta, wird das C. l. spurium zum C. l. graviditatis, umgekehrt kann durch die Fortnahme der Eier das C. l. graviditatis in ein C. l. spurium rückverwandelt werden. Voss (Mannheim)

Kok, Fr.: Über das funktionelle Verhalten der zurückgelassenen Eierstöcke nach operativer Entfernung der Gebärmutter. (Mit experimentellen Untersuchungen.) (Univ.-Frauenk., Halle a. S.) Arch. Gynäk. 141, 255—272 (1930).

Der normale Scheidencyclus der Maus leidet nach Entfernung der Gebärmutter erhebliche Störungen; nach der Ansicht des Verf. sind diese aber nicht durch die Uterusexstirpation als solche bedingt, sondern sie sind als Reaktionen auf Reize aufzufassen, die durch die operative Maßnahmen im Bereiche der Unterleibsorgane ausgelöst werden. Selbst bei völligem Fehlen des Uterus kann es jedoch zu einem völlig normalen Scheidencyclus kommen; die Entfernung der Gebärmutter hat demnach keinen Einfluß auf die Funktion der Ovarien. Diese Untersuchungen brachten Ergebnisse, die im Gegensatz zu manchen experimentellen Ergebnissen anderer Autoren stehen. Die Ansicht Pankows scheint zu Recht zu bestehen, daß der Uterus eine besondere innere Sekretion

itzt, daß es sich bei den Störungen nach Uterusexstirpation auch um echte Ausfallscheinungen handelt, daß diese aber nicht in Abhängigkeit stehen von den Ovarien.

P. Klein (Prag)._o

Dychno, M. A., und N. E. Sidorow: Ein Versuch zur experimentellen Klärung Einflusses physischer Ermüdung auf die Sexualsphäre der Tiere. (*Geburtsh.-äkol. Klin., Staatl. Lenin-Inst. f. Äztl. Fortbildung, Kasan.*) Arch. Gynäk. **141**, —632 (1930).

Die experimentellen Versuche wurden an Mäusen durchgeführt. Es zeigt sich, übermäßige physische Arbeitsleistung und Belastung des Körpers der Jungtiere in der Periode der geschlechtlichen Reifung besonders schädlich sind. Die Schädlichkeiten äußern sich je nach der körperlichen Verfassung graduell verschieden der Hemmung in der gesamten physischen Entwicklung bis zum völligen Zusammenbruch des Organismus und Exitus letalis. Als Teil des Körpers bleibt auch die Genitalorgane von den regressiven Veränderungen durch die übermäßige Arbeitsbelastung des Organismus nicht verschont. Infantilismus der Genitalorgane, Verzögerung des Eintrittes, Cylusstörungen der Uterusschleimhaut sind der Ausdruck für die Schädigungen.

Otto Herschan (Breslau)._o

Physiologie der Entwicklung, Wachstum. (*Entwicklungsmechanik, Embryophysiologie, embryonales Wachstum, larvales Leben, Metamorphose, Regulationen, Mißbildungen.*)

Kessler, Ernst von: Der Pollen von *Solanum tuberosum* L., seine Keimfähigkeit und das Wachstum der Pollenschläuche. Angew. Bot. **12**, 362—418 (1930).

Die morphologische Untersuchung des Kartoffelpollens ergab, daß die meist sehr regelmäßig kantigen und faltigen Pollenkörner der Kulturkartoffel ebenso gut keimen können, wie die glatten und rundovalen. Es ist unmöglich, aus dem Aussehen der Pollenkörner Rückschlüsse auf ihre Keimfähigkeit zu ziehen. Von weiteren morphologischen Merkmalen kann nur auffallend grobe Granulation als sicheres Anzeichen für Sterilität gelten. Die meist in mehr oder weniger großer Zahl in jeder Blüte vorhandenen sterilen Pollenkörner lassen sich äußerlich nicht von den fertilen unterscheiden, wohl aber durch Behandlung mit salzsaurem Carmin. Die fertilen färben sich deutlich rot, während die sterilen keinen Farbstoff aufnehmen. Die Untersuchung der Keimungsbedingungen ergibt als günstigsten synthetischen Nährboden einen Saccharose-Diastase-Nährboden. Während das Licht unwesentlich für die Keimung des Pollens ist, hat die Temperatur große Bedeutung: Minimum $+8^{\circ}$, Optimum $+26^{\circ}$, Maximum $+35^{\circ}$. Als maximales Keimprozent wurde 46,9% erzielt. Für die Aufbewahrung von Kartoffelpollen ist eine relative Feuchtigkeit von 50% am günstigsten, aber auch dann beträgt die Lebensdauer maximal nur 10 Tage. Die Keimungsenergie läßt nach der Öffnung der Antheren sehr schnell nach, merklich bereits nach 48 Stunden. Wie für Pollenschläuche im allgemeinen nachgewiesen, werden auch bei *Solanum tuberosum* Callosepfropfen ausgebildet, der erste etwa 250μ vom ursprünglichen Pollenkorn entfernt. Die weiteren anatomischen Untersuchungen beschäftigen sich mit den Keimungs- und Wachstumsverhältnissen des Pollens auf der Narbe und im Griffelröhren. Ohne auf alle Einzelheiten eingehen zu können sei erwähnt, daß der Pollenschlauch auch intercellular wächst. Die verschiedenen geprüften Kartoffelsorten unterscheiden sich nach Keimung des Pollens und Wachstum des Pollenschlauches folgendermaßen: 1. „Keimfähiger Pollen liegt auf der Narbe ohne zu keimen.“ 2. „Pollen keimt auf der Narbe, treibt aber seinen Pollenschlauch nicht in das Narbengewebe.“ 3. „Pollenschlauch wächst in das Narbengewebe, aber endigt in ihm bzw. im ersten Drittel des Griffels blind.“ 4. „Pollenschlauch wächst zur Samenanlage.“ Wenn auch der Pollenschlauch in die Samenanlage eindringt, so braucht damit noch kein Fruchtsatz zustande zu sein. Aus dem Nichtkeimen von Kartoffelpollen in vitro läßt sich

kein Schluß ziehen auf das Verhalten in vivo. Keimfähigkeit in vitro ist andererseits maßgebend für Keimfähigkeit in vivo und für sein Vordringen bis zur Samenanlage.

A. Th. Czaja (Berlin-Dahlem).

Modilewski, J.: Neue Beiträge zur Polyembryonie von *Allium odorum*. Ber. dtsch. bot. Ges. 48, 285—294 (1930).

Verf. suchte vor allem durch neue Kastrationsversuche den noch strittigen Frage näher zu kommen. Die Kastration wurde — nach Entfernung aller geöffneten und aller noch ziemlich jungen Blüten — in dreierlei Weise vorgenommen: 1. durch Entfernung der noch geschlossenen Staubbeutel; 2. durch Entfernung der Staubbeutel und Griffel; 3. durch Entfernen der Staubbeutel, Griffel und oberen Teile der Perigonblätter. Diese Versuche zeigten zunächst zweierlei: 1. daß zwar etwa vom 5. Tag nach der Kastration an gewöhnlich schon zwei- oder dreizellige Ei- und Antipodenembryonen auftraten; 2. daß aber solche kastrierte Fruchtknoten nie zur Reife gelangen konnten, sondern daß die Samenanlagen etwa nach 14 Tagen die ersten Degenerationsanzeichen aufwiesen. Die jungen Embryonen unterscheiden sich von den durch normale Befruchtung entstandenen äußerlich zunächst in nichts, dagegen kommt es in solchen unbefruchteten Embryosäcken niemals zur Endospermibildung. Diese Beobachtungen führten weiterhin zu der Feststellung, daß bei *Allium odorum* überhaupt normalerweise zweierlei Typen von Embryosackentwicklung auftreten: Dadurch erklären sich auch die früheren Beobachtungen des Verf., daß gelegentlich die Verschmelzung der Polkerne verzögert werde, sowie eine Anzahl sonstiger Anomalien (Auftreten überflüssiger Polkerne, Vergrößerung der Zahl der Antipoden usw.). Die Degenerationserscheinungen in solchen Fruchtknoten greift die Embryonen zuletzt an: die Kastration unterbindet also nicht die Entstehung der verschiedenartigen Embryonen und die Befruchtung ist demgemäß auch nicht der unentbehrliche Anstoß zu deren Entwicklung, wie Verf. dies früher angenommen hatte. Wohl aber ist die Embryobildung verschieden 1. durch das Ausbleiben der Endospermibildung und 2. durch den Zustand des Plasmas, welches die Endospermkerne umgibt. Das Ausbleiben der Endospermibildung scheint die Bildung derjenigen spezifischen Stoffe zu unterbinden, welche „die korrelative Stimulierung der Samen- und Fruchtbildung regulieren“. Anschließend an diese Kastrationsversuche wurden nun auch die Kernverhältnisse einer erneuten Untersuchung unterworfen: diese ergaben 2 Typen von Kernteilungen in den Embryosackmutterzellen, so daß es also normale haploide oder diploide Embryosäcke gibt. Die Embryobildung kann wahrscheinlich auf viererlei Weise vor sich gehen: 1. aus haploiden Eizellen nach der normalen „doppelten“ Befruchtung im haploiden Embryosack; 2. aus diploiden Eizellen nach Befruchtung nur der Polkerne mit wahrscheinlicher Samenreife; 3. aus der diploiden Eizelle parthenogenetisch mit gleichzeitiger Degeneration der Polkerne und mit folgender Verkümmern der Samenanlage; 4. aus der haploiden Eizelle parthenogenetisch ebenso mit darauf folgender Degeneration. Unentschieden bleiben hierbei die Fragen: 1. ob die Embryonen solcher Samen keimfähig sind, wo durch Befruchtung ein normales Endosperm entsteht, während Eizelle und Antipode sich unabhängig vom 2. männlichen generativen Kern weiter entwickeln. 2. Wie die Chromosomenzahl solcher aus diploiden Embryosäcken stammenden Endospermkerne ist. In diesem Zusammenhang wird jedoch auf einen analogen Fall bei *Zephyranthes* hingewiesen, wo normale Endospermibildung bei somatisch parthenogenetischer Embryoentwicklung vorkommt und Endospermkerne mit pentaploider Chromosomenzahl beschrieben sind.

E. Esenbeck (München).

Leach, W.: Note on the effect of growing mosses in a moisture-saturated atmosphere, and under conditions of darkness. (Über das Wachstum der Moose in feuchtigkeitsgesättigter Atmosphäre und bei Dunkelheit.) New Phytologist 29, 276—284 (1930).

Geschildert sind: Änderungen in der Struktur verschiedener Moose, die dunkel und in feuchtigkeitsgesättigter Atmosphäre kultiviert wurden, ferner die Reduktion der Blattgröße, besonders bei den pleurokarpn Moosen, und die Hemmung bei der

ifferenzierung der Blattzellen. Weiter ist erwähnt die Reduktion des Durchmessers und der Anzahl der Zellen im Stamm. Verf. weist ferner darauf hin, daß bei seinen Kulturversuchen die äußeren Zellen bei den verschiedenen Arten einer Gattung stets von einer bestimmten festen Länge seien.

Bergdolt (München).

● Goebel, K., und W. Sandt: Untersuchungen an Luftwurzeln. (Botan. Abh. Hrsg. v. Goebel. H. 17.) Jena: Gustav Fischer 1930. 124 S., 6 Taf. u. 9 Abb. RM. 12.—.

Es galt zu prüfen, wie weit sich die bei so vielen Tropenpflanzen vorhandenen Luftwurzeln durch gemeinsame Eigenschaften auszeichnen und ob diese Eigenschaften sich beim Eindringen in den Boden ändern. Die Hauptaufgabe der Luftwurzeln ist die der Versorgung der Pflanze mit Nährsalzen und Wasser zu suchen. Bei diesen Stützwurzeln sind 2 Lebensabschnitte zu unterscheiden, die Zeitspanne ihres Luftlebens und ihre Bodenphase. Die Untersuchungen wurden mehrere Jahre hindurch in den Gewächshäusern des Münchener botanischen Gartens durchgeführt. Versuchspflanzen waren: *Vitis pterophora*, *Luffa cylindrica*, *Cissus quadrangularis*, *Cissus alutinus*, *Vanilla planifolia*, *Norantea guyanensis*, *Syngonium podophyllum*, *Philodendron pinnatifidum*, sowie *Philodendron Selloum*, *Phil. elegans* und *Phil. imbricatum*. Die Luftwurzeln zeigen ein außergewöhnlich schnelles Längenwachstum von mehreren Zentimetern (1,2 — über 23 cm) täglich, auch die Wachstumszone ist wesentlich größer (bis über 55 cm) als bei Erdwurzeln (einige Millimeter). Temperatur und Luftfeuchtigkeit scheinen das Wachstum stark zu beeinflussen. Nächste Aufgabe war die Untersuchung der Änderungen im Wachstum der Luftwurzeln beim Eintritt in den Boden. Zu diesem Zweck wurden die vorher beobachteten und markierten Wurzeln entweder ausgegraben oder an der Glaswand Sachscher Wurzelkästen beobachtet. Fast stets wurde eine starke Herabminderung des Längenwachstums beobachtet, verbunden mit einer Verkürzung der Wachstumszone. Vermutlich wird diese Hemmung nicht nur sehr durch den mechanischen Widerstand der Bodenteilchen als durch den Wassergehalt des Bodens bedingt. Kamen die Wurzeln wieder in Luft, so steigerte sich ihr Wachstum bald. Ganz in Wasser geleitet, trat völlige Wachstumshemmung, Bildung von Nebenwurzeln und nach einigen Tagen Fäulnis ein. Nachgebildete Ersatzwurzeln paßten sich dann dem Wasser besser an. Kalkgehalt scheint den schädlichen Einfluß des plötzlichen Überganges vom Luft- zum Wasserleben zu mildern. Die Luftwurzeln verhalten sich zur Schwerkraft ganz verschieden, selbst innerhalb einer Familie; manche sind sehr stark geotropisch, manche gar nicht. In die Erde geleitet wird bei allen Luftwurzeln Geotropismus bemerkbar. Sie wachsen nicht senkrecht, sondern schräg, meist um 30—60° abwärts; es ist zu bedenken, daß wir es mit stammbürtigen Seitenwurzeln zu tun haben, die auch bei Erdwurzeln plagiotropisch sind. Die an diesen Wurzeln in Erde oder Wasser entstandenen weiteren Seitenwurzeln sind ageotropisch. Der Ort ihrer Entstehung dagegen wird durch die Schwerkraft beeinflusst; denn sie entstehen an horizontal streichenden Wurzeln nur an der Unterseite. Bei intakten Wurzelspitzen tritt bis zum Erreichen des Bodens keine Verzweigung der Wurzel auf; die Fähigkeit, nach Verletzung Ersatzwurzeln zu bilden, haben aber alle untersuchten Luftwurzeln. Die am Erdboden angelangte Luftwurzel streicht erst ein kurzes Stückchen horizontal, befestigt sich durch auftretende Wurzelhaare, um dann schräg in den Boden einzudringen. Die Wurzelspitze wird dabei länglicher. Auch verzweigen sich die in den Boden eingedrungenen Wurzeln. In einem Schlußabsatz wird, unterstützt durch 42 Abbildungen, die Anatomie der Luftwurzeln während ihrer Luftphase und während ihres Bodenlebens geschildert, dabei werden vorliegende Untersuchungen anderer Forscher (z. B. eingehend Porsch bei *Philodendron*) gewürdigt und ergänzt.

Sartorius (Mussbach).

Ashbel, R.: Sul ricambio gassoso delle uova di bachi da seta (*Bombyx mori* L.). Über den Gaswechsel bei den Eiern des Seidenspanners [*Bombyx mori* L.] (Staz. V., Napoli.) *Protoplasma* (Berl.) 11, 97—117 (1930).

Der Sauerstoffverbrauch wurde manometrisch nach Warburg gemessen. Bei

den unbefruchteten Eiern ist der Sauerstoffverbrauch nicht meßbar groß. Nach der Befruchtung wird der Sauerstoffverbrauch gesteigert. Es tritt eine Atmungserhöhung in den ersten Tagen der Entwicklung ein. In der Fortsetzung findet man bei verschiedenen Rassen Verschiedenheiten. Es gibt sog. univoltine Rassen, bei denen die Eiablage nur einmal im Jahr stattfindet. Hier tritt nach 4—5 Tagen zugleich mit einem Stillstand der Entwicklung eine Herabsetzung des Sauerstoffverbrauches ein. Bei den bivoltinen Rassen tritt bei der Eiablage im Frühling weder eine Hemmung der Atmung noch der Entwicklung ein. Am Tage des Ausschlüpfens der Larve ist der Sauerstoffverbrauch 20mal größer als am 1. Tage der Entwicklung. Bei der 2. Abgabe der bivoltinen Rassen ist der Vorgang beim Gasaustausch beinahe analog dem bei den univoltinen. Es wird nachgewiesen, daß Ammoniak während der Ruheperiode der Eier produziert wird.

J. Runnström (Stockholm).

Wintrebert, P.: Analyse de développement de *Discoglossus pictus* Otth. par procédé des marques colorées. La position dans l'œuf des territoires invaginés. (Analyse der Entwicklung von *Discoglossus pictus* mittels Farbmarken. Die Lage der eingestülpten Territorien im Ei.) (*Laborat. d'Anat. et d'Histol. Comp., Sorbonne, Paris*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1234—1238 (1930).

Verf. hat die Vogtsche Vitalfärbungsmethode bei *Discoglossus* angewandt und gibt an Hand schematischer Skizzen die Topographie der einzelnen Anlagezonen auf der Oberfläche junger Keime wieder. Beträchtlich ist zum Unterschied von Bombinator der Eintransport der ventralen Dottermasse in den Blastoporus, andererseits dringen die dorsalen Entodermzonen, welche die prächordale Platte liefern, weniger tief hinein. Verf. nimmt an, daß alle Gewebe, die sich bei *Discoglossus* von den Urmundlippen ableiten, mesodermaler Natur sind.

W. Brandt (Köln).

Lasell, J., et P. Wintrebert: Analyse du développement de *Discoglossus pictus* Otth. par le procédé des marques colorées. Le développement de l'ectoderme à la surface de l'œuf. (Analyse der Entwicklung von *Discoglossus pictus* mittels Farbmarken. Die Entwicklung des Ektoderms auf der Oberfläche des Eies.) (*Laborat. d'Anat. et d'Histol. Comp., Sorbonne, Paris*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1229—1234 (1930).

Die Arbeit enthält nochmals eine ausführlichere Beschreibung der Zonenverteilung der Epidermis beim Ei.

W. Brandt (Köln).

Pincus, Gregory: Observations on the living eggs of the rabbit. (Beobachtungen an lebenden Eiern des Kaninchens.) (*Inst. of Animal Nutrit., School of Agricult., University of Strangeways Research Laborat., Cambridge*) Proc. roy. Soc. Lond. B **107**, 132—140 (1930).

Die Eier wurden dadurch gewonnen, daß bestimmte Zeit nach der Begattung die Tuben mit Paunnett-Comptonscher Lösung durchspült wurden, und zwar 11 bis 16 Stunden p. c. vom Uterus aus, später vom Ostium abdominale tubae. Das Mesovarium muß hierbei abgeschnitten werden, damit das Organ gestreckt ist. Zur Züchtung der Eier in vitro wurde gewöhnlich Kaninchenplasma und Hühnerembryonalextrakt von 7—8 Tage alten Embryonen verwendet. Da die Ovulation 10 Stunden p. c. eintritt, konnten genaue Daten festgelegt werden. Bei Begattung der Kaninchen mit vasektomierten Böcken sieht man die unbefruchteten Eier im oberen Teil der Tube in einem Haufen zusammenliegen, jedes umgeben von den Zellen des Cumulus oophorus. Sie bleiben hier bis zum 17. Tage nach der Kohabitation liegen, um sich dann allmählich voneinander zu trennen. 20 Stunden p. c. sind alle unbefruchteten Eier isoliert und von einer dünnen Eiweißhülle umgeben, die dann bei der weiteren Wanderung in der Tube noch wesentlich dicker wird. 72—96 Stunden p. c. liegen die Eier im Uterus, wo sie allmählich zugrunde gehen. Meist wurde an den Eiern nur das Einzellenstadium beobachtet, nur selten trat Fragmentation ein. Spermaököpfe wurden bei solchen Eiern niemals in der Zona pellucida gefunden. Eier, die nach einer Kohabitation mit normalen Böcken untersucht wurden, waren zunächst auch von Zellen des Cumulus umgeben.

sich jedoch schon 1—1½ Stunden nach der Ovulation ablösen, wahrscheinlich durch den Einfluß der Spermatozoen. 14 Stunden p. c. oder 4 Stunden nach der Ovulation sind sämtliche Eier frei von umgebenden Zellen, wobei der Samenfaden eindringt. 24 Stunden p. c. ist das 2. Polkörperchen gebildet und nach weiteren 4 Stunden kann man die 1. Teilung des befruchteten Eies beobachten. Von den Eiern, die 11—12 Stunden nach der Kohabitation der Tube entnommen werden, teilen sich nur wenige in Kultur, 14 Stunden p. c. dagegen fast alle, d. h. die Befruchtung findet von der 12. bis 13. Stunde p. c. ab statt. Nimmt man befruchtete Eier im Einzellenstadium, sieht man diese sich in vitro fast alle durchteilen, wobei sie bis zum Morulastadium gelangen. Ob sich durch weitere technische Verbesserungen die Entwicklung weiterführen läßt, muß neuen Untersuchungen überlassen bleiben. Nimmt man unbefruchtete Eier und züchtet sie in vitro weiter, so teilt sich über 60% ziemlich regelmäßig, so daß daraus eine parthenogenetische Entwicklung gefolgt werden kann. Dies ist besonders deshalb auffällig, weil solche unbefruchteten Eier in der Tube und im Uterus des Tierkörpers nur selten Teilungserscheinungen aufweisen. Die Teilung des befruchteten oder unbefruchteten Eies dauert 9—10 Minuten. Die 1. Teilung ergibt gewöhnlich ungleiche Zellen. Bringt man unbefruchtete Eier mit Ductus deferens-Exsudat in vitro zusammen, so tritt Befruchtung ein, soweit sich an den Eiern noch eine Eiweißhülle entwickelt hat. Die Samenfäden durchdringen hierbei die umgebenden Eizellen. Die Befruchtung dauert etwa 2—3 Stunden. Die bekannten Versuche von Hammond werden näher besprochen, in denen Kaninchen erst mit vasktomierten, dann mit normalen Böcken begattet wurden. Die Versuche ergaben nur kleine und wenige Würfe. Nach Ansicht des Verf. hängt dies wohl damit zusammen, daß genügend Spermatozoen zu spät die Eier erreichen, wobei letztere schon eine Eiweißhülle erhalten haben. Es wurden schließlich noch Versuche angestellt, in der Kultur gezogene Eier wieder in die Tube zu transplantieren. Die technischen Schwierigkeiten sind hierbei jedoch so groß, daß nur unter vielen ein Fall gelang. Hett (Halle).

Tauson, A.: Die Wirkung der äußeren Bedingungen auf die Veränderung des Geschlechts und auf die Entwicklung von *Daphnia pulex* de Geer. (Zool. Laborat., Univ. München.) Roux' Arch. 123, 80—131 (1930).

5 Serien von Versuchen; im Einzelversuch 3—5 junge ♀ mit mehreren Eiern oder 10000 entwickelten Embryonen in 200 ccm fassende Gläser. Beobachtungszeit 1 bis 12 Wochen, bei Temperaturversuchen 1—1½ Monate; Futter: dicke Mistjauche oder *Colophora fracta*. 1. Die Temperaturgrenzen, in welchen eine Entwicklung möglich ist, schwanken zwischen 10° und 30°; für Parthenogenese ist 15—25° günstig; über 25° Hemmungen, unter 15° erscheinen ♂, unter 14—12° Ephippial-♀ in der Nachkommenschaft; unter 12°: Verwandlung der Partheno-♀ in Ephippial-♀. Unterhalb 10° Resorption der Eier, Sterilität. Für Geschlechtsbestimmung sind also Temperaturen unter 15° von Bedeutung (leider scheint nicht versucht worden zu sein, auch in heißen Jahreszeit durch Kältekultur Ephippialbildung und ♂-Produktion zu erzeugen. Ref.). — 2. Sauerstoff in Übersättigung spielt keine Rolle bei der Geschlechtsbestimmung. — 3. Nahrungsmenge ist außerordentlich wichtig; Unterernährung führt zuerst das Erscheinen von ♂, dann das von Ephippial-♀; in „reinem“ Wasser können die Tiere dank der vorhandenen gelösten organischen Stoffe (besonders Stickstoffkolloide) beinahe 1½ Monate lang; ♂ reichlich, Wachstum gehemmt, Geschlechtsreife verspätet. — 4. Wirkung der Kationen ist rein physiologisch; Na, K, Ca sind ungiftig, Mg ist sehr giftig, wirkt aber in sehr schwacher Konzentration auf Wachstum und Entwicklung stimulierend. — 5. Die Reaktion des Mediums spielt bei der Geschlechtsbestimmung eine bedeutende Rolle; sie wirkt durch den absoluten Wert der Säurestufe (pH); starke Herabsetzung der Säurestufe (auf 6,70—6,30) ruft ♂-Produktion hervor; Erhöhung auf 9,00 wirkt stimulierend. — Wirkung von Stoffwechselprodukten auf Geschlechtsbestimmung wird nicht untersucht, da dieser Faktor in der freien Natur nicht vorkommt; die Angaben von Banta und Brown, daß An-

häufung von Stoffwechselprodukten in Massenkulturen ♂-Bildung fördert, wird kritisiert, und es wird vermutet, daß auch dort Nahrungsmangel ♂-bildend gewirkt hat.

Rammner (Leipzig)

Dodel, P., et P. Jouve: Action des chlorures de manganèse, de calcium, de sodium et de magnésium, sur la croissance globale et la croissance morphogène des larves d'amphibiens (*Rana temporaria*). (Wirkung des Manganchlorürs, des Ca, Na und Mg auf das Volumenwachstum und die Morphogenese der Amphibienlarven.) (*Laboratoire de Physiol., Ecole de Méd., Clermont.*) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1159—1160 (1930).

Kaulquappen von *Rana temporaria* werden in sehr salzarmem Leitungswasser sowie ebensolchem, das mit $MgCl_2$, $MnCl_2$, $CaCl_2$ und $NaCl$ salzreicher gemacht wurde, gezüchtet. Gefüttert wird mit Eigelb, die Lösungen haben eine Konzentration von 1:100000. Die Ausgangsgröße wurde nicht registriert. Geschildert wird nur eine Versuchsserie mit je 6 Tieren in jeder Lösung, die aber mit früheren Versuchen des Verfassers in Einklang stehen soll. $NaCl$ hat keinen Einfluß, $MgCl_2$ verlangsamt das Wachstum, $CaCl_2$ und besonders $MnCl_2$ beschleunigen das Wachstum. $MgCl_2$ verzögert die Metamorphose, $MnCl_2$ und $CaCl_2$ beschleunigen sie.

Ruth Beutler (München)

Weber, A.: Quelle est la cause naturelle de l'histolyse amenant la perforation de l'opercule branchial lors de la métamorphose des batraciens anoures? (Welches ist die natürliche Ursache der Histolyse, die das Loch im Kiemendeckel bei der Metamorphose der Anuren herbeiführt?) C. r. Soc. Biol. Paris **104**, 1132—1134 (1930).

Verf. nimmt als Ursache der Perforationsöffnung im Operculum des Froschlars die Drüsen an, die in der Peribranchialhöhle liegen, und die nur bei Gegenwart von Schilddrüsenhormon sezernieren und zur Histolyse des Hautdeckels über der Gliedmaße führen.

W. Brandt (Köln)

Heberlein, Hans: Über Regeneration innerer Organe beim Axolotl. (*Anst. f. Experiment. Biol., Univ. Jena.*) Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. **48**, 169—234 (1930).

Die Versuche erstrecken sich auf partielle bzw. totale Entfernung der Leber, Milz oder Lunge. Die Leber wurde bis zu $\frac{4}{5}$ exziiert. Das Organ reagierte auf den Eingriff mit Regeneration, d. h. nicht mit Regeneration im Sinne Korschelt's von einer Wundfläche aus, vielmehr macht sich ein Restitutionsbestreben bemerkbar, das den restlichen Teil des Organs bis zum ursprünglichen Volumen heranwachsen lassen kann. Es kann daran sich der ganze Leberstumpf beteiligen bzw. einzelne seiner Teile, oder es können lokalisierte Wucherungen entstehen. Die Raumverhältnisse, die nach Schaxel von ausschlaggebender Bedeutung für die Ausgestaltung von Regeneration sind, spielen bei der Leberregeneration eine große Rolle, was sich darin ausdrückt, daß die Neubildungen nach den Orten des geringsten Widerstandes hin erfolgen. Während nach Abtragung kleinerer Partien die Leber zu dem ursprünglichen Volumen anwächst, werden größere Verluste quantitativ nur z. T. ausgeglichen. Nach 6 Wochen sind die regenerativen Prozesse abgeschlossen. Die histologische Untersuchung bestätigte, daß sich die Neubildung der Drüsenelemente in derselben Weise vollzieht, wie es Ponfick an der Kaninchenleber bereits nachgewiesen hat. Es werden in dem alten Grundplan neue Elemente eingelagert. Dabei entsteht das neue Drüsenparenchym nicht nur aus unversehrte stehengebliebenen, sondern auch gewucherte Gallengangsepithelien können sich in Leberzellen umwandeln. Die Vernarbung der Wunde wird vom Material der Glissonschen Kapsel vollzogen. Die Regeneration der Milz vollzieht sich sehr unregelmäßig. Es können Volumvergrößerungen des Restes auftreten, oder Wucherungen, oder beides gleichzeitig. Die ausschlaggebende Rolle für den Vollzug der Ersatzbildung spielt 1. das Narbengewebe (es ist häufig so widerstandsfähig, daß das Milzgewebe nicht durchzubrechen vermag), 2. der Raum, der u. U. ein seitliches Ausbreiten des Organrestes nicht zuläßt. Erwähnenswert ist, daß die Totalexstirpation der Milz ohne wesentliche Folgen für das Tier vorgenommen werden kann. Nebenmilzen konnten nicht festgestellt werden. Versuche, Teile der Lunge zu entfernen, verliefen in bezug auf Regeneration negativ. Scheinbare Vergrößerungen des Stumpfes

waren darauf zurückzuführen, daß infolge stärkerer funktioneller Beanspruchung auch das Lumen der Lunge erweiterte. Erfolgreich verliefen die Operationen nur dann, wenn der Stumpf abgebunden wurde. Anderenfalls wurde durch das offene Lumen in Tieren die Luft in die Leibeshöhle gepreßt und sie gingen ein. Totalexstirpation trugen die Tiere ohne schädliche Folgen.

M. Langendorff (Stuttgart).

Büttner, Hanna: Über wiederholte Extremitätenregeneration beim Axolotl. (*Anst. Exp. Biol., Univ. Jena.*) Zool. Jb. Abt. allg. Zool. u. Physiol. 48, 235—276 (1930).

Die Arbeit gliedert sich in 2 Teile. Im 1. Teil wird der makroskopische Regenerationsverlauf nach Amputation der linken Hinterextremität im Hüftgelenk beschrieben. Die Operation wurde an demselben Tier 8—9mal wiederholt, und zwar jeweils zu dem Zeitpunkt, wo das Regenerat zwar noch nicht in bezug auf seine Größe einem normalen gleich, aber als funktionstüchtig sich erwies. Sofern die Wundsetzung stark genug war, d. h. die Narbenbildung nicht zu rasch erfolgte und das Wundfeld verschloß, wurde die exartikulierte Extremität stets regeneriert. Die Folgen einer schwachen Wundsetzung konnten durch nachträgliche Auffrischung des Wundfeldes aufgehoben werden. Es zeigte sich, daß in bezug auf die Ausgestaltung der Regenerate bei ein und demselben Tier kein gerichtetes Formgeschehen besteht. Die Regenerate der einzelnen Versuchsserien sind untereinander verschieden, was besonders im Knochenbau der regenerierten Beine zum Ausdruck kommt. Mißbildungen sind sehr häufig; sie erstrecken sich besonders auf die Ausbildung der Phalangen, die Verlagerung des Kniegelenkes und der Mittelfußknochen und a. m. Eine große Reihe nach Aufhellungspräparaten gezeichneter Bilder gewährt einen Einblick in die mannigfachen Atypien der Ersatzbildungen. Verf. stellt sich auf Grund ihrer experimentellen Ergebnisse auf Seiten der von Schaxel vertretenen Theorie, daß Regeneration nach Maßgabe des Vorhandenseins erfolgt, d. h. verantwortlich für das Formgeschehen ist nicht das Fehlende, sondern das durch Art und Größe der Wundsetzung erschlossene bildungsfähige Gebilde. In bezug auf den Regenerationsrhythmus konnte festgestellt werden, daß er durch den wiederholten Eingriff bis zur 3. Ersatzbildung beschleunigt wird, sich dann aber wieder verlangsamt. Funktionslosigkeit der Regenerate beruht auf Ausfüllung der Beckenkapsel mit bindegewebigem Material. Der 2. Teil der Arbeit befaßt sich mit der histologischen Untersuchung einzelner Regenerationsstadien. Durch sie wird der Nachweis erbracht, daß die Regeneration durch junge lokomotionsfähige Bindegewebszellen erfolgt und die sog. Zellnester von Godlewski jun. keine Rolle spielen. Die Ersatzbildung unterbleibt, wenn die Epidermisregeneration sehr rasch erfolgt und fest ausgebildet wird. Dadurch werden die aktivierten Zellen an ihrer weiteren Entwicklung gehindert und es kommt zur Ausbildung der Beckengelenkscapsel mit ihrem kernarmen Bindegewebsmaterial.

M. Langendorff (Stuttgart).

Vererbungslehre. (*Allg. Genetik: allg. Faktorenlehre, Letalfaktoren, Geschlechtsvererbung, Chromosomenlehre; spezielle Genetik: Faktorenanalyse spezieller Merkmale, Züchtungskunde, Vererbung beim Menschen.*)

Stern, Curt: Konversionstheorie und Austauschtheorie. (*Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.*) Biol. Zbl. 50, 608—624 (1930).

Die Austauschtheorie führt die Erscheinungen der Faktorenkoppelung auf den Austausch homologer Teile innerhalb der verschiedenen Faktorengruppen, die in den Chromosomen in linearer Anordnung loziert sind, zurück. Diese Theorie sucht Winkler durch eine andere Theorie, die Konversionstheorie zu ersetzen. Nach der Konversionstheorie sind die Gene nicht unveränderlich, sondern sie gehen mit wechselnder Häufigkeit ineinander über, bald das dominierende in das recessive, bald umgekehrt. Der bisher außer dem normalen Verhalten stehende Mutationsvorgang wird dadurch zu dem regulären Verhalten der Gene. Selbstverständlich lassen sich unter der Annahme, daß der Übergang des Genes A in der Gruppe $\frac{AB}{ab}$ in a sowie in anderen Fällen

von a in A , sowie bei gleichzeitiger Veränderung $A \leq a$ Faktoren Neukombinationen und Rekombinationen entstehen, die zu denselben Folgerungen führen können, wie ein Hinüberwechseln von A aus AB in die Gruppe ab und zugleich umgekehrt von a in AB . Als entscheidende Prüfungsmöglichkeiten zwischen den beiden Theorien betrachtet Stern die Erscheinungen des Faktorenausfalls und der Faktorenverlagerung. Sind die Faktorenausfälle Generkrankungen, die zur totalen Inaktivierung führen, so ist es dem Verf. recht unwahrscheinlich, daß, wie man annehmen muß, in der Heterozygote durch Konversion aus der gesunden Gengruppe eine in derselben Weise wie die andere erkrankte und aus der erkrankten durch Konversion wieder eine gesunde wird. Handelt es sich aber wirklich um völligen Genverlust, so wäre die unmögliche Annahme zu machen, daß die Konversion nicht nur vorhandene Gene zum Verschwinden bringt, sondern auch etwas nicht Vorhandenes in das normale Allel überführt. Bei der Faktorenverlagerung wandern bekanntlich Gengruppen in ein anderes Chromosom. Bei der Paarung dieses mit seinem homologen Partner stehen dann der translozierte Gengruppe des einen keine Allele gegenüber. Nach der Austauschtheorie bietet nur ein Austausch der Gruppe zwischen den beiden Chromosomen keine Schwierigkeiten; dagegen wäre die Annahme einer Konversion der translozierten Gene in Nichts und die Konversion des Nichts zu bekannten Genen geradezu unmöglich. *H. Kappe*

Christie, W., and C. Wriedt: Seasonal effects on Mendelian segregations and sex ratios. (Jahreszeitliche Einflüsse auf Mendelspaltungen und Geschlechtsverhältnisse.) *Hereditas* (Lund) **14**, 173—196 (1930).

Die Verf. haben in langjährigen Versuchen die Frage geprüft, wieweit der Wechsel der Jahreszeiten und andere äußere Bedingungen einen Einfluß auf Mendelsche Spaltungszahlen haben. Es wurde mit den folgenden Objekten gearbeitet: 1. Haustaub (*Columbia livia*). Für das geschlechtsgekoppelte Faktorenpaar $D-d$ (intensiv bzw. verdünnte Farben) wurde bei Beginn der Legezeit ein Überschuß von „intensiv“ gegen Ende ein Überschuß von „verdünnt“ gefunden. Wahrscheinlich ist das auf eine mit der Jahreszeit wechselnde Lebensfähigkeit oder Befruchtungstauglichkeit der D - bzw. d -Gameten zurückzuführen. Bei dem gleichen Material wurden dagegen keine jahreszeitlichen Schwankungen für das Zahlenverhältnis der Geschlechter und die Spaltung des geschlechtsgekoppelten Faktors St (buntscheckig) beobachtet. 2. Haushuhn F_1 -♂ Plymouth Rock $\times$ Minorka, welche heterozygot für den geschlechtsgekoppelten Faktor B (gestreift) waren, wurden mit schwarzen Minorka-♀♀ rückgekreuzt. Auch hier wurde bei Beginn der Legezeit ein Überschuß von „gestreift“, gegen Ende ein Überschuß von „schwarz“ gefunden. Das Alter der beiden Eltern hatte keinen Einfluß auf das Verhältnis „schwarz“ : „gestreift“. Das Zahlenverhältnis der Geschlechter war unabhängig von der Jahreszeit, der vorangegangenen Eiproduktion und dem Alter des Weibchens. 3. Erbse (*Pisum sativum*). Die Spaltung des Faktors für „grüne Kotyledonen“ wurde für jeden Knoten der Pflanzen besonders bestimmt. Ähnlich wurde die Spaltung des Faktors für „Hochwüchsigkeit“ für die Samen aus den Schoten der oberen und unteren Hälfte getrennt festgestellt. Für beide Faktoren ergaben sich in allen Fällen mit großer Annäherung das 3 : 1-Verhältnis. Es liegt also hier kein Einfluß des Alters der Pflanze auf die Beschaffenheit der Gameten vor.

Eckhard Kuhn (Berlin-Dahlem).

Stubbe, Hans: Untersuchungen über die experimentelle Auslösung von Mutationen bei *Antirrhinum majus*. II. (Samen- und Keimlingsbehandlung mit Röntgenstrahlen und Chemikalien.) (*Inst. f. Züchtungsforsch., Kaiser Wilhelm-Ges., Müncheberg, Mark*: Z. indukt. Abstammungslehre **56**, 202—232 (1930).

Mutationsexperimente an entwickelten Pflanzen hat Verf. schon (vgl. diese Ber. **16**, 606) beschrieben. Samen- und Keimlingsbehandlung bilden die Fortsetzung. Die Arbeit ist überaus breit angelegt, zwecks Feststellung der verschiedensten Methoden zur Auslösung erblicher Veränderungen. Sie sucht Richtlinien und bespricht zunächst Effekte in der behandelten (P) Generation und in der F_1 . Die Röntgentechnik ist

der 1. Abhandlung beschrieben. Die verwendeten Dosen schwanken für die Samenbehandlung zwischen C8—C11 und C50—C53, für die Keimlingsbestrahlung gehen nur auf C32—C35. Die Letalgrenze für Samen lag zwischen 400 und 800 R, sie sind für Weichstrahlen empfindlicher als für Hartstrahlen. — Über 90 „Chemilien“ wurden in Lösungen von 0,001—0,05% unter Variation der Einwirkungsdauer ausprobiert. Verwendet wurden, organisch: einfache und komplizierte Kohlenwasserstoffe, Phenole, Alkohole, Aldehyde, Säuren, höhere Ringe und Arsenverbindungen; organisch: einfache Leichtmetallverbindungen, einfache und komplexe Schwermetallsalze. Mutationsraten, die die spontanen weit übertreffen, sind das wichtigste Ergebnis, verursacht durch ganz verschiedene Mittel. Schon in der P-Generation wurden manche Änderungen festgestellt, besonders als Folge einer Einwirkung von Samenpräparaten. Aus röntgenbestrahlten Samen gingen in F_1 27,42%, aus bestrahlten Keimlingen 29,17% mutierte Individuen hervor. Nach chemischen Einflüssen betrugen die Raten für Samen und Keimlinge 9,32 bzw. 9,18%. Besonders zusammengestellt sind diejenigen Verbindungen, durch die eine Mutationsrate von mehr als 10% erzielt wurde. Gewisse Mutationsformen scheinen häufig wiederzukehren. Vorläufig werden sie in Gruppen geteilt: Pflanzen, die manchen Radiomorphosen (Stein) ähnlich sind, crispa- (Baur) ähnliche Pflanzen; Pflanzen mit anderen Blattdefekten und immerlinge. Verf. betont die jedesmalig spezifische Reaktion der Sippen, mit denen er arbeitet.

E. Stein (Berlin-Lichterfelde).

Timofeev-Resovskij, N.: Gibt es eine „Nachwirkung“ der Röntgenbestrahlung auf den Genovariationsprozeß? (*Genet. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.*) Ž. eksper. Biol. 6, 79—83 (1930).

Es wurden Versuche durchgeführt, um die Frage zu entscheiden, ob durch Röntgenbestrahlung die Genovariationen nur direkt während der Bestrahlung ausgelöst werden, oder ob auch die früher bestrahlten Chromosomen, die direkt nach Bestrahlung genovariationsfrei gewesen sind, später eine erhöhte Genovariationsrate zeigen. Zu diesem Zweck wurde bei *Drosophila melanogaster* der Prozentsatz der geschlechtsgebundenen Letalfaktoren verglichen in: a) unbestrahlten Kontrollkulturen, b) F_2 von bestrahlten Männchen und c) Kulturen, die ein früher bestrahltes X-Chromosom enthalten, welches vorher in F_1 oder F_2 nach Bestrahlung durch ein Männchen „durchgeführt“ wurde und dadurch gezeigt hat, daß es keine direkt unter Bestrahlung entstandenen Letalfaktoren enthielt. Die letztgenannten Kulturen wurden in folgender Weise gewonnen: röntgenbestrahlte Männchen wurden mit „attached X“-Weibchen gekreuzt; die F_1 -Männchen von diesen Kreuzungen sind patroklin, erhalten also das bestrahlte X-Chromosom von den Vätern; daß in diesen bestrahlten X-Chromosomen direkt unter Bestrahlung keine Letalfaktoren entstanden sind, geht daraus hervor, daß diese F_1 -Männchen am Leben geblieben sind; solche F_1 -♂♂ werden nun z. B. mit ClB-♀♀ gekreuzt und die F_1 -♀♀ von diesen Kreuzungen enthalten das früher bestrahlte X-Chromosom; diese F_1 ClB-♀♀ (also F_2 von den bestrahlten ♂♂) werden mit beliebigen ♂♂ gekreuzt und zeigen, ob das früher bestrahlte X-Chromosom Letalfaktoren entstanden sind. Die Versuche haben folgendes Resultat ergeben: 793 unbestrahlte Kontrollkulturen ergaben 1 Letalfaktor, 672 F_1 - F_2 -Kulturen von bestrahlten Männchen haben 49 Letalfaktoren und 4 „nichtbare“ geschlechtsgebundene Genovariationen ergeben, und 756 Kulturen, die „früherbestrahlte“ X-Chromosome enthielten, haben 2 Letalfaktoren ergeben. Kontrollkulturen und die „früherbestrahlten“ X-Chromosome zeigen also keinen reellen Unterschied in ihren Genovariationsraten. Daraus ist zu schließen, daß die Genovariationen durch Röntgenstrahlen nur direkt, während der Bestrahlung hervorgerufen werden.

N. Timoféeff-Ressovsky (Berlin-Buch).

Timofeev-Resovskij, N.: Über das Funktionieren der Gene in den Geschlechtsorganen. (*Genet. Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Hirnforsch., Berlin-Buch.*) Ž. eksper. Biol. 6, 181—187 (1930) [Russisch].

Männchen von *Drosophila melanogaster* wurden im Larvenstadium oder im Imago-

stadium mit gleicher Röntgendosis bestrahlt. Die im Imagostadium bestrahlten Männchen wurden sofort nach der Bestrahlung mit Weibchen gepaart; nach 5 Tage wurden dieselben Männchen mit neuen Weibchen gepaart; nach weiteren 5 Tage wiederum mit neuen Weibchen gepaart usw. bis zum 30. Tage nach der Bestrahlung. Die ersten Weibchen werden mit Spermien, die im reifen Zustande bestrahlt wurden befruchtet; die letzten Weibchen werden mit solchen Spermien befruchtet, die zur Zeit der Bestrahlung noch unreif waren. Die Untersuchung der Mutationsrate und der Eier- und Larvensterblichkeit nach Bestrahlung von reifen und unreifen Spermien hat folgendes ergeben. Die Rate der geschlechtsgebundenen Letalfaktoren ist nach Bestrahlung der unreifen Geschlechtszellen 5—10mal geringer als nach Bestrahlung der reifen Spermien (ebenso, wie in ähnlichen Versuchen von Harris und von Hanson und Heys); dagegen ist aber der Prozentsatz der sichtbaren Genovariationen in beiden Fällen der gleiche. Die Eiersterblichkeit ist bedeutend höher nach Bestrahlung von reifen Spermien; die Larvensterblichkeit ist aber in beiden Fällen die gleiche. Gleiches sind in beiden Fällen also die Prozentsätze von solchen Faktoren, die nicht unmittelbar auf das Zellenleben einwirken („sichtbare“ Genovariationen, Larvensterblichkeit). Dagegen treten die Faktoren, die anscheinend auf das Zellenleben als solches letal wirken (Letalfaktoren, Eiersterblichkeit), nur nach Bestrahlung von reifen Spermien häufig auf. Aus den Versuchsergebnissen wird der Schluß gezogen, daß: 1. in reifen und unreifen Spermien durch eine gleiche Bestrahlungsdosis wahrscheinlich eine gleiche Mutationsrate ausgelöst wird; 2. in den reifen Spermien die Gene „latent“ bleiben (wie auch von Muller und von Harris angenommen wird), in den unreifen Geschlechtszellen aber die Gene funktionieren und die entstehenden Letalfaktoren die sie enthalten den Zellen abtöten, und 3. deshalb der Prozentsatz der Letalfaktoren nach Bestrahlung von unreifen Spermien so gering ist.

N. Timoféeff-Ressovsky (Berlin-Buch).

Goodspeed, Thomas Harper, and Priscilla Avery: Nature and significance of structural chromosome alterations induced by X-rays and radium. (Natur und Bedeutung struktureller, durch Röntgen- und Radiumstrahlen induzierter Chromosomenveränderungen.) *Cytologia* (Tokyo) **1**, 308—327 (1930).

Dem Verf. liegt daran, an Hand der vorliegenden Untersuchungen besonders darauf hinzuweisen, daß außer den Genmutationen durch Radium- und Röntgenstrahlen (vgl. diese Ber. **12**, 216) auch sichtbare Strukturveränderungen der Chromosomen erzeugt werden. Unmittelbare Effekte solcher Art wurden schon beschrieben. Heute handelt es sich um cytologische Untersuchungen der 1., 2. und 3. Generation nach Röntgen- bzw. Radiumbehandlung (X, bzw. R_1 , 2 , 3). Die chromosomalen Strukturänderungen sind ihrer Natur nach z. T. von anderen Objekten her schon bekannt. Aneinanderhaften homologer und nicht homologer ganzer Chromosomen, Befestigung eines Chromosomensegmentes an einem nicht homologen Chromosom, Fragmentationen, Valenzänderungen und Segmentverluste. Ein herausgegriffener Einzelfall: Im Soma einer X_3 -Pflanze treten 1. quadrivalente Chromosomen auf, die anders als sonst im tetrasomer *Nicotiana* Ringe bilden; 2. bivalente, die durch ein 3., zentral liegendes Chromosom miteinander verbunden sind. Wenn die Partner der Bivalenten zu dem entgegengesetzten Polen wandern, so hängt das Univalente auseinandergezogen dazwischen. Bis zur II M. bleibt so eine Chromosomenbrücke zwischen den Kernen bestehen. „Translokation“ kommt zustande, wenn die Brücke bricht und Segmente verschiedener Größe an den Univalenten hängen bleiben. Trennen die bivalenten Partner sich nicht bei der 1. Teilung (non disjunction), sondern erst bei der 2., so wird das Einzelchromosom erst hier auseinandergezogen, wobei manchmal kleine Stücke satellitenähnlich sich lösen. Verf. nimmt an, daß ein Aneinanderhaften homologer Chromosomen den Ursprung der Form veranlaßt hat. Der Großelter (X_1) der Pflanze mit dieser Chromosomenstruktur besaß die typisch vergrößerten Blüten einer trisomen Form. In Zusammenhang mit den erbanalytischen Befunden, die die Blütengröße der Nachkommen betreffen, setzt Verf. an Hand von Chromosomendiagrammen aus-

einander, wie er sich die strukturellen Veränderungen in Haplo- und Diplophasen (Chromosomentrennungen und Reorganisationen) denkt. *E. Stein* (Berlin).

Plotnikowa, T. W.: Cytologische Untersuchung von Bastarden zwischen 28-chromosomigem Weizen und Roggen. *Planta* (Berl.) **12**, 167—183 (1930).

Verschiedene 28-chromosomige Weizenarten und -rassen wurden mit einer Sommerarte von *Secale cereale* (als Vater) gekreuzt. 1927 wurden von 3 Arten von *Tr. durum* zw. *Tr. persicum* 30 Ähren mit 612 kastrierten Blüten bestäubt. 6 F_1 -Pflanzen wurden gewonnen; davon gelangten 2 zur Reife; sie hatten somatisch 21 Chromosomen. Die in 1928 mit viel mehr Arten ausgeführten Kreuzungen mißlangen sämtlich. Die gewonnenen Emmer-Roggen-Hybriden sind morphologisch den von anderen Forschern erzeugten Dinkel-Roggen-Bastarden sehr ähnlich. Sie werden eingehend beschrieben. Im Versuch übertrafen sie benachbarte Weizensorten. Die Ähren waren sehr lang; sie blühten zeit geöffnet, so daß sie zerzaust aussahen. Die Antheren waren fast leer, die wenigen Pollenkörner unnormal, steril, meist geschrumpft. Auch mit Elternpollen bestäubt blieben die Blüten steril. Die Cytologie wird an Hand von 41 Abbildungen ausführlich besprochen.

Sartorius (Mussbach).

Fernandes, Abilio: Sur le nombre et la morphologie des chromosomes chez quelques espèces du genre *Narcissus* L. (Über die Zahl und Morphologie der Chromosomen einiger Arten der Gattung *Narcissus* L.) (*Inst. de Botan., Univ., Coimbra.*) C. r. Soc. Biol. Paris **105**, 135—137 (1930).

Verf. hat alle portugiesischen *Narcissus*-arten nach der Heitz-Methode auf die Zahl und Form der Chromosomen untersucht (an Wurzelspitzen und jungen Fruchtschoten). *N. pseudo-narcissus* L. var. *bicolor* (L.): $2n = 28$, Form 20 Lk, 4 li und 4 kk (Symbole nach Heitz). *N. minor* L.: $2n = 14$, (8 Lk, 2 lk, 4 kk). *N. odoratus* L.: $2n = 10$ (4 Ll, 6 Lk, 2 li). *N. tazetta* L.: $2n = 10$ (6 Lk, 2 ll, 2 kk, unsicher). *N. triandrus* L.: $2n = 14$ (6 Lk, 2 lk, 6 kk). *N. reflexus* Brot.: $2n = 14$ (8 Lk, 6 kk). *N. jonquilla* L. var. *anquilloides* (Wk.): $2n = 14$ (2 Lk [Ll], 4 Lk, 2 ll, 2 li, 2 lk, 2 kk). *N. rupicola* Duf.: $2n = 12$ (12 Ll, 6 Lk, 2 li oder lk, 2 kk). *N. scaberulus* Henriq.: $2n = 12$ (2 Ll, 6 Lk, 2 li oder lk, 2 kk). *N. calcicola* Mend. wie *N. scaberulus* Henriq., wahrscheinlich Unterart von letzterer. *N. gaditanus* Bss. u. Reut. var. *minutiflorus* (Wk.): $2n = 12$ (8 Lk, 4 kk).

M. Ufer (Müncheberg).

Serebrovskij, A., und S. Petrov: Zur Ermittlung einer Chromosomenkarte des Haushuhnes. *Ž. eksper. Biol.* **6**, 157—180 (1930) [Russisch].

Es werden 8 unabhängige Koppelungsgruppen beim Haushuhn beschrieben. Die 1. Koppelungsgruppe (X-Chromosom) enthält 4 Gene, die 2. ebenfalls 4 Gene, die 3. und 4. je 2 und die übrigen je 1 Faktor. Für die gekoppelten Gene wurden die Austauschprozentsätze festgestellt. Der Faktorenaustausch findet sowohl bei ♂♂ als auch bei ♀♀ statt. Anscheinend ergeben die ♀♀ einen etwas höheren Austauschprozentsatz, als die ♂♂. Neben dem einfachen wurde beim Haushuhn auch der doppelte Faktorenaustausch beobachtet. Es wird auch eine Reihe von Genen erwähnt, die vorläufig noch nicht mit Sicherheit als unabhängig oder zu einer von den 8 bisher festgestellten Koppelungsgruppen gehörend angesehen werden können. Über die Einzelheiten dieser interessanten Arbeit muß im Original nachgelesen werden. *N. Timoféeff-Ressovsky.*

Andersson-Kottö, Irma: *Variation in three species of ferns. (Polystichum angulare, Lastraea atrata and Scolopendrium vulgare.)* (Verschiedenfarbigkeit bei 3 Farnarten.) *Z. induct. Abstammungslehre* **56**, 115—201 (1930).

Verf. gibt zunächst eine Beschreibung der verschiedenfarbigen Sporophyten und Gametophyten. Die Gametophyten des variegaten *Polystichum angulare* werden dabei in 4 Gruppen geteilt: dunkelgrüne, blaßgrüne und 2 Typen von verschiedenfarbigen Prothallien. Mit diesem Material wurden Kreuzungsversuche vorgenommen, die in der Hauptsache folgenden Verlauf nahmen: Untersucht wurde von einem mehrfarbigen Sporophyten stammende Gametophytengeneration (G), unter der durch Befruchtung mit Gameten verschiedener Prothallien erzielte diploide

F₁-Generation, wobei unterschieden wird, ob die Gametophyten aus dem nämlichen Sporangium herrührten oder von solchen aus verschiedenen Teilen des Sporophyten. Weiter geschildert wird die nun auftretende G₁-Generation, aus der durch Befruchtungen die diploide F₂-Generation gewonnen wurde. Bei der aus deren Sporen herauswachsenden haploiden G₂-Generation sind genauere Spezifizierungen geschildert. Besondere Berücksichtigung finden die Bedingungen des phänotypischen Wechsel von Dunkelgrün in Bläßgrün. Beachtet ist der Zusammenhang mit dem genotypischen Wechsel. Ferner ist hingewiesen auf das Auftreten der Veränderung gelegentlich einer Zellteilung, wobei die mutierte Tochterzelle zur keilförmigen Zentralzelle des Vegetationspunktes wird. Die Mutationen aus dunklen und blaßgrünen Zellen bringt Verf. in Zusammenhang mit einem die Chlorophyllbildung beeinflussenden Faktor, dessen Vorhandensein in siebenlei verschiedenen Stufen vermutet wird. Kurz behandelt ist noch die Vererbung der Buntblättrigkeit bei *Lastraea atrata* und ausführlicher bei *Scolopendrium vulgare*. E. Bergdolt (München).

Nazarenko, I.: Untersuchung einer neuen geschlechtsgebundenen Genovariation „Abrupt X“ bei *Drosophila melanogaster*. Ž. eksper. Biol. 6, 85—113 (1930).

Eine eingehende Analyse einer neuen geschlechtsgebundenen Genovariation Ax von *Drosophila melanogaster*. Der Faktor Ax ruft Verkürzungen der Längsadern an den Flügeln und Borstenreduktion am Kopf und Thorax bei den Fliegen hervor. In heterozygotem Zustand ruft Ax nur Verkürzungen der 5. und manchmal der 4. Längsadern hervor und ist also unvollkommen dominant. Lokalisationsversuche haben gezeigt, daß Ax im linken Teil des X-Chromosoms, zwischen white und ruby, ungefähr im Punkt 4,4 liegt. Es wurde ausführlich die phänotypische Manifestierung von Ax untersucht. Durch Plus- und Minusselektion ist es gelungen die Dominanz dieses Faktors zu beeinflussen: einerseits wurden Kulturen erzielt, in denen Ax sich praktisch als recessiv verhielt (nur etwa 2% der heterozygoten Ax/t-Fliegen zeigten das Merkmal), andererseits solche, in denen Ax fast absolut dominant war. Das zeigt, daß die phänotypische Manifestierung von Ax durch eine Reihe von Modifikationsfaktoren beeinflusst wird. Auch einige bestimmte Genovariationen beeinflussen die Manifestierung von Ax. Ein recessives Gen shortened (im X-Chromosom, neben garnet lokalisiert) verstärkt die phänotypische Manifestierung von Ax; der Faktor Ax verstärkt die Manifestierung von scute (X-Chrom., O₁₀ t), so daß in Anwesenheit von Ax der sonst recessive Faktor scute schwach dominant wird; die Faktoren Ax und Notch⁸ wirken in Kombination abschwächend aufeinander. Notch⁸ ist bekanntlich eine Deficiency des X-Chromosoms, gerade in dem Gebiet, wo Ax liegt. Da nun Ax und N⁸ ihre phänotypischen Manifestierungen gegenseitig beeinflussen, so spricht Verf. die Vermutung aus, daß Ax vielleicht eine Duplikation eines X-Chromosomenstückchens sein könnte aus demselben Gebiet des Chromosoms, für das N⁸ eine Deficiency ist.

N. Timoféeff-Ressovsky (Berlin-Buch).

Borisenko, E.: Untersuchung einer autosomen Genovariation „radius incompletus“ bei *Drosophila melanogaster*. Ž. eksper. Biol. 6, 115—138 u. engl. Zusammenfassung 138 (1930) [Russisch].

Es wird die phänotypische Manifestierung und die Lokalisation einer recessiven autosomalen Genovariation radius incompletus (ri), die aus einer freilebenden kaukasischen Population von *Drosophila melanogaster* herausgespaltet ist, beschrieben. Das Gen ri ist im III-Chromosom zwischen den Faktoren Dichaeta und Delta, ungefähr im Punkt 45,6 lokalisiert. Das Gen ri ruft in homozygotem Zustand Verkürzungen oder Unterbrechungen des distalen Endes des Radius (2. Längsader des Flügels) hervor. Die Penetranz von ri ist absolut (100% der phänotypischen Manifestierung); die Expressivität ist aber ziemlich variabel und kann durch Modifikationsfaktoren (in verschiedenen Kulturen) beeinflusst werden. Der Grad der Expressivität ist etwas geschlechtsbegrenzt. Eine Untersuchung der Asymmetrie der Manifestierung des ri-Merkmals hat gezeigt, daß die Zahl der symmetrischen Formen größer ist als auf Grund

der Unabhängigkeit der rechts- und links-Manifestierung zu erwarten ist. Über die angewandten Methoden und einzelne Ergebnisse muß im Original nachgelesen werden.

N. Timoféeff-Ressovsky (Berlin-Buch).

Neuhaus, M.: Über die Erbllichkeit einiger Merkmale bei Schweinen. *Ž. eksper. Biol.* B 6, 233—236 (1930) [Russisch].

Verf. hat Kreuzungen zwischen weißen, langohrigen englischen und schwarzen, kurzohrigen europäischen Schweinen durchgeführt. Weiße Färbung und kurze Ohren sind dominant (W, K); schwarze Färbung und lange Ohren recessiv (w, k). Hängeohren, die bei manchen Schweinerassen oft vorkommen, sind recessiv (n) gegenüber den normalen Stehohren (N). Außerdem wurde die Vererbung der meistens asymmetrischen „Weißäugigkeit“ verfolgt. Der Erbgang dieses Merkmals konnte nicht endgültig geklärt werden, Verf. nimmt aber an, daß die „Weißäugigkeit“ wahrscheinlich durch 2 Gene, von denen eins geschlechtsgebunden ist, bedingt wird.

N. Timoféeff-Ressovsky (Berlin-Buch).

Ljachoveckij, A., und M. Rosanova: Beiträge zur Frage der Vererbung der Blutgruppen. (*Histol. Inst., II. Univ. Moskau.*) *Bjul. Komiss. vivčan. Krovjan. Ugrup.* 4, 159—168 (1930).

Untersuchung über die Vererbung der Blutgruppen bei 154 Familien. Folgende Tabelle gibt den Tatbestand wieder:

Eltern		Familienzahl	Kinder				Kinderzahl
V	M		O	A	B	AB	
O × O		5	15				15
O × A		16	17	22			39
A × O		12	23	11			34
A × A		16	6	33			39
O × B		3	3		6		9
B × O		2	5		4		9
B × B		3	4		5		9
A × B		4	4		8		12
B × A		6		5	6	4	15
O × AB		1		1			1
AB × O		1		1	3		4
A × AB		3		3	4		7
AB × A		4		10	1	2	13
AB × B		1		1	4		5

Im gesamten Material wurden 4 Fälle beobachtet, bei welchen bei den Kindern eine Gruppen-eigenschaft auftrat, die bei den Eltern fehlte (2 Familien O × A, eine O × B, eine B × B). In 2 Familien war aber eine illegitime Vaterschaft wahrscheinlich. Die Beobachtung, daß die Kinder häufiger die Gruppe der Mutter haben als die des Vaters, wurde erhoben (18 Söhne hatten die Gruppe des Vaters, 43 die Gruppe der Mutter, 28 Töchter die Gruppe des Vaters, 10 die Gruppe der Mutter).

Hirszfeld (Warschau).^{oo}

Lattes, Leone: Ereditarietà dei gruppi sanguigni. (Heredität der Blutgruppen.) *Attit. di Med. Leg., Univ., Modena.* *Rass. med.* 10, 249—257 u. 305—316 (1930).

Sehr lesenswertes Sammelreferat über die Vererbung isoagglutinabler Substanzen des menschlichen Blutes.

Hirszfeld (Warschau).^{oo}

Brunner, Willy: Über den Vererbungsmodus der verschiedenen Typen der angeborenen Rotgrünblindheit. (*Univ.-Augenklin., Basel.*) *Graefes Arch.* 124, 1—52 (1930).

Das seit langem bekannte familiäre Auftreten der angeborenen Rotgrünblindheit und deren Vererbung hauptsächlich auf männliche Descendenten hatte zwar in der Horner'schen Regel eine gewisse Erklärung gefunden, konnte aber erst auf Grund der Chromosomenlehre zum Verständnis näher gebracht werden. Es handelt sich um einen rein rezessiv geschlechtsgebundenen Vererbungsmodus. Die verschiedenen Kreuzungsmöglichkeiten zwischen gesundem und befallenen Mann einerseits und gesunder und latent bzw. manifest befallener Frau werden schematisch erklärt und entsprechende Beispiele aus der Literatur angeführt. Daß in seltenen Fällen Ausnahmen von der Regel vorkommen können, kann auf Grund der Fälle von Schiötz, Kawakami, Siemens, Waaler und 2 eigenen Beobachtungen nicht mehr zweifelt werden. Während früher die Rotgrünblindheit als einheitliche Anomalie angesehen wurde, lassen sich heute dank der verfeinerten Diagnostik mittels des Anomaloskopes verschiedene Typen der Farbensinnstörung gegeneinander abgrenzen. Diese Trennung ist auch vom Standpunkte der Erbllichkeitsforschung aus von großer Bedeutung, gilt es doch anzulegen, wie sich die einzelnen Typen vererbungsmäßig zueinander verhalten. Da Mütter

von Söhnen mit verschiedenartiger, der gleichen Hauptgruppe angehörenden, Farbensinnstörung (Deuteranopie und Deuteranomalie einerseits bzw. Protanopie und Protanomalie andererseits) in der Regel selbst farbenblind sind, dagegen Mütter von Söhnen mit verschiedenartiger, aber nicht der gleichen Hauptgruppe angehörenden Farbensinnstörung normal zu sein pflegen, so haben Waaler und vor allem Waaler die Theorie aufgestellt, daß die Gene für Deuteranopie und Deuteranomalie einerseits, Protanopie und Protanomalie andererseits keine Allelomorphe seien. Die Richtigkeit dieser Theorie ließe sich am einfachsten beweisen, wenn es gelänge, festzustellen, daß ein Mädchen, das aus einer Ehe zwischen einer deuteranopen oder deuteranomalen Elter einerseits und einem protanopen oder protanomalen Elter andererseits hervorgeht, nicht farbensinngestört ist. In der vorliegenden Arbeit wurde deshalb versucht, Ehepaare mit verschiedenartiger Farbensinnstörung zu eruieren. Zu diesem Zwecke wurden in der Hauptsache die Eltern der von v. Planta [Graefes Arch. **120**, 253 (1928)] untersuchten Schüler mit dem Ishiharatest auf ihren Farbensinn geprüft und Befallene mit dem Anomaloskop untersucht. Unter den 166 Familien fand sich leider kein farbenuntüchtiges Ehepaar. Trotzdem eine Beantwortung der oben erwähnten Fragestellung nicht möglich war, haben sich doch wesentliche Ergebnisse mit Bezug auf das gegenseitige Verhalten der einzelnen Typen bei der Weitervererbung erzielen lassen. In 38 von 47 farbenuntüchtigen Brüdergruppen mit normaler Mutter war die Art der Farbensinnstörung stets dieselbe, was für die Waalersche Ansicht spricht, daß den einzelnen Typen besondere Erbfaktoren zugrunde liegen. Mit der Waalerschen Theorie in Widerspruch stehende Fälle, nämlich farbensinngestörte Mütter mit farbenuntüchtigen Söhnen beider Haupttypen und farbenuntüchtige Brüder beider Hauptgruppen neben normalen Brüdern wurden nicht gefunden. In die von Just aufgestellte multiple Allelomorphreihe ordnet sich nach Franceschetti (vgl. diese Ber. **11**, 355) die extreme Deuteranomalie und extreme Protanomalie zwischen die anomale Trichomasie und die Dichromasie mit entsprechendem Dominanzverhältnis ein. Innerhalb der einzelnen Hauptgruppen können sich manchmal die Dominanzverhältnisse ändern und zu Ausnahmen von der Regel führen. Zur Erklärung werden quantitative Mutationen der nur quantitativ verschiedenen Allelomorphe angenommen. Farbensinngestörte Frauen können entweder 2 Gene für dieselbe Farbensinnstörung oder für 2 verschiedenartige Typen, die aber nach der Waalerschen Theorie nur derselben Hauptgruppe angehören dürfen, besitzen. Nimmt man auch für die Extrem-Anomalen spezielle Erbfaktoren an, so wären entsprechend den 6 verschiedenen Genen 21 verschiedene Genotypen bei den Frauen denkbar. Die Analyse geschieht hauptsächlich mit Hilfe der männlichen Verwandten (Vater, Brüder, Söhne usw.). Die einzelnen Kombinationen werden auf Grund der in der Literatur vorhandenen Fälle und eigenen Beobachtungen (8 farbensinngestörte Mütter und 21 befallene Töchter) eingehend besprochen. Eine durch ihre deuteranomalen und protanomalen Söhne als genotypisch deuteranomal-protanomale-compound analysierte Mutter erwies sich erwartungsgemäß als vollkommen farbenuntüchtig. Die Tatsache, daß 2 Väter deuteranomaler Töchter vollkommen farbenuntüchtig waren, läßt sich am besten dadurch erklären, daß ausnahmsweise auch bei der angeborenen Rotgrünblindheit ebenso wie bei anderen rezessiv geschlechtsgebundenen Leiden nur heterozygot befallene Frauen (Konduktorinnen) infolge Dominanzwechsel manifest befallen sein können. Theoretisch können allerdings noch verschiedene andere Erklärungs-möglichkeiten (Non-disjunction, Duplikation des väterlichen Chromosoms, Mutation) in Frage kommen. Am Schluß der Arbeit folgt eine Wiedergabe von 50 der befallenen Familien in Stammbaumform.

Franceschetti (Basel).^{oo}

Artbildung. (Biometrik, Konstitutionslehre, Anthropologie.)

Roth-Lutra: Das Qualifikationsdiagramm und das Wahrscheinlichkeitsdiagramm (4. Tag., Tübingen, Sitzg. v. 16.—17. IV. 1929.) Verh. Ges. phys. Anthropol. **4**, 31—57 (1930).

Aus dem Mollison'schen Verfahren zur graphischen Darstellung der Differenzen verschiedener Gruppen oder Individuen wird ein Abweichungs-, ein Streuungs-, ein Qualifikations- und ein Wahrscheinlichkeitsdiagramm entwickelt. In der Anlage stimmen die 4 Diagrammarten überein: Zur Linken werden senkrecht untereinander im gleichen Abstand die Merkmale aufgeführt, deren Diagrammwerte auf Horizontalen liegen. Die lotrecht verlaufende Diagramm-Achse als Zentralgerade einer Parallelschar ist bei den beiden ersten Diagrammarten der Träger der Mittelwerte der Basisgruppe und sonst der Träger der Nullwerte, entweder des Bodmerschen Qualifikationskoeffizienten $Qu = D/d$ (D als Mittelwertsdifferenz bei den verglichenen Gruppen, d als Differenzstreuung) oder der Wahrscheinlichkeit. Die ihr zugeordneten Parallelellote bezeichnen auf den Merkmalshorizontalen entweder das Ein- und Mehrfache der Abweichung der Basisgruppe (σ) oder das ganzzahlige Vielfache der Mittelwertstreuung dieser Gruppe oder den ganzziffrigen Qualifikationskoeffizienten oder die Wahrscheinlichkeitsstufen. Der Breite des Diagrammfeldes ist nur im Wahrscheinlichkeitsdiagramm eine feste Grenze durch $W = 100\%$ gesetzt, sonst ist ihr freier Spielraum gelassen. Die im Diagrammfeld verlaufenden Abweichungszickzacklinien sind Symbole von Individuen und können

selteneren Fällen auch Gruppen darstellen. Die Streuungszickzackpaare repräsentieren Gruppen. Die Qualifikations- und Wahrscheinlichkeitszickzacklinien sind unmittelbar die Träger von Gruppendifferenzen, das eine Mal den Sicherheitsgrad und das relative Ausmaß nehmend und das andere Mal auf den Wahrscheinlichkeiten fußend. Die Veranschaulichung individueller Unterschiede und die Klärung der Frage der Zugehörigkeit von Individuen zu Gruppen erfolgt am zweckmäßigsten im Abweichungsdiagramm, Gruppendifferenzen werden am besten in dem mit dem Wahrscheinlichkeitsdiagramm kombinierten Qualifikationsdiagramm dargestellt.

K. Saller (Göttingen).

Jankowsky, W.: Konstitution, Körperbau und Rasse in ihrer gegenseitigen Beziehung und Abgrenzung. (*Anthropol. Inst., Univ. Breslau.*) *Anat. Anz.* 70, 470—515 (1930).

Im Gegensatz zu neueren Autoren hält Verf. für zweckmäßig, die Konstitution nicht als Phänotypus oder Person, sondern mit Tandler u. a. nach ihrem Genotypus zu definieren. In Übereinstimmung mit den älteren Anschauungen wird hervorgehoben, daß der Körperbaubegriff von dem Konstitutionsbegriff als morphologische Abstraktion zu trennen ist. Die Rassendefinition, die in der Tanderschen Formulierung am besten ist, muß durch Angabe der wichtigsten Rassenmerkmale und Berücksichtigung des Zeitfaktors hinsichtlich der angenommenen Konstanz der Rasse exakter formuliert werden; zwischen Rasse und Rassenmischung bestehen nur graduelle Unterschiede. Entsprechend den Ausführungen H. Günthers umfaßt der Konstitutionsbegriff auch den Rassenbegriff.

K. Saller (Göttingen).

Sergi, Giuseppe: Intorno al così detto prognatismo e il metodo di determinarlo. (Über die Prognathie und eine Methode ihn zu bestimmen.) *Riv. Antrop.* 28, 271 bis 287 (1930).

Zur Bestimmung der Prognathie wird die Untersuchung eines Dreiecks angewendet, durch folgende Punkte gegeben und in der Medianebene gelegen ist: die Sutura nasofrontalis, der Alveolarfortsatz des Oberkiefers und an der Schädelbasis die Synchronosis sphenoparietalis. Die Variabilität dieses Dreiecks ist sehr groß, ohne daß irgendwelche Schlüsse über die Rassenzugehörigkeit daraus gezogen werden könnten. Der Index, der das Verhältnis zwischen oberer und unterer Seite dieses Dreiecks anzeigt, kann größer oder kleiner als 100 sein und gibt ein gewisses Maß für die Prognathie.

H. v. Hayek (Rostock).

Graffi, Elsa: Studi e ricerche sul prognatismo. (Untersuchungen über die Prognathie.) (*Istit. di Antropol., Univ., Bologna.*) *Riv. Antrop.* 28, 123—163 (1930).

An über 200 Schädeln von Primaten und verschiedenen Menschenrassen wurden mit Hilfe zahlreicher Maße Untersuchungen über die Prognathie angestellt. Es werden 4 Formen der Prognathie unterschieden, die des ganzen Gesichtes, die alveolare, die des Intermaxillare und der Nasilla. Lange Tabellen zeigen die Häufigkeit der Prognathie bei den verschiedenen Primatenrassen, bei den verschiedenen Rassen, Geschlechtern und die Beziehungen zu den Durchmessern des Schädels.

H. v. Hayek (Rostock).

Fischer: Die anthropologischen Erhebungen an der deutschen Bevölkerung. (4. Tag., *Leipzig, Sitzg. v. 16.—17. IV. 1929.*) *Verh. Ges. phys. Anthrop.* 4, 21—25 (1930).

Kurzer Bericht über organisatorische Fragen (Meßschema, Art der Veröffentlichung) und den rassenkundlichen Erhebungen in Deutschland, die von der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft in Berlin finanziert und von verschiedenen Seiten unabhängig und selbständig unternommen und durchgeführt werden.

K. Saller (Göttingen).

Mahalanobis, P. C.: A statistical study of certain anthropometric measurements in Sweden. (Eine statistische Studie über bestimmte anthropometrische Merkmale in Schweden.) *Biometrika* (Lond.) 22, 94—108 (1930).

Mit Hilfe des Pearson'schen Koeffizienten der Rassenähnlichkeit wird an dem Material der schwedischen Landeserhebung (Lundborg und Linders) die gegenseitige Stellung der einzelnen von Lundborg und Linders unterschiedenen geographischen und sozialen Gruppen miteinander berechnet. Die ziemlich isoliert stehende Nordgruppe hat am ehesten Beziehungen zur Südgruppe, welche sich den ihrerseits wieder enger beisammen stehenden Ost- und Westgruppen anschließt. Die Bevölkerung der großen Städte schließt sich am meisten derjenigen der Ost- und Westgruppe an.

K. Saller (Göttingen).

Klimek: Kraniologische Beiträge zur Systematik der gelben Rasse. (4. Tag., *Leipzig, Sitzg. v. 16.—17. IV. 1929.*) *Verh. Ges. phys. Anthrop.* 4, 58—64 (1930).

Die Untersuchung von 351 asiatischen Schädeln nach der differentialdiagnostischen Methode Czekanowskis führt zur Aussonderung folgender anthropologischer Typen

in Asien: 1. paläoasiatischer Typus, der am stärksten bei den Völkern der paläosibirischen Sprachgruppe vertreten ist; 2. arktischer Typus, für die Eskimos charakteristisch; 3. pacifischer Typus, der vor allem in Ostasien vertreten und für Tungus, Koreaner und Nordchinesen charakteristisch ist, 4. lapponoider Typus und 5. zentralasiatischer Typus, beide für mongolische und türkische Völker Zentralasiens kennzeichnend. Die Befunde ergeben sich ebenso bei der Anwendung von Indices wie bei der Anwendung der relativen Zahlen Szombathys und stimmen mit den Aufstellungen Denikers überein. In Amerika finden sich nach den von Virchow in *Crania ethnica Americana* veröffentlichten Daten dieselben Formen wie in Asien, nur ein paläoamerikanischer Typus (Lagoa Santa Rasse) ist für Amerika spezifisch.

K. Saller (Göttingen)

Woo, T. L.: A study of seventy-one ninth dynasty Egyptian skulls from Sedment (Untersuchung von 71 Schädeln der 9. Dynastie von Sedment [Ägypten].) *Biometrika* (Lond.) **22**, 65—93 (1930).

Die untersuchte, größtenteils aus guterhaltenen Schädeln bestehende Reihe ist ähnlich variabel wie andere Ägypterserien, im ganzen gleicht sie am meisten Schädeln der 4. und 5. Dynastie der benachbarten Gräber von Deshasheh und Medum. Auch zu modernen Kreten und modernen Ägyptern (Kairo) bestehen engere Beziehungen, die Ähnlichkeiten kommen vor allem durch einen höheren Längenbreitenindex des Schädels, eine beträchtlichere Kehlkopfgröße und einen höheren Längenhöhenindex, als er bei den anderen ägyptischen Serien zu finden ist, zustande.

K. Saller (Göttingen)

Ökologie, Biogeographie. Allgemeines.

Trochain, J.: Le ricin. (Die Ricinuspflanze.) *Rev. Bot. appl.* **10**, 299—308, bis 392, 578—589, 671—675 u. 738—748 (1930).

Diese monographische Ricinusstudie befaßt sich mit allen wichtigeren volkswirtschaftlichen, landwirtschaftlichen, technischen und botanischen Fragen. Erzeugung und Verbrauch in den verschiedenen Erdteilen, Einfuhr und Ausfuhr sind zahlenmäßig dargestellt; die chemische Zusammensetzung der Samen und die Eigenschaften von Ölen und Ölsäuren sind besprochen. Eine Behandlung der klimatischen und edaphischen Bedingungen, insbesondere der Ansprüche an Sonnenschein und Feuchtigkeit schließt sich an. Auf die Einzelheiten der Kultivierung, auf die Pilz- und Bakterienkrankheiten sowie auf die tierischen Schädlinge der Ricinuspflanze wird eingegangen. Im systematischen Abschnitt sind 35 Varietäten und Formen der Art *Ricinus communis* L. und die Arten *R. persicus* Pop., *R. sanguineus* Hort. und *R. zanzibarensis* Hort. beschrieben. Den Schluß bilden Mitteilungen über bisherige Kreuzungsanalysen, Selektionsversuche und physiologische Untersuchungen.

W. Riede (Bonn)

Franssen, C. J. H.: Die Biologie und Systematik der europäischen „Schwarzen Blattläuse“ unter besonderer Berücksichtigung der „Niederländischen Arten“. *Z. angew. Entomol.* **17**, 106—145 (1930).

Bei der Systematik der schwarzen Blattläuse unterscheidet der Verf. 6 Gruppen, wobei es auffallend ist, daß jede Gruppe aus einem Komplex von morphologisch sehr stark ähnelnden Arten besteht, welche sich jedoch biologisch ganz verschieden verhalten. Es folgt eine Schilderung der morphologischen Merkmale der verschiedenen Stadien und Erscheinungsformen der schwarzen Blattläuse sowie eine Bestimmungstabelle der Gruppen mit Unterteilungen der Bestimmungstabellen der Arten. Bei Aufzählung der einzelnen Arten wird der jetzt gültige Name festgelegt unter Aufzählung der Synonyme, ferner die Morphologie der einzelnen Stadien und Unterscheidungsformen unter genauen Angaben von Körperlänge, -breite usw., geographische Verbreitung, Nährpflanzen, Abbildungen, Infektionsversuche und Biologie. Die Untersuchungen geben dem Standpunkt recht, daß erst die eingehende Kenntnis der Biologie eines Schädlings eine Aussicht auf erfolgreiche Bekämpfung bieten kann. Kunike.

Shimek, B.: Land snails as indicators of ecological conditions. (Landschnecken als Indikatoren ökologischer Bedingungen.) *Ecology* **11**, 673—686 (1930).

Untersucht wurden die Landschnecken und ihre ökologischen Bedingungen im Mississippi-Tal, vor allem in Iowa. Die Verbreitung der Schnecken steht in diesem Gebiet in enger Beziehung zur Verbreitung des Waldes. Der südliche Teil des M.-Tales ist dicht bewaldet, nach Norden und Westen zu wird der Wald lichter und verschwindet schließlich fast ganz. Die Molluskenfauna ist im wesentlichen eine Waldfauna. Der südliche Teil weist viel mehr Schneckenarten auf. Große Schneckenarten sind im Süden häufig, im Nord-Westen selten. Manche Schneckengesellschaften finden sich immer in gewissen Walddtypen. Sie sind dabei meist voneinander nicht der Art, sondern den ökologischen Formen nach verschieden. Die Schnecken des Löß stimmen in dieser Gegend mit den rezenten vollkommen überein. Daraus kann man schließen, daß der Löß unter Bedingungen abgelagert wurde, die den heutigen ähnlich und von diesen weit entfernt waren. Die Schneckenfauna des Löß spricht für die Annahme, daß der Löß äolischer Herkunft war.

Otto Gaschott (München).

Nowak, Willy: Beitrag zur Biologie der *Margaritana margaritifera* in Südböhmen mit besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer rationellen Perlenzucht in diesem Gebiete. (Staatl. Forsch.-Stat. f. Fischerei u. Hydrobiol., Wodňan, Tschechoslov.) *Arch. Hydrobiol.* **22**, 72—128 (1930).

Nach einer Übersicht über die bisher durch die Perlenfischerei Südböhmens gewonnenen Erträgen an Perlen und nach Besprechung der von der Flußperlmuschel allgemein an die Wohngewässer gestellten Anforderungen behandelt Verf. die verschiedenen, von ihm eingehend untersuchten Perlbäche Südböhmens. Er gibt genaue Daten über die Biologie des Tieres an den einzelnen Fundstellen. Dabei wird auf die Ernährungsverhältnisse der Perlmuschel besonderer Wert gelegt und die Mikroflora und -fauna ihres Verdauungstraktes festgestellt. Ferner hat Verf. die Größenmaße und die Schaleneigenschaften der einzelnen Formen bestimmt und den Bau der Schale (Tullbergsche Schichten) berücksichtigt, wobei auf die Beziehungen zwischen den gewonnenen Ergebnissen und der Beschaffenheit des Wassers eingegangen wird. Aus dem Vorkommen von dickschaliger oder dünnchaliger Populationen schließt Verf., daß die Aussichten für eine rationelle Perlenzucht in Südböhmen für die verschiedenen Perlbäche nicht gleich sind. Nach Ansicht des Verf. kann in Südböhmen heutzutage eine rationelle Perlenzucht am ehesten in Horažďowitz und im Flußgebiet der Blanitz betrieben werden. Die Verbreitungskarte der Flußperlmuschel in Südböhmen, Abbildungen von Perlmuscheln der verschiedenen Perlbäche auf 2 Tafeln und 28 Abbildungen im Text erläutern die Arbeit.

Caesar R. Boettger (Berlin).

Carter, G. S., and L. C. Beadle: Notes on the habits and development of *Lepidosiren paradoxa*. (Beobachtungen über die Lebensweise und die Entwicklung von *Lepidosiren paradoxa*.) *J. Linnean Soc. Zool.* **37**, 197—203 (1930).

Die Beobachtungen wurden im Paraquai-Chaco angestellt, wo auch Kerr und andere ihre grundlegenden Arbeiten über den Fisch machten. Die bekannten Tatsachen über den Bau der Wohnröhre bei Trockenheit werden bestätigt. Sie reicht durch 1—2 Fuß dicken ausgetrockneten Schlamm 2—3 Fuß tief in den diesem unterliegenden wasserundurchlässigen Ton. Die Erweiterung, in der der Fisch — ohne Sauerstoff — zusammengerollt liegt, ist mit Wasser gefüllt, das den Fisch bedeckt. Ohne Sauerstoffschicht, die das Wasser aufhält, würde der Fisch austrocknen und wie an der Luft rasch absterben. Der Ton ist schwer knetbar und es bedarf einer großen Muskelanstrengung des Fisches, um in ihm so tief einzudringen. Die Indianer fangen L. dadurch, daß sie das Loch etwas aufgraben, einen Stecken in dieses hineinstecken und den Fisch, der sich daran festbeißt, herausziehen (genau gleich verhält sich *Symptetrichus marmoratus*). Mit den ersten Sommerregen (Anfang bis Mitte Oktober) verläßt L. seine Löcher und schreitet im November zum Laichgeschäft. In nassen Gebieten tritt kein Winterschlaf ein und dieser ist nicht die Vorbedingung zur Laich-

ablage. Das Nest ist, wie von Kerr beschrieben, eine flache Grube in totem Laub und Gras. Verff. machen O_2 -Bestimmungen im Wasser und finden direkt über dem Boden fast kein O_2 . Wie und woher die Eier ihren O_2 -Bedarf decken, ist nicht sicher bekannt, doch ist dieser offenbar sehr gering und die Eier hielten sich in nicht belüfteten Kulturgläsern sehr gut besonders dann, wenn sie aus Schlammnestern stammten, während andere, die aus O_2 -reichem Wasser waren, leichter abstarben. Die Kulturgläser durften nicht zu warm werden (nicht über 27°). Die Eier starben deshalb in offenen Glasschalen, gediehen aber in unglasierten Tongefäßen gut. Frisch abgelegte Eier besitzen eine gallertige Hülle, die aber bald verschwindet. Die frisch geschlüpfte Brut ist wenig empfindlich gegen Temperaturschwankungen. Nach 45 Tagen verschwinden die äußeren Kiemen und die Fischchen gehen zur Luftatmung über. Nach 60 Tagen (4 cm lang) beginnen sie zu fressen. Die Jungen konnten mit Regenwürmern und Lebern von *Ampullaria* gefüttert werden, zogen aber bald pflanzliche Nahrung (die Stengel von *Pistia*) vor. Die Larven sind zunächst farblos und die Pigmentierung beginnt zur Zeit des Gewöhnens an Luftatmung. Bemerkenswert ist, daß die Pigmentzellen einen Rhythmus der Kontraktionen und Expansionen, entsprechend dem Wechsel von Tag und Nacht besitzen, auch wenn sie im Dunkeln gehalten werden; andererseits löst Belichtung bei dunkel adaptierten Larven sofort Kontraktion der Pigmentzellen aus.

Scheuring (München).

Haverschmidt, Fr.: Über das Brüten von *Phalacrocorax carbo sinensis* (Shan & Nodder) im Jugendkleide. *Ardea* 19, 79—82 (1930) [Holländisch].

In Kormorankolonien kommen vielfach einige nicht brütende Tiere vor, welche noch das Jugendkleid (mit weißlichen Flecken auf der Brust und ohne weiße Flanke und Wangenflecken) tragen. Von einigen anderen Vogelarten (Silbermöwe, Fischreiher) ist jedoch bekannt, daß diese auch im Jugendkleide in seltenen Fällen brüten können. Verf. konnte in einer holländischen Kormorankolonie dasselbe feststellen bei einem Tiere im Jugendkleide, das mit einem Ex. in adultem Hochzeitskleide gepaart war und es gelang ihm das betreffende Tier auf seinem Neste zu photographieren.

van Oordt (Utrecht).

Der Organismus und die anorganische Umwelt. Anpassung.

Lodewick, J. Elton: Effect of certain climatic factors on the diameter growth of longleaf pine in Western Florida. (Wirkung einiger Klimafaktoren auf das Dickenwachstum von *Pinus palustris* Miller in W.-Florida.) *J. agricult. Res.* 41, 349 bis 363 (1930).

Das Xylem wird von Februar bis November ausgebildet, die genaueren Daten von Beginn und Ende der Zuwachszeit sind abhängig vom jeweiligen Charakter der Jahreszeit. Ein Einfluß der Temperatur auf die Breite der Jahresringe läßt sich nicht feststellen. Jährliche Schwankungen der Niederschläge in den ersten Wachstumswochen beeinflussen den Zuwachs nicht. Dies mag einmal damit zusammenhängen, daß die Höhe der Niederschläge in dieser Jahreszeit im Verhältnis zu anderen Gegenden hier geringer ist, z. T. aber auch damit, daß aus klimatischen und geologischen Gründen keine nennenswerte Winterfeuchtigkeit aufgespeichert wird. In mehrjährigen Perioden bleibt die Weite des Frühjahrsholzes fast konstant trotz wechselnder Niederschlagshöhe. Demnach ermöglicht die geringe im Boden oder Stamm gespeicherte Wassermenge in den wenigen ersten Wochen der Cambiumtätigkeit infolge der zu dieser Zeit schwachen Atmungsintensität eine Steigerung des Wachstums bis fast zur maximalen Intensität. Hinwieder ist in den allerletzten Wochen der Vegetationsperiode das Wachstum aus inneren oder äußeren Gründen so träge und abklingend, daß es nicht mehr auf Änderungen in der Niederschlagshöhe reagiert. Einen deutlichen Einfluß läßt nur die während des Hauptteiles der Vegetationsperiode fallende Niederschlagsmenge erkennen: Mit steigendem Niederschlag steigt die Breite der Jahresringe und umgekehrt. Eine starke Abweichung von dieser Norm zeigt das Jahr 1920 mit maximalem Niederschlag und

st minimalem Zuwachs. Dieses Jahr läßt sich aber als sehr reiches Samenjahr nachweisen, so daß sehr wahrscheinlich eine direkte Beziehung zwischen Fruchtbarkeit und Zuwachs erkannt ist. Bäume in gesundem Zustande aus den raschwüchsigsten Altersklassen reagieren am deutlichsten auf Veränderungen in der Höhe des Niederhanges. Am Stammquerschnitt ist der Zuwachs in der Richtung des Nord- und Westradius um etwa 5% größer als in der Richtung der beiden anderen Radien. Gar keine Beziehungen bestehen zwischen einseitiger oder allseitiger Entwicklung der Krone und Exzentrizität des Stammes in Brusthöhe, ebenso nicht zwischen Kronenform und Jahresringbreite. — Steht eine ausreichende Anzahl (25 und mehr) von Bäumen zur Verfügung, so genügt die Untersuchung jedes Querschnittes bereits längs eines einzigen Radius statt deren 4 zur Prüfung irgendeines Klimaeinflusses. *Kemmer.*

Bazyrina, K. N., und V. Tschesnokov: Der Einfluß der Luftdüngung auf die Pflanzen. (*Laborat. f. Pflanzenphysiol., Naturwiss. Inst., Peterhof.*) *Planta* (Berl.) **11**, 463 (1930).

Vgl. *Ber. Physiol.* **57**, 572.

Uvarov, B. P.: Wetter und Klima in ihren Beziehungen zu den Insekten. *Z. angew. Entomol.* **17**, 156—177 (1930).

Allgemeiner Bericht über den Einfluß klimatischer Faktoren auf Insekten. Besonders behandelt werden Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschlag, Wind, Luftdruck, atmosphärische Elektrizität, Licht. An Beispielen zu jedem Faktor wird ausführt, daß derartige Einflüsse vorliegen. Wetter und Klima sind für die geographische und ökologische Verteilung der Insekten wichtig, besonders ist das Mikroklima der einzelnen Örtlichkeiten zu berücksichtigen, das oft im Gegensatz zu den von den meteorologischen Stationen mitgeteilten Messungen steht. Der Entwicklungszyklus und die Periodizität der Insekten werden in Beziehung zu Witterung und Klima gestellt. Bei der Gedrängtheit der Darstellung können Einzelheiten in einem Referat nicht gegeben werden.

E. Janisch (Berlin-Dahlem).

Zavadovskij, M.: Die Widerstandsfähigkeit der T.-Larven gegen Austrocknung und chemische Reagenzien. *Trudy Labor. eksper. Biol. moskov. Zooparka* **5**, 235 (1928) u. engl. Zusammenfassung 249 (1929) [Russisch].

Die Widerstandsfähigkeit der Larven von *Trichostrongylus instabilis* Rail, *Tr. probolurus* Rail und *Ostertagia mentulae* Rail ist von dem Alter dieser Larven abhängig. So ertragen 2 Tage alte Larven Austrocknung gar nicht, während 5 Tage alte Larven, bei einer Temperatur von 22° mehr als 2 Monate, wiewohl vollkommen trocken, doch lebensfähig bleiben. Hieraus resultiert die Infektionsmöglichkeit mit aufgewirbeltem Staube. Nach Befeuchtung bewegen die Larven wiederum sich zu bewegen an und das desto eher, je kürzer die Austrocknungszeit. Auch erwecken ältere Larven eher aus ihrer Trockenstarre als jüngere. 5 Tage alte Larven von *Tr. instabilis* fangen nach einer Trockenperiode von 10 Tagen erst nach einer Befeuchtung von 4—40 Stunden wiederum sich zu bewegen an, während dies bei einer Austrocknungszeit von 24 Stunden bereits nach 20—60 Minuten stattfindet. Junge Larven besitzen eine sehr geringe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien: CuSO_4 , HgCl_2 , Formalin. Larven von 3—5 Tage alt können diese Agentien stundenlang ertragen, ohne merkliche Schädigung. Daher ist von Sterilisation des infizierten Bodens nichts zu erwarten. Verbrennen der Fäkalien während der ersten 24 Stunden nach der Defäkation wird empfohlen.

Schuurmans Stekhoven (Utrecht).

Kalabuchov, N.: Der Sommerschlaf der Zieselmäuse. *Trudy Labor. eksper. Biol. moskov. Zooparka* **5**, 163—174 u. engl. Zusammenfassung 175—176 (1929) [Russisch].

Schon einige frühere Autoren waren zu der Ansicht gekommen, daß der Sommerschlaf der Zieselmäuse durch das Vertrocknen der Vegetation hervorgerufen wird. Kalabuchow versucht diese Angaben experimentell zu prüfen. In 44 Fällen wurden Tiere mit trockenem Futter gefüttert, während die Kontrolltiere dasselbe Futter, Wasser aufgeweicht, bekamen. 11 von den untersuchten Tieren verfielen in einen Sommerschlaf. Die Zahl der Atemzüge sank von 57—87 auf 2—5 in der Minute. Zusammenhang damit war der Stoffwechsel bedeutend herabgesetzt. Während der Sommerschlaf 2,7—3,2% ihres Anfangsgewichtes verloren, betrug bei den schlafenden Tieren der Gewichtsverlust bloß 1,1—1,2%. Infolge des geringen Stoffwechsels sank

die Körpertemperatur fast bis auf die Temperatur der umgebenden Luft, die sie nur um 1—2° übertraf. Bei künstlich hervorgerufenen Schwankungen der Zimmertemperatur änderte sich auch entsprechend die Temperatur des schlafenden Tieres, das sich also wie ein poikilothermes Tier verhielt. Der durch Feuchtigkeitsmangel hervorgerufene Schlaf unterscheidet sich in nichts wesentlichem von dem durch niedrige Temperaturen verursachten Schlaf. Bei der Fütterung mit trockenem Futter darf die Temperatur der umgebenden Luft nicht höher als 22° sein. Auch der natürliche Sommerschlaf ist durch das Austrocknen des Futters und durch das Verkröchen in die Schlupflöcher, in denen die Temperatur niedriger als 22° ist, zu erklären. *Taube.*

Kurz, Herman: The relation of p_H to plant distribution in nature. (Über die Beziehungen zwischen p_H und Verbreitung der Pflanzen in der Natur.) *Amer. Naturalist* **64**, 314—341 (1930).

Unter Erörterung der Ernährungsbedingungen für Pflanzen höherer Art bis zu den Algen kommt Verf. zu dem Ergebnis, daß die Reaktion des Bodens unzweifelhaft der wichtigste Faktor ist, vor allem für die Gruppe der Orchideen, Erycaceen u. ä. Es ergibt sich so, daß sehr enge Beziehungen zwischen der Verteilung der Pflanzen und p_H bestehen; es ist daher möglich, aus der bestehenden Vegetation den p_H vorauszusagen. Jedoch können eine große Menge Spezies einen weiten p_H -Bereich aushalten. Außerdem sind auch andere Faktoren von Einfluß, so daß zwei Böden mit gleichem p_H , aber verschiedenen anderen Faktoren auch verschiedene Vegetation zeigen können. Dabei ist es schwer, diese anderen Faktoren auf einen gemeinsamen Generalnenner zu bringen. Erst wenn diese Faktoren genauer festgelegt worden sind, wird es gelingen, den unmittelbaren Einfluß des p_H genau festzulegen. (Vgl. folg. Ref.)

W. Dietsch (Dresden).

Truog, Emil: The p_H requirements of cultivated plants in natural and artificial cultures. (Über die p_H -Bedürfnisse wachsender Pflanzen in natürlichem und künstlichem Boden.) *Amer. Naturalist* **64**, 300—313 (1930).

Verf. stellt fest, daß die chemische Reaktion des Bodens den Pflanzenwuchs direkt und indirekt beeinflusst. Der indirekte Einfluß beruht auf der Einwirkung der Reaktion auf die physikalischen Bedingungen: Veränderung der Aufnahmefähigkeit für die einzelnen Elemente durch gegenseitige Beeinflussung, Verschiebung der Aktivität der Bodenmikroorganismen, der Bedingungen für Pflanzenkrankheiten, der Kraft und Zonen der toxisch wirkenden Elemente und Veränderung der verschiedenen spezifischen aufbauenden Kräfte. Direkte toxische Beeinflussung nur in extrem sauren oder basischen Gebieten, oft jedoch direkte Zerstörung auch möglich durch ungünstiges Gleichgewicht zwischen Basen und Säuren; so braucht „alfalfa“ ein Verhältnis von 2 : 1 Basen gegen Säuren, „timothy“ eins von 1 : 2. Der Boden ist kein homogenes Medium, die Pflanzen müssen daher im allgemeinen die Basen in sauren Böden bevorzugt zur Ernährung heranziehen. Im allgemeinen läßt sich festlegen, daß unter natürlichen Bedingungen die Getreidearten am besten im p_H -Bereich 6 bis 8 wachsen, einige wenige wahrscheinlich infolge indirekter Einflüsse, in saurer Reaktion als p_H 6; in künstlichen Kulturen wachsen die Leguminosen am besten im p_H -Bereich 6 bis 8, die Cerealien und Nichtleguminosen am besten in etwas saurerem Boden. (Vgl. Kurz vorst. Ref. u. Powers folg. Ref.)

W. Dietsch (Dresden).

Powers, Edwin B.: The relation between p_H and aquatic animals. (Über die Beziehungen zwischen p_H und Wasserlebewesen.) *Amer. Naturalist* **64**, 342—366 (1930).

Verf. sucht in eingehenden Behandlungen die Unklarheiten zu beseitigen, die in den Beziehungen zwischen der Wasserstoffionenkonzentration und den in den Lösungen lebenden Wesen bestehen. Er kommt zu folgenden Ergebnissen: Der p_H des natürlichen Wassers ist bestimmt durch Temperatur, die gelösten Stoffe und die CO_2 -Tension. Eine Änderung in der CO_2 -Tension bewirkt eine bestimmte vorauszusagende Änderung im p_H , wenn keine anderen Faktoren diesen beeinflussen; die Beeinflussung wird von der spezifischen Beschaffenheit des Wassers verursacht. Wasserlebewesen sind im allgemeinen imstande, einen großen p_H -Bereichwechsel auszuhalten, werden jedoch von Veränderungen in O_2 , vor allem CO_2 -Tension, stark beeinflusst. Sie sind imstande, den inneren Regulierungsmechanismus in Harmonie zu den äußeren Bedingungen zu bringen. Art und Schnelligkeit dieser Einstellung sind spezifische Eigenschaften der Spezies. Über die Physiologie dieser Einstellung wird vorläufig noch nichts gesagt. (Vgl. vorst. Ref.)

W. Dietsch (Dresden).

Millar, C. E.: Root systems of young corn plants in relation to fertilizer applications. (Das Wurzelwerk junger Maispflanzen und seine Beziehung zu Düngergaben.) (*Soils Sect., Michigan Agricult. Exp. Stat., East Lansing.*) *J. amer. Soc. Agronomy* **22**, 868 bis 873 (1930).

Der Verlauf der Wurzeln junger 20—25 cm hoher Maispflanzen wurde in 4 physi-

sch sehr verschiedenen Bodenarten, in schwerem Lehm, sandigem Lehm, Grabenaushub und lehmigem Sand an je 6—9 Individuen untersucht. Die Wurzeln streichen in diesem jungen Stadium ziemlich flach, sie sind in 15 cm Entfernung von der Pflanze in sandigem Lehm und in Grabenaushub ungefähr 7,5 cm tief, in Lehm schwach 10 cm in Sand stark 11 cm tief. In sandigem Lehm und in Grabenerde hatte sich noch ein zweiter, unterer Kranz von Wurzeln an den Pflanzen gebildet, die aber auch nicht nur ganz wenig tiefer verliefen als die Wurzeln des oberen Kranzes. In 22,5 cm Entfernung von der Pflanze lagen die Wurzeln in Sand 12,5 und in Grabenaushub 7,5 cm in sandigem Lehm schwach 10 cm, in Lehm 12,5 cm tief. Im Sand drangen die Wurzeln unter steilerem Winkel abwärts und wurden viel länger und verzweigter. Eine stärkere Verzweigung in trockenerem und lockerem Boden ist eine bei Wurzeluntersuchungen ziemlich allgemeine Beobachtung. Auf Grund der Untersuchungsergebnisse sollen der Praxis Ratschläge für zweckmäßige Ausbreitung der Kopfdüngung den jungen Pflanzen herum gegeben werden. *Sartorius (Mussbach).*

Eperjessy, Georg: Untersuchungen über die Wurzel Ausbildung auf alkalischem saurem Boden gezüchteter Weizensorten. (*Agrochem. Univ.-Inst., Budapest.*) *Monatsschr. Landw.* 5, 748—751 (1930).

In einer vorhergehenden Arbeit hatte der Verf. gezeigt, daß Weizensorten, die auf alkalischen Böden kultiviert werden, einem alkalischen Substrat besser angepaßt sind als solche, die auf sauren Böden erfolgreich angepflanzt werden und umgekehrt. Da dieselben Wachstumsfaktoren auf oberirdische Teile und Wurzeln oft verschieden wirken, wurden auch Versuche zur Beobachtung des Wurzelwachstums bei verschiedenen Nährmedien durchgeführt. 2 auf alkalischem und 2 auf saurem Boden heimische Weizensorten wurden ausgesät. Je 5 Keimpflanzen wurden in Neubauer-Schalen in sorgsam gereinigtem Quarzgezogen. Nach 10 Tagen wurden sie untersucht. Die oberirdischen Teile hatten alsdann 6—20 cm Länge. Es wurde die Wirkung von Lösungen von Na_2CO_3 , NaHCO_3 , H_2SO_4 , Na_2O_4 sowie Na_2CO_3 plus Gips und plus Moorerde in verschiedenen Konzentrationen untersucht. Bei allen Stoffen förderte hinreichend niedrige Konzentration im Vergleich zu destilliertem Wasser, z. B. 0,2% Sodalösung, das Wachstum. Wie bei den früheren Versuchen an oberirdischen Teilen zeigte sich auch hinsichtlich des Wurzelwachstums, daß alkalisches Substrat auf die Wurzeln der an alkalischen Boden gewöhnten Sorten weniger wachstumsfördernd wirkt als auf die Wurzeln der Sorten aus sauren Böden und umgekehrt. Schließlich wurde noch gefunden, daß Gips die Giftigkeit der Soda stark herabsetzt; dasselbe gilt von Beigabe von 4% Moorboden (p_H 5). *Sartorius (Mussbach).*

Greaves, J. E., and J. Dudley Greaves: The microflora of leached alkali soil. (Mikroflora ausgelaugter Alkaliböden.) (*Dep. of Bacteriol. a. Chem., Utah State Coll. Exp. Stat., Logan.*) *Bot. Gaz.* 90, 224—230 (1930).

Die häufig nur geringe mikrobiologische Aktivität alkalireicher Böden kann durch Entzug des Alkalis eine kräftige Belebung erfahren. Ammonifikations- und Nitrifikationsvorgänge werden verbessert, und die Fähigkeit, den atmosphärischen Stickstoff zu binden, fördert durch Auslaugung des Alkalis eine ganz besondere Förderung. Die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Mikroflora verändert sich zugunsten der mehr nützlichen Lebenswelt. Der Grad des Impulses ist von der Natur der Salze des Bodens, ihrer Konzentration und dem mikrobiologischen Zustand vor der Auslaugung abhängig. Von 68 in Kultur gezüchteten Bakterien der ausgelaugten Böden hatten 38 die Fähigkeit, den atmosphärischen Stickstoff in sterilen Erdkulturen zu binden. Die Versuche wurden einmal mit natürlichem als auch mit einem synthetischen Alkaliboden mit fast gleich gutem Erfolg angestellt. *Engel (Berlin-Dahlem).*

Kuron, H.: Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche an Erdböden, Tonen und verwandten Stoffen. (*Agrikulturchem. u. Bakteriolog. Inst., Univ. Breslau.*) *Z. Pflanzenkrankh.* Tl A 18, 179—203 (1930).

Die Versuche zur Feststellung der Gesamtoberfläche wurden durch die Bestimmung der Wasserabgabe- und -aufnahmekurven von Böden, Bodenfraktionen, Tonen, Quarzen und Permutiten vorgenommen. Aus den Versuchen wurde gefunden, daß bei niedrigen Dampfdrücken für alle Stoffe die Ostwald-Freundlichsche Gleichung $a = \alpha p^{\frac{1}{n}}$ (a ist die von 1 g Adsorbens adsorbierte Menge Gas bzw. Dampf, p der Gleichgewichtsdruck; α und $\frac{1}{n}$ sind Konstanten) für die Adsorptionisotherme gilt. Für Böden, ihre Fraktionen und Tonen ist der Adsorptionsexponent $(\frac{1}{n})_{20}$ angenähert gleich, man kann daher den Adsorptionskoeffizienten $(\alpha)_{20}$ zur Vergleichung der Oberflächengrößen verwenden. (Der Index $_{20}$ bezieht

sich auf die Versuchstemperatur.) Nach dem Verhältnis a_{20}/a_{50} lassen sich die untersuchten Böden und Tone in bestimmte Gruppen teilen. Die Wasseraufnahme des Bodens setzt bei den verschiedenen Dampfdrücken additiv aus denen der Fraktionen zusammen. Wendepunkt der Entwässerungskurven befindet sich bei demselben relativen Dampfdruck. Die aus diesem Wendepunkt unter Annahme einer 10 molekularen Adsorptionsschicht berechneten Oberflächenwerte stehen in keinem Widerspruch zu den Eigenschaften dieser Stoffe. Die Kurven der Permutite haben ein anderes Aussehen; bei tiefen Drücken scheint $\log a - \log p$ -Kurve von der Geraden abzuweichen; sie leiten damit zu den natürlichen Zeolithen über.

Günther (Landsberg a. d. Warthe)

Der Organismus und die organische Umwelt.

Parasitismus. Bakterieneinflüsse auf Pflanzen und Tiere.

Yakimoff, W. L.: Zur Frage über Parasiten bei Protozoa. (*Parasitol. Labor-Tierärztl. Hochsch., Leningrad u. Protozool. Abt., Wissenschaftl. Forsch.-Inst. Rostov a. W.*) Arch. Protistenkunde **72**, 135—138 (1930).

In dieser Mitteilung wird die Literatur über die Parasiten der Protozoen seit 1890 gesprochen. Die Parasiten werden mit ihren Wirten angeführt. Eigene Beobachtungen werden über Parasiten von *Trichomonas batrachorum* aus dem Darm von *Rana viridis* und *Hyla arborea* mitgeteilt. Es wurde neben dem Kern der *Trichomonas* aus *Hyla* ein Fremdkörper gefunden, sowie in einigen Exemplaren im Protoplasma zerstreut oder in Klümpchen verteilte kokkenartige Körper von 1,0—1,5 μ Größe. Im ganzen waren 1,89% infiziert. Diese Gebilde hält Yakimoff für einen Coccus und benennt es *Micrococcus batrachorum*. Entz (Tihany).

Smith, Leslie M.: Further observations on the protozoan *Tettigonospora* (new name for *Coccospora* Smith, 1929). (Weitere Beobachtungen über das Protozoon *Tettigonospora* [neuer Name für *Coccospora* Smith, 1929].) Univ. California Publ. Zool. **33**, 445—447 (1930).

In einer vorläufigen Mitteilung (1929) hat Verf. unter dem Namen *Coccospora stenopelmatis* eine neue Gattung und Art einer Darmgregarine beschrieben, die im Darm von 2 Orthopteren aus der Familie der Grylliden (*Stenopelmatus fuscus* und *pictus*) aufgefunden wurde. Da Verf. inzwischen darauf aufmerksam wurde, daß der Gattungsnamen *Coccospora* bereits durch Kudo für eine Microsporidie vergeben ist, so ändert er jetzt die Gattungsnamen der Orthopterengregarine in *Tettigonospora* um. Infektionsversuche mit Sporenverfütterung fielen bei Vertretern anderer Gryllidengattungen, so bei *Ceuthophilus* und *Gryllus assimilis* negativ aus. Dagegen gelang es, außer bei den beiden schon genannten *Stenopelmatus*-arten auch bei *Stenopelmatus intermedius* durch Sporenverfütterung Infektion zu erzielen. Sporen, die von erkrankten *Stenopelmatus*-exemplaren mit den Exkrementen ausgeschieden wurden, blieben 36 Tage lang infektiös. Mit Sporen, die 43 Tage lang aufbewahrt wurden, konnten dagegen Infektionen nicht mehr erzielt werden.

Weissenberg (Berlin).

Schilling, Claus, and Hans Schreck: The influence of passage through the invertebrate host on the biological characters of parasitic protozoa. (Der Einfluß von einer Passage durch den wirbellosen Zwischenwirt auf die biologischen Eigenschaften von parasitären Protozoen.) (*Inst. f. Infektionskrankh., Robert Koch, Berlin.*) Ann. trop. Med. **24**, 437—442 (1930).

Bekanntlich verlieren Protozoen und Spirochäten im Verlaufe chronischer Infektionen ihre Reaktionsfähigkeit auf Serumantikörper; es bilden sich serumfeste Stämme; eben so gibt es giftigste Stämme. — Verf. haben sich nun gefragt, was aus diesen serum- und giftigsten Stämmen wird nach einer Passage durch einen wirbellosen Wirt. — Ein alter Laboratoriumstamm und ein wilder Gnu-Stamm dienten ihnen dabei als Versuchsstämme. Anfanglich war der alte Laboratoriumstamm viel virulenter als der wilde Gnu-Stamm. Eine einmalige Passage durch *Glossina morsitans* genügte jedoch, um die Virulenz herabzusetzen und auf diejenige des wilden Stammes, die immer durch Insektenpassage überbracht wurde, zu bringen. Durch Passage ändert sich der resistente Stamm in einen originellen wilden Stamm.

Schuurmans Stekhoven (Utrecht).

Kofoed, Charles A., and Herbert G. Johnstone: The oral amoeba of monkeys (Die Mundamöben der Affen.) Univ. California Publ. Zool. **33**, 379—392 (1930).

Die Autoren untersuchten 34 Exemplare von *Macacus rhesus* und 5 Exemplare von *Macaca cynomolgus* auf das Vorkommen von Mundamöben, und zwar 27 M. rhesus aus Indien, von welchen 15 infiziert waren, 3 M. r. aus Hongkong, welche alle infiziert waren, 4 M. r. aus Java, welche ebenfalls alle infiziert waren. Die 5 M. c. stammten aus China und alle sind infiziert gewesen. Die gewonnenen Amöben wurden nicht nur lebend und fixiert (Schaudinn)

gefärbt in toto mit E.H. nach Heidenhain), aber auch gezüchtet (in Locke's Eialbumin). Aus den sehr genauen Studien der Morphologie und des Benehmens und aus der identischen Morphologie und dem Benehmen wird darauf geschlossen, daß die in den Affen vorkommende Mundamöbe mit der Mundamöbe des Menschen identisch, d. h. *Entamoeba gingivalis* ist. Aus der großen Anzahl der infizierten Affen ist es ersichtlich, daß die Infektion der Affen eine ursprüngliche, nicht vom Menschen ausgehende ist. Als Nahrung werden Leukocyten, manchmal auch rote Blutkörperchen gefunden. Die Befunde werden auf 2 Tafeln (eine Tafel Handzeichnung, die zweite Photos) dargestellt. Die Literatur wird in der Einleitung besprochen und am Ende der Arbeit zitiert.

Entz (Tihany).

Schumaker, Eugene: *Balantidium coli*: Host specificity and relation to the diet of an experimental host. (*Balantidium coli*: Wirtsspezifität und Verhalten zur Verdauung eines Versuchswirtes.) (*Dep. of Protozool., Johns Hopkins School of Hyg. a. Public Health, Baltimore.*) Amer. J. Hyg. 12, 341—365 (1930).

Experimentelle Beobachtungen mit dem bekannten heterotrichen Infusor des Darmes ergaben die Unverwendbarkeit von Meerschweinchen, bei denen die maximale Dauer der Infektion nur 18 Tage beträgt; dagegen wurden bei Ratten Teilungs- und Konjugationsstadien beobachtet, Cystenbildung dürfte wahrscheinlich unterbleiben. Gegen bestimmte Diäten waren die Parasiten auffallend empfindlich, Milchdiät oder Fütterung mit 70% Casein des Wertes sagte ihnen nur wenig zu. Ein Futter, das 95,5% Kohlehydrate enthält, ließ sie sehr gut gedeihen, ohne daß sie den Ratten jemals pathogenetisch geworden wären. Die Infektion wurde durch Injektion von Stärkelösung in gelatinöser oder granulöser Form, zugleich mit den Balantidien, hervorgerufen; die Summe der Beobachtungen erscheint auch tabellarisch dargestellt.

v. Querner (Wien).

Hegner, R., and H. J. Chu: A survey of Protozoa parasitic in plants and animals of the Philippine Islands. (Eine Übersicht der in Pflanzen und Tieren parasitierenden Protozoen auf den Philippinen.) (*Dep. of Parasitol., School of Hyg. a. Public Health, Univ. of the Philippines, Manila.*) Philippine J. Sci. 43, 451—480 (1930).

Die Verf. geben eine vorläufige Übersicht über die von ihnen festgestellten parasitierenden Protozoenarten. Sie fanden in Menschen: *Entamoeba coli*, *Endolimax nana*, *Trichomonas hominis*; Affen: *Entamoeba histolytica*, *E. coli*, *E. gingivalis*, *Endolimax nana*, *Dientamoeba fragilis*, *Giardia lamblia*, *Trichomonas hominis*, *T. buccalis*, *T. vaginalis*, *Chilomastix mesnili*, *Balantidium coli* und Flagellaten, welche *Embadomonas*, *Tricercomonas* sowie *Hexamita* ähnlich waren; Schweine: *Balantidium (coli oder suis)*; Hunde: *Giardia canis*, *Trichomonadinen*; Kaninchen: *Eimeria*-Arten, *Giardia* und *Trichomastix*; Meerschweinchen: *Trichomonadinen*; Laboratoriumsratten: *Giardia muris*, *Hexamita muris*, *Trichomonas muris*, *Chilomastix bettencourti*, *Entamoeba muris*; Zibethkatzen: *Giardia* (über diese *Giardia*-Art wird eine andere Arbeit erscheinen) und Coccidien; verschiedenen Vogelarten: *Trichomonas*, *Giardia*, *Haemoproteus*, Coccidien, Plasmodium; Iguaython: *Trichomonadinen* und Coccidien; Iguana: *Trichomonadinen*; Mabuya (Eidechse): *Trichomonadinen*; Fröschen: *Trypanosomen*, *Trichomonas*, *Hexamita*, *Balantidium*, *Entamoeba ranarum*, *Endolimax ranarum*, *Chilomastix*, Coccidien und Opalinen; Musca: *Herpetomonas*; Anopheles: Coccidien; Periplaneta: *Nyctotherus ovalis*, *Entamoeba thomasi*, *Hexamita periplanetae*, *Retortomonas orthopterorum*, *Entamoeba blattae*, *Lophomonas variata*, *Lophomonas blattarum* und Gregarinen; Schnecken (*Ampullaria*): *Balantidium pughwouti* und in der Pflanze *Euphorbia hirta*: verschiedene Flagellentypen (*Phytomonas*).

B. J. Krijgsman (Buitenzorg).

Bruyn Ouboter, M. P. de: Research into the morphological differences between *Tylenchus devastatrix* Kühn of the hyacinth and *Tylenchus devastatrix* Kühn of the crocodyl. (Die zwischen *Tylenchus devastatrix* Kühn vom Hyacinth und *T. devastatrix* Kühn vom Narziss bestehenden morphologischen Unterschiede.) (*Zool. Laborat., Univ., Leiden.*) Tijdschr. nederl. dierkd. Verigg III s. 2, 54—57 (1930).

Auf Grund von biometrischen und morphologischen Studien kommt Verf. zum Resultat, daß es einen bestimmten Unterschied zwischen *T. devastatrix* von Hyacinth und *T. devastatrix* von *Narcissus* gibt, namentlich in der Form der Amphiden, dessen Umgrenzung bei der Form der Hyacinthe beiderseitig konvex, bei der des *Narcissus* einseitig konkav ist.

Schuurmans Stekhoven (Utrecht).

Taylor, E. L., and H. A. Baylis: Observations and experiments on a dermatitis-producing cercaria and on another cercaria from *Limnaea stagnalis* in Great Britain. (Beobachtungen und Versuche mit einer Cercarie, welche eine Dermatitis hervorruft, und mit einer anderen Cercarie aus *Limnaea stagnalis* in Großbritannien.) (*Dep. of*

Zool., Brit. Museum Nat. History, London.) Trans. roy. Soc. trop. Med. Lond. **24**, 219 bis 244 (1930).

Verf. besprechen die Versuche mit 2 Gabelschwanzcercarien und knüpfen mit ihrem Beobachtungen an die Arbeit von Matheson 1930 an. Die erste Form ist ihrem biologischem Verhalten nach, wie auch morphologisch, offenbar identisch mit *Cerc. ocellata* La Val. der modernen Autoren und möglicherweise auch mit *Cerc. elvae* Müller. Wie experimentell nachgeprüft wurde, besitzt sie das Vermögen, in die Haut von Säugetieren aktiv einzudringen und ruft auch beim Menschen eine deutliche Dermatitis hervor. Möglicherweise gehört diese Cercarie zu den Schistosomiden und ist mit *Bilharziella* verwandt. Die zweite Form bezeichnen die Autoren bloß als *Cercaria x*; sie ist nicht ocellat. Als Zwischenwirt kommt auch hier *Limnaea stagnalis* in Betracht; als zweiter Wirt verschiedene Fische. Die menschliche Haut vermag diese Form nicht zu infizieren. Ihre Entwicklung zur Metacercarie, *Diplostomulum*, wird beschrieben; sie erfolgt in der Augenlinse des Zwischenwirtes, wohin der Parasit nach Einwandern per cutan gelangt. Die Infektion ist für den Wirt meist tödlich, wie auch aus der Literatur über ähnliche Fälle hervorgeht. Diese Form dürfte mit *Diplostomulum* nahe verwandt sein, und wahrscheinlich in Vögeln parasitieren. v. Querner (Wien).

Vitzthum, H. Graf: Die Bombus-Parasiten. Der „Acarologischen Beobachtungen“
15. Reihe. (Preuß. Inst. f. Bienenkunde, Berlin-Dahlem.) Zool. Jb. Abt. System., Ökol. u. Geogr. **60**, 1—45 (1930).

Systematisch, betreffend die auf *Bombus* vorkommenden Milben der Gattung *Parasitus*, eingeleitet durch eine sehr gründliche historisch-kritische Betrachtung, was unter *Acarus coleopratorum* zu verstehen ist. Einer gleichen Kritik wird *Parasitus fucorum* unterworfen, hierbei auf viele Details der äußeren Morphologie des Chitins eingegangen, was dann von einigen Arten, darunter mehreren neuen, der Gattung *Parasitus* unter Beigabe von schönen Strichzeichnungen fortgesetzt wird. L. Freund (Prag).

Tucker, B. W.: On the effects of an epicaridan parasite, Gyge bronchialis, on Upogebia littoralis. (Über die Einwirkung eines epicariden Schmarotzers, *Gyge bronchialis*, auf *Upogebia littoralis*.) Quart. J. microsc. Sci. **74**, 1—118 (1930).

Der Verf. hat hier die erste mehr eingehende Untersuchung über die Einwirkung der epicariden Isopoden auf das Wirtstier vorgelegt. *Gyge bronchialis* ist in Neapel allgemein und 1924, in welchem Jahre das Material hauptsächlich eingesammelt wurde, waren 21,5% von *Upogebia* von diesem Schmarotzer infiziert. Das Festsetzen des Schmarotzers geschieht, wenn der Wirt noch jung und unter einer Länge von 17 mm ist. Das Wirtstier erreicht ein Alter von mindestens 3 Jahren, und das Leben des Schmarotzers scheint nicht bedeutend kürzer zu sein. Der Schmarotzer scheint keine schädliche Einwirkung auf das Wachstum und die Häutung des Wirtes auszuüben. Die Einwirkung auf die äußeren Geschlechtscharaktere ist nur bei dem Männchen des Wirtes bemerkbar. Die Scheren bei dem Männchen von *Upogebia* sind verhältnismäßig groß und breit, diejenigen des Weibchens dagegen auffallend schlanker. Das Wachstum der Scheren bei normalen und infizierten Tieren wird graphisch dargestellt. Es wird gezeigt, daß die Scheren der Männchen deutlich feminisiert werden, diejenigen der Weibchen zeigen dagegen normale Wachstumsverhältnisse. Infizierte Männchen entwickeln auch die ersten Abdominalfüße, welche normal nur bei den Weibchen vorhanden sind. Die Geschlechtsöffnungen scheinen dagegen in beiden Geschlechtern unverändert zu bleiben. Der Verf. beschreibt dann die normale Struktur der Gonaden von *Upogebia* und die Einwirkung des Schmarotzers auf die innere Organisation. Oocyten werden gewöhnlich in den Testikeln von normalen Männchen angetroffen. Die infizierten Männchen zeigen verschiedene Stadien von nur wenig reduzierten bis ganz atrophierten Testikeln. Die Oocyten werden gewöhnlich zahlreicher und weiter entwickelt als bei normalen Männchen. Bei der Mehrzahl der infizierten Weibchen fehlen die Gonaden ganz. Wenn die Gonaden im reduzierten Zustand angetroffen werden, enthalten sie immer nur weibliche Geschlechtszellen, wie bei den normalen Weibchen. Die Einwirkung des Schmarotzers auf den Wirt äußert sich also als eine Feminisierung des Männchens. Im letzten Abschnitt der Arbeit werden mit der vorhandenen Literatur Vergleiche angestellt und die parasitäre Kastration bei den Crustaceen allgemein diskutiert. Sven Runnström (Bergen).

Biogeographie.

(Umwelteinflüsse nach geographischen Gegenden. Erdgeschichtliche Beziehungen der Flora und Fauna; Vorkommen und Verbreitung der Pflanzen und Tiere nach bestimmten Gegenden; Tierwanderung.)

Gross, H.: Das Problem der nacheiszeitlichen Klima- und Florentwicklung in Nord- und Mitteleuropa. Beih. z. bot. Zbl. II **47**, 1—110 (1930).

Die Anschauungen über die postglaziale Klima- und Florentwicklung war im

zten Jahrzehnte überwiegend von der Blytt-Sernanderschen Klimawechsellehre herrscht, welche einen mehrmaligen Wechsel von feuchteren und trockeneren Klimaperioden angenommen hatte, und zwar eine ältere „boreale“ Trockenzeit in der Anuluszeit und eine jüngere „subboreale“ im Spätneolithicum und Bronzezeit. In letzter Zeit mehren sich die Bedenken gegen ihre volle Geltung. Der Kritik dieser Theorie tritt in erster Linie auch diese Arbeit. In umsichtiger Weise ist ein reiches Tatsachenmaterial für die Beurteilung der nacheiszeitlichen Klima- und Florengeschichte aus dem überaus umfangreichen Schrifttum zusammengetragen und kritisch ausgewertet. Die astronomische Grundlage für die Klimarekonstruktion liefert die Sonnenstrahlungscurve von Milankovitsch, die aber noch nicht in dem Maße, wie es Verf. tut, in Betracht genommen werden darf. An geologischen Grundlagen sind die Meeres- und Gletscherschwankungen, die Daten über den Eisrückzug und die klimatischen Bodenveränderungen (Dünen, Ortstein, Schwarzerde usw.) mit in Betracht gezogen. Die wesentlichste Basis für die Klimageschichte liefert aber die Florengeschichte, die sich aus den paläofloristischen Funden, insonderheit aus der Pollenanalyse ableiten läßt. Sie spricht dafür, daß dem Glazial und Subglazial eine Wärmezeit, wärmer als heute, folgte, die von der Ancyclus- bis zum Ende der Litorinazeit reichte. Im 1. Abschnitt derselben Zeit hohe Sommertemperaturen, daher rel. sommertrocken, strengere Winter. Im 2. Abschnitt Milderung der Jahresschwankung, Zunahme der Feuchtigkeit, während der Bronzezeit (Limäazeit) Ausklang der Wärmezeit, Übergang zum heutigen Klima. Für eine ausgeprägte Trockenzeit am Ende der Wärmezeit (Subboreal) spricht keine geschichtliche Tatsache. Die Ergebnisse der pollenanalytischen Waldgeschichte zeigen vielmehr, wie schon mehrseitig festgestellt wurde, im Widerspruche mit einer solchen Annahme, da gerade in der entsprechenden Zeit in Mitteleuropa die Massenausbreitung der atlantischen Buche und Tanne, im Norden die der Fichte erfolgt. Die Annahme dieser subborealen Trockenperiode hatte sich aus der Untersuchung von Seeablagerungen, Tuffen und Mooren ergeben. Verf. überprüft nun eingehend diese Beweisgründe. Die nachgewiesenen Wasserstandsschwankungen in Seen und Mooren können auch durch die Landhebung, besonders die ungleiche Landhebung (Überkipfung) bedingt und daher auch in weiten Gebieten synchron sein. Die Mehrzahl der schwedischen Seen hätte überdies nach Lundqvist während der ganzen Wärmezeit den tieferen Wasserstand gehabt. Von den stratigraphischen Trockenhorizonten ist der Teil nicht klimatisch, sondern edaphisch bedingt (Zwischenmoorwälder). Sicher klimatisch bedingt ist aber auch nach Verf. die regional weit verbreitete diskordante Gliederung des Hochmoortorfes in hochzersetzten „älteren“ und schwachzersetzten „jüngeren Sphagnumtorf“, getrennt durch den „Grenzhorizont“ (subboreal-atlantischer Kontakt). Weber hat bekanntlich diese Diskordanz im Zersetzungsgrad durch die Annahme einer säkularen trockeneren Klimaperiode erklärt, in der der ältere Sphagnumtorf tiefgehend zersetzt und der Grenztorf gebildet wurde. Nach archäologischer Datierung entspricht die Grenzhorizontzeit NW.-Deutschlands auch ziemlich dem Subboreal Sernanders. Gegen diese Erklärung spricht aber die von Verf. erhobene Verbreitung der Erscheinung, die gerade nur in feuchteren Klimagebieten sich entwickelt ist in kontinentaleren Gebieten, z. B. Ostpreußen, verschwindet, unter die floristische Zusammensetzung des typischen Grenztorfes und vor allem unter die gleichzeitige Entwicklung in der Waldgeschichte. Verf. sucht daher nach einer anderen Erklärung. Der „ältere Sphagnumtorf“ wäre nicht nachträglich in einer nachfolgenden trockeneren Periode zersetzt worden, sondern schon primär während seiner Bildung. Seine besondere Beschaffenheit erkläre sich daraus, daß er unter dem anderen Klima, nämlich in der Wärmezeit, gebildet wurde, während der jüngere Sphagnumtorf erst nach der Wärmezeit zur Bildung kam. Der Grenzhorizont markiere also nur den Klimaumschlag, nicht eine eingeschaltete, trocknere Periode. Die Moore, welche einen typischen älteren Sphagnumtorf aufweisen, hätten während der milderen Wärmezeit den Charakter von „atlantischen Hochmooren

mit Stillstands- und Erosionskomplexen“ etwa wie die heutigen britischen Hochmoore, später mehr den Typus der östlicheren Hochmoore mit Regenerationskomplexen entsprechend der Änderung des Klimacharakters nach der Wärmezeit. Um die Schärfe des Kontaktes zu erklären, nimmt Verf. außer der Temperaturniedrigung noch eine Abnahme der Niederschläge an. Der Grundgedanke dieser Erklärung ist eine wertvolle Anregung, wie der scheinbare Widerspruch zwischen dem stratigraphischen und pollenanalytischen Befunde erklärt werden könnte. Sie bedarf aber nun ihrerseits wieder der Überprüfung. Die Übertragung der Erklärung z. B. auf die Gebirgshochmoore bereitet auch dem Verf. schon sichtliche Schwierigkeit. Seine gesamte Anschauung über den Gang der Klima- und Florentwicklung faßt Verf. für das Nord- und Ostseegebiet zum Schlusse tabellarisch zusammen. Es ergibt sich eine wesentliche Übereinstimmung mit den älteren Anschauungen von G. Andersson. Die Einwanderung der xerothermen Florenelemente verlegt auch er in den ersten Abschnitt der Wärmezeit. Die Blytt-Sernadersche Periodenbezeichnung wird auch in rein chronologischem Sinne ganz abgelehnt.

Karl Rudolph (Prag).

Katz, N. J.: Zur Kenntnis der oligotropen Moortypen des europäischen Rußlands. Beih. z. bot. Zbl. II 47, 177—210 (1930).

Die Arbeit schließt an eine Veröffentlichung des Verf. im 46. Bd. (2. Abt., S. 270 bis 394) derselben Zeitschrift unter dem Titel „Zur Kenntnis der Moore Nordosteuropas“ an (vgl. diese Ber. 15, 630), die merkwürdigerweise weder im Text noch im Literaturverzeichnis der vorliegenden angeführt ist. Vielmehr erwähnt Verf. nur 2 deutschgeschriebene (vgl. diese Ber. 7, 663) und eine russische Arbeit mit „ausführlicher deutscher Zusammenfassung“ (1928). Leider sind alle 3 dem Ref. unbekannt. Nach einer Bemerkung des Verf. ist die vorliegende Arbeit eine um einige neue Feststellungen bereicherte Wiedergabe der letztgenannten. Doch auch mit der obenerwähnten vor $\frac{1}{2}$ Jahr veröffentlichten, hat sie vieles gemeinsam. Ihre größere Hälfte („Moortypen“, 15 Seiten) war in jener, wenn auch etwas kürzer, schon enthalten. In erster Linie sind 2 Moortypen, bei denen Flechten wesentlich beteiligt sind und arktische „Torfhügelmoore“ hinzugefügt, die dem Verf. inzwischen aus der Literatur bekannt geworden sind. Diesmal werden im ganzen weniger Einzelheiten, dafür eine Gruppierung der Moortypen vom geographischen Gesichtspunkte, speziell in N-S- und O-W-Richtung gebracht. Die Gruppierung ergibt 9 Gebiete, die sich auf eine nördliche, mittlere und südliche Zone verteilen. Charakterisiert sind Gebiete und Zonen durch Fehlen oder Vorhandensein bestimmter Moortypen, deren spezielle Ausbildung (geographische Varianten) und deren Rolle als Initial- oder Terminalphasen in der Entwicklung der Moore. Die Typen sind durch morphologische Eigentümlichkeiten der Moore (Wölbung der Oberfläche, Schlenkenbildung usw.), wie durch floristische Komponenten charakterisiert, wie *Rubus chamaemorus* und *Betula nana*, deren Arealgrenzen mit denen der Zonen etwa zusammenfallen. G. Kretschmer (Darmstadt).

Christiansen, Willi: Florenkontrast und Florengefälle in und um Schleswig-Holstein. Ber. dtsch. bot. Ges. 48, 276—285 (1930).

Unter Florenkontrast versteht man den zahlenmäßig ausgedrückten Unterschied im Artenbestand zweier Gebiete; das Florengefälle gibt an, wie viele Arten auf einer Strecke von 100 km neu auftreten bzw. verschwinden. Berechnet man diese Werte für Schleswig, Holstein und die benachbarten Gebiete, so ergibt sich ein starkes Florengefälle von allen Seiten nach Schleswig hin, das mithin ein besonders pflanzenarmes Gebiet darstellt. Am stärksten ist das Gefälle von Holstein nach Schleswig. Es ist hier so stark, wie es sonst nur in Gebieten mit erheblichen Unterschieden im geologischen und morphologischen Aufbau des Untergrundes vorkommt. Hier sind wahrscheinlich die Niederschlagsmengen dafür verantwortlich zu machen. Aber auch von den dänischen Inseln und von Jütland her ist ein starkes Florengefälle zu beobachten. Der Verf. gibt dafür keine Erklärung, doch dürfte dafür wohl in erster Linie die Verbreitung

Kreideformation in Dänemark verantwortlich zu machen sein. Bemerkenswert noch, daß mehrere Arten Areallücken in Schleswig haben, während sie in Holstein und Jütland verbreitet sind.

Oskar Schwartz (Hamburg).

Stojanoff, N.: Versuch einer Analyse des relikten Elements in der Flora der Balkanhalbinsel. Bot. Jb. Systematik usw. **63**, 368—418 (1930).

Die Phylogenese jeder Sippe beginnt mit einer progressiven Entwicklung, gekennzeichnet durch morphologische und ökologische Plastizität, erreicht ihr Optimum, geht in eine rezessive Phase — kann sich nicht mehr ändern und anpassen — und wird schließlich im letzten Stadium „innerer Erschöpfung“ von jungen Konkurrenten verdrängt. Da nach dem Optimum das Areal nicht weiter ausgedehnt wird, gilt die Age- und Area-Theorie von Willis nur für Sippen, die ihr Optimum noch nicht überschritten haben. Unter „relikten“ Pflanzen versteht Verf. nicht nur rezessive, sondern alle, die seit einer bestimmten Periode ein Gebiet bewohnen, nicht nachträglich eingewandert sind — im vorliegenden Fall diejenigen, die seit dem Tertiär auf der Balkanhalbinsel heimatisch sind. Er unterscheidet unter den rezessiven zwischen biologisch-konservativen, die durch ihre starren ökologischen Ansprüche im Verlauf klimatischer Änderungen auf ein kleines Gebiet zurückgedrängt wurden, dagegen oft in Gegenden, die von der Heimat völlig verschieden sind, gut gedeihen, und zwischen degenerierenden, deren reduziertes Areal das Klima allein nicht verantwortlich gemacht werden kann, sondern mehr andere Faktoren, wie Sterilität, mitwirken müssen. Die Balkanhalbinsel beherbergt zahlreiche Vertreter beider Typen. Sie zeigen bestimmte Parallelitäten ihrer Verbreitung. Verf. stellt 4 Hauptbezirke fest. Der östliche zeichnet sich durch biologisch-konservative hygrophile, der griechische durch thermophile (mediterrane) Elemente aus. Alle 4 haben neben gemeinsamen eigene Beziehungen zu Vorderasien, die den östlichen näher zu Asien als Europa stellen, bei dem westlichen tertiäre Verteilung entsprechen. Alle 4 haben ihre eigenen Degenerate. Im zentralen Bezirk entspricht deren Verbreitung der Orographie früherer Epochen. Als Vertreter weiter verbreiteter Relikte werden Stieleiche (progressiv) und Buche (Optimum überschritten) eingehend besprochen.

G. Kretschmer (Darmstadt).

Szepesfalvi, J.: Weitere Beiträge zur fossilen Flora des Alföld's. (Ungarisches Tiefland.) Magy. bot. Lap. **29**, 6—13 (1930).

Die Leitpflanzen der diluvialen Moosflora der ungarischen Tiefebene (Funde von Kispeleghyáza) sind *Hypnum* *Hollósianum*, *Scorpidium* *scorpioides* und *Drepanocladus* *sp.*, die heutzutage sämtlich nur die Moore der das Alföld umgrenzenden Gebirge bewohnen. Sie sind für dieselbe Vegetation bezeichnend, die durch Lärche und Arve daselbst vertreten sind. Die Pollenfunde sind sehr mangelhaft. — Verf. beschreibt die Flora und Vegetation der diluvialen Moore und der dazwischen liegenden trockenen Coniferenwälder, die vom Ref. (Ecology 1929) als subglazial bestimmt wurden. Die Behauptung des Verf.s, daß im Gestein des Alföld während des Pleistocens keine Klimaveränderungen bzw. interglaziale Perioden vorgekommen sind, steht mit anderen Tatsachen in Widerspruch. (Ref. hat schon in dem oben zitierten Artikel darauf hingewiesen, daß die neuesten Bohrungsergebnisse von Treitz, Scherf, Krusitzky auf mehrere Klimaperioden schließen lassen.) Es ist zu bedauern, daß der Verf. die neuere Literatur, die Klima- und Vegetationsgeschichte des Alföld behandeln, wenig berücksichtigt hat.

R. v. Soó (Debrecen).

Sanderson, Ann R.: The coelenterate plankton of the Northumbrian coast during the year 1924. (Das Cölenteraten-Plankton der Northumberlandküste im Jahre 1924.) Mar. biol. Assoc. U. Kingd., N. s. **17**, 219—232 (1930).

Die im Jahre 1924 beobachteten Formen werden kurz einzeln behandelt; zu 22 vorher schon festgestellten Spezies kommen 9 weitere jetzt erstmalig gefundene hinzu.

Wulff (Helgoland).

Caillol, Henri: Faune dichotomique des coléoptères de provence. (Dichotomische Fauna der Coleopteren der Provence.) Ann. Mus. Hist. natur. Marseille **23**, 1—174 (1930).

Ein Schlüssel zum Bestimmen aller bis jetzt in den Departements Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes und Vaucluse festgestellten Arten. Es sind, ungerechnet

die Unterarten, Varietäten und Aberrationen, nahezu 6000 oder etwa 60% Gesamtfrankreich. Verf. hat Synonymie, Literatur, Biologie, Metamorphose, Parasitologie, geographische Verbreitung, deren Berücksichtigung man sonst von einer „Fauna“ erwartet, nicht hier, sondern in seinem früheren Catalogue des Coléoptères de Provence nach Möglichkeit berücksichtigt. Beide Werke sollen sich gegenseitig ergänzen. Das hier vorliegende nimmt für sich in Anspruch, auf kritischen Nachprüfungen zu beruhen und soweit angängig alte, von Autor zu Autor weitergegebene Irrtümer berichtigt zu haben. Die vielfach eingerissene übermäßige Aufteilung, „Pulverisierung“ alter Artbegriffe mit Schaffung unnötiger neuer Artnamen wird verworfen. Überall ist die dichotomische Aufteilung von der Unterordnung über die Familie, Gattung, Untergattung bis zur Art, Unterart, Varietät, Aberration konsequent durchgeführt. Die in dem Schlüssel enthaltenen Genera sind am Schluß in einem alphabetischen Index zusammengestellt.

Kuhlitz (Berlin).

Hummel, K.: Termitenbauten und ihre geologische Bedeutung. Natur u. Mus. 60, 356—363 (1930).

Verf. zeigt auf Grund seiner Studienreise, daß die Erdbewegung durch Termiten auf die Flächeneinheit berechnet im afrikanischen Trockenwald sicher nicht geringer ist als die Erdbewegung durch Menschen in dicht besiedelten Teilen Europas. Nord-Rhodesien und Katanga sind also eigentlich vielmehr ein Land der Termiten als ein Land der Menschen. „Zweifelloso haben wir es bei der Lebenstätigkeit dieser Tiere mit einem Vorgang zu tun, der nach Art und Ausmaß geologische Bedeutung haben muß; insbesondere müssen die Termiten Einfluß auf Verwitterung und Bodenbildung haben [vgl. diesbezüglich Branner, C.: Geologic work of ants in tropical America. Bull. Geol. Soc. America 21, 449—496 (1910/11)]“. Verf. führt den erheblichen Teil der sogenannten Zellenlaterite auf die Tätigkeit der Termiten zurück, und zwar wurden die Termitenwaben ursprünglich im weichen Boden angelegt und erst nachträglich wurden die Waben durch Tonerde- und Eisenhydrat imprägniert, dabei mag die physikalische und chemische Veränderung des Bodens durch die Termiten eine Rolle gespielt haben.

K. Lambrecht (Budapest).

● **Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover.** Neubearb. u. erw. v. B. Füge, W. Pfenningschmidt, W. Pietzsch u. J. Troeder. Hrsg. v. d. Naturhistor. Ges. zu Hannover. Hannover: Selbstverl. 1930. 140 S. u. 2 Taf. RM. 6.—

Das Heft gibt eine umfassende Darstellung der Schmetterlinge der Umgebung von Hannover von der Aller bis zum Deister. Die aufgeführten Arten sind noch fast dieselben wie in den bereits früher erschienenen Bearbeitungen. Neu einbezogen sind die Kleinschmetterlinge. Mitunter ist insofern in der Faunenzusammensetzung eine Änderung eingetreten, als in der Nähe der Großstadt oder durch den Ausbau des Mittel-landkanals und den damit verbundenen Bodenveränderungen die Lebensbedingungen für manche Arten andere geworden sind. Auch klimatische Veränderungen haben vorübergehende Zunahme oder Abnahme von einzelnen Schmetterlingsarten herbeigeführt. Im allgemeinen sind die Formen dieselben, wie sie auch sonst in den entsprechenden Landschaften auftreten. Einleitend werden diese eingehend charakterisiert. Im systematischen Teil sind die Fundstellen der Falter, die Zeit, evtl. Abarten und Futterpflanzen, soweit sie von der gewöhnlichen Pflanze abweichen, angegeben. 2 Tafeln vervollständigen den wertvollen Beitrag zu unserer einheimischen Schmetterlingsfauna.

Max Reichelt (Leipzig).

Thorson, Gunnar: Zoogeographische und ökologische Studien über die Landschnecken in den Dolomiten. (Invertebraten-Abt., Zool. Museum, Univ. Kopenhagen. Zool. Jb. Abt. System., Ökol. u. Geogr. 60, 85—238 (1930).

Verf. behandelt die Verbreitung der Landschnecken in den Dolomiten teils auf Grund eigener Sammelreisen, teils unter Benutzung von Lokalsammlungen und unter Auswertung der Literatur. Leider ist hier u. a. aber auch die wichtige Arbeit von Käufel (1928, Clausiliiden) die das Gebiet mitbehandelt, nicht berücksichtigt worden. Eine Reihe von früher für selbständige Arten gehaltene Schnecken werden in Rassenkreise zusammengefaßt, so auch *Pleuracme spectabilis* und *Pleuracme veneta*. Von den angeführten Arten sind für die Dolomiten bisher noch nicht erwähnt: *Vitrea subrimata*, *Arion empiricorum*, *Succinea elegans*, *Vallonia excentrica*, *Sphyradium biplicatum*, *Caeciliodes acicula*.

Gaschott (München).

Amshler, Wolfgang: Über *Capra aegagrus* und *Capra Falconeri* als Hausziegen im Kaukasus, eine Vorarbeit zur genetischen Bearbeitung der Hausziegen. (*Lehrkanzel f. Haustiergenet. u. Tierzucht, Hochsch. f. Bodenkultur, Wien.*) Wiss. Arch. Landw. B. 3, 307—338 (1930).

Verf. weist an Hand der Ergebnisse seiner Kaukasusexpeditionen nach, daß dort neben der weitverbreiteten *Capra prisca* auch die seltene *C. aegagrus* sowie *C. Falconeri* vorkommen. Lokale Divergenzen der Hornstellung und Form sowie das Abstammungsproblem werden diskutiert.

Lauprecht (Göttingen).

Monographien einzelner Arten und Gruppen.

● **H. G. Bronns** Klassen und Ordnungen des Tier-Reichs wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. Bd. 3. Mollusca (Weichtiere). I. Amphineura und Scaphopoda. Bearb. v. **H. Simroth**. Nachtrag III: Polyplacophora (Schluß); Amphineura (Allgemeines); Scaphopoda. Bearb. v. **H. Hoffmann**. Leipzig: Akad. Verlagsges. m. b. H. 1930. S. X, 369—511 u. 57 Abb. RM. 18.80.

Vorliegende Lieferung bildet den Abschluß der Nachträge zu Abteilung I (Amphineura, Scaphopoda), so daß nunmehr dieser Abschnitt auf den derzeitigen Stand der Wissenschaft gebracht und wieder voll gebrauchsfähig ist. Dieser Nachtrag III wird als besonders wertvoll angesehen, da er nach Beendigung der Behandlung der Polyplacophora (Schluß der Besprechung der Physiologie der Reizaufnahme, Ökologie, System) eine eingehende Übersicht über die Verwandtschaftsbeziehungen der „Amphineura“ gibt, die eine völlige Neubearbeitung ist und die die einander widersprechenden Ansichten über diese Fragen kritisch beleuchtet und gegeneinander abwägt, so daß auch zu der mehrfach behandelten Frage eine Berechtigung der Zusammenfassung der Aplacophora und der Polyplacophora zu einer einheitlichen Gruppe „Amphineura“ Stellung genommen werden kann. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daß diese Zusammenfassung schwerlich aufrecht zu erhalten ist, die Aplacophora und Polyplacophora vielmehr scharf voneinander getrennt werden müssen, zumal Überlegungen über die phylogenetischen Beziehungen beider Gruppen zu den übrigen Mollusken und zu den als Ursprung in Betracht kommenden Wurmgruppen ergeben, daß die Aplacophoren am besten ganz aus den Mollusken herauszunehmen und den Vermes zuzuordnen sind. Sie können als „Vormollusken“ angesehen werden; daß sie den echten Mollusken den Ursprung gegeben haben, wird nicht bezweifelt. Die Polyplacophoren sind dagegen echte, allerdings in vieler Beziehung spezialisierte Mollusken. In diesem Zusammenhang wird es ferner unternommen, die Frage zu beleuchten, ob die Mollusken von segmentierten oder unsegmentierten Würmern abstammen und ob diesen Vorfahren ein Cölom zukam oder nicht. In vorsichtiger Abwägung der verschiedenen Theorien („Plathelminthen“- und „Anneliden“-Theorie) kommt Verf. zu dem Schluß, daß die bisherige Fragestellung nicht ganz exakt ist und daß beiden Theorien Richtiges zugrunde liegt. Die meisten Übereinstimmungen bestehen zu primitiven Anneliden, d. h. die Stammform der Aplacophoren dürfte der der Anneliden nächstverwandt und für beide gemeinsam sein. Unter diesen Übereinstimmungen ist die wichtigste das Vorhandensein eines Cöloms. Da nun für eine ursprüngliche Segmentierung der Mollusken keinerlei Beweis zu erbringen war, so folgt daraus, daß die gemeinsame Stammform nur ein einfaches, ungegliedertes Cölom besessen haben kann, also noch nicht segmentiert war. Nächst zu den Anneliden bestehen bei den Aplacophoren Beziehungen zu den Turbellarien bzw. Plathelminthen, woraus auf eine gemeinsame Stammform geschlossen wird, von der nach obigem auch die Anneliden hergeleitet werden müssen. Da den Plathelminthen ein echtes Cölom fehlt, kann diese Stammform ebenfalls kein solches Cölom besessen haben, das erst in einem Entwicklungszweig erworben wurde, der zu den Aplacophoren und Anneliden führte. — Dann werden in dieser Lieferung noch die Scaphopoda behandelt. Während das Kapitel über die Morphologie, Ontogenie, Verbreitung und über die systematischen

Beziehungen an die alte Bearbeitung von Simroth anschließen und diese auf moderne Höhe bringen, ist das Kapitel „Physiologie und Ökologie“ wie auch bei den früheren Nachträgen über die Aplacophoren und Polyplacophoren als Neubearbeitung anzusehen, die einen ausgezeichneten Überblick über das auf diesem Gebiet bisher Bekannte ermöglicht.

Caesar R. Boettger (Berlin).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. 1. Haupttl. Fauna palae-
arctica. Suppl.-Bd. 1. Liefg. 15. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 177—200.

Die Lieferung schließt die Familie der Satyriden ab und beginnt mit den bekannten Tagfaltern der Nymphaliden. Nach den Apatura- und Limenitisarten folgen die Pyrameisarten (Admiral und Distelfalter) und Vanessen. Hier sind wenig neue Rassen aufgetaucht. Die Namenbezeichnung bezieht sich hauptsächlich auf Einzelformen, die durch Nahrungsmangel als Zwergformen oder durch verschiedene Temperaturbedingungen überall auftreten können.

Max Reichelt (Leipzig).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. 1. Haupttl. Fauna palae-
arctica. Suppl. Bd. 1. Liefg. 16. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 201—224.

Als eine direkte Fortsetzung der Liefg. 15 bringt dieses Heft außer den übrigen Vanessa- und Araschniaformen die zahlreichen Melitaea- und Argynnisarten, von denen kaum zwei Falter einander in der Flügelzeichnung gleichen.

Max Reichelt.

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna africana, Liefg. 105.
Exoten-Liefg. 498. Bd. 14. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. VII S. u. 2 Taf. RM. 4.50.

Liefg. 105 der Fauna africana besteht aus dem Tafelinhaltsverzeichnis zu Bd. 14 und Tafeln XIV, 78 u. 79 mit Abbildungen von Cossusarten.

Max Reichelt.

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna africana. Liefg. 106.
Exoten-Liefg. 501. Bd. 14. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 593—599 u. 2 Taf. RM. 4.50.

In dieser Lieferung ist nur der Abschluß des Index zu Band 14 mit Tafeln XIV, 67 und 80 enthalten.

Max Reichelt (Leipzig).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Exoten-Liefg. 496, Fauna
africana, Liefg. 103, Bd. 16. Stuttgart: Alfred Kernen 1929. S. 1—16 u. 1 Taf. RM. 4.50.

Lieferung 103 der afrikan. Fauna beginnt die Geometriden (16). In der Einleitung wird von der Eigenart der Spanner in Anpassung, Lebensgewohnheiten, Nahrungspflanzen gesprochen, die durch die afrikanische Steppenlandschaft bedingt ist. Systematisch stehen sie in Afrika ziemlich isoliert, da die Gruppe hier fehlt, die den Übergang zu den Noctuiden bildet. Zu der Unterfamilie der Oenochrominae gehört auch die Gattung Aletis Hbn mit den größten afrikanischen Spannern (s. Taf. 1). Die zweite Unterfamilie, die Hemitheinae enthält primitivere Formen. Sie sind durch grüne Färbung erkennbar. Beiliegende Tafel XVI, 1 zeigt Oenochrominae Falter.

Max Reichelt (Leipzig).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna indo-australia.
Liefg. 179. Exoten-Liefg. 502. Bd. 10. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 649—655 u. 2 Taf.

Mit einigen Nachträgen sind die indo-australischen Notodontiden beendet. Die Tafeln zeigen Epiplemiden und Notodontiden (X 58 u. 80).

Max Reichelt (Leipzig).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Exoten-Liefg. 495, Fauna
americana, Liefg. 215, Bd. 6. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 769—792. RM. 4.50.

Die Besprechung von Saturnidengattungen wird fortgesetzt. Unter ihnen finden sich Formen, die zum Teil große systematische Schwierigkeiten bilden (Dirphia, Phricodia Hb.). Ein Anhang bringt Arten aus der Unterfamilie der Syssphingiden.

Max Reichelt (Leipzig).

● Seitz, Adalbert: Die Großschmetterlinge der Erde. Fauna africana. Liefg. 104.
Exoten-Liefg. 497. Bd. 14. Stuttgart: Alfred Kernen 1930. S. 585—592 u. 2 Taf. RM. 4.50.

In Liefg. 104 der Fauna africana sind außer einem Teil des Index zu Bd. 14 zwei Tafeln (XIV, 76 u. 77) enthalten, auf denen u. a. Glasflügler abgebildet sind.

Max Reichelt (Leipzig).